


POCZĄTKOWE OBJAWY GRUŹLICY PŁUC



GORĄCZKA:


Ciepłota ciała bywa podwyższona już w pierwszym okresie choroby. Chory miewa dreszcze, poci się, zwłaszcza w nocy.

Od chwili zarażenia do wybuchu choroby w całej jej pełni mogą przeminąć lata. Często choroba rozwija się podstępnie i osobnik, będący w stadium choroby groźnym nie tylko dla jego życia, lecz i dla zdrowia otoczenia, może czuć się względnie dobrze i o chorobie swej nie wiedzieć. Wskutek tego chory często zwraca się do lekarza o poradę zbyt późno, kiedy leczenie ma już mniej pomyślne widoki przywrócenia mu całkowicie zdrowia.




CHUDNIĘCIE:

Chory traci na wadze wolniej lub szybciej, zależnie od złośliwości schorzenia.



OSŁABIENIE:


Chory męczy się przy najmniejszym wysiłku, skarży się na brak sił i z trudnością wykonywa swą zwykłą pracę.



BRAK APETYTU:

Chory je niechętnie i mało.

Z powodu dużego rozpowszechnienia i późnego rozpoznawania gruźlicy większość ludzi stale styka się z chorymi i wystawiona jest na niebezpieczeństwo zarażenia się. Najłatwiej ulegają zarażeniu dzieci, szczególnie z otoczenia chorych.



KASZEL:

Chory kaszle, miewa bóle w klatce piersiowej, czasem odpluwa, niekiedy z domieszką krwi.

Objawy wymienione mogą nie występować równocześnie. Żadnego nie należy lekceważyć, lecz po wystąpieniu któregośkolwiek z nich natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej najlepiej w poradni przeciwgruźliczej. Wczesne rozpoznanie i wczas zaczęte leczenie gruźlicy rokują najlepsze wyniki.



DES IX.9/4294