



# Friedrich-Wilhelms-Gymnasium

zu

# Greiffenberg in Pommern.

---

XVII.

---

Ostern 1869.

---

- INHALT: 1. Mathematische Abhandlung des Oberlehrers  
Herrn Conrector Dietrich.  
2. Schulnachrichten von dem Director.

---

Gedruckt bei C. Lemcke in Greiffenberg.

M. J. (1) (1) (1) (1) (1)

Ergebnisse in Formeln

177

178

179

180

181

182

## Vorrede.

---

 Hat man aus einem Punkte in der Ebene eines gegebenen Dreiecks auf die Seiten desselben Senkrechte gefällt, und die positive und negative Richtung derselben bestimmt, so lässt sich für die 3 Senkrechten mit Leichtigkeit eine Gleichung ersten Grades bestimmen, welche §. 5 näher betrachtet werden wird. Tritt nun hierzu noch die Bedingung, dass die Entfernungssumme eine constante Grösse sein soll, so ergibt sich aus beiden Gleichungen eine Gleichung ersten Grades mit 2 unbekanntem Grössen, wodurch bekanntlich ausgedrückt wird, dass alle Punkte mit gleicher Entfernungssumme in einer Geraden liegen. Da aber bei Veränderung der Constanten die neue Gleichung von der vorigen sich nur um eine constante Grösse unterscheidet, so wird durch dieselbe eine der früheren Geraden parallele Linie ausgedrückt, vorausgesetzt dass man die Bestimmung für die Positivität und Negativität der Senkrechten festhält. Ändert man die Bestimmung über Positivität und Negativität der Senkrechten, was scheinbar 7mal, in Wirklichkeit aber nur 3mal geschehen kann, so ändert sich die Lage der Geraden und ihrer Parallelen. Die Hauptlinie eines jeden dieser 4 Complexe paralleler Linien ist aber offenbar diejenige, deren Entfernungssumme = 0 ist. Diese 4 Linien sollen kurz Nulllinien genannt werden, und ihre Betrachtung ist Zweck des Programms.

---

## Vorbemerkung.

---

Das zu betrachtende Dreieck soll  $ABC$  heissen, der Flächeninhalt desselben  $A$ , die Seiten in absteigender Grösse  $a, b, c$ , die Höhen bezüglich  $h_1, h_2, h_3$ , der Mittelpunkt und Radius des umschriebenen Kreises  $M$  und  $r$ , die Mittelpunkte und Radien des innern und der äussern zu  $a, b, c$  gehörenden Berührungskreise  $O_{(1, 2, 3)}$  und  $e_{(1, 2, 3)}$ ,  $MO_{(1, 2, 3)}$  oder die Excentricitäten der Berührungskreise  $e_{(1, 2, 3)}$ , die Durchschnittspunkte der äusseren resp. inneren Halbierungslinien von  $\sphericalangle A, B, C$  mit den Gegenseiten  $U_{(1)}, V_{(1)}, W_{(1)}$  und mit der Peripherie des umschriebenen Kreises  $K_{(1)}, L_{(1)}, N_{(1)}$ , die Punkte, welche

durch Darstellung der Ausdrücke  $b \mp a$ ,  $c \mp a$ ,  $a \mp b$ ,  $c \mp b$ ,  $a \mp c$ ,  $b \mp c$  entstanden sind, indem man die nachstehende Seite auf der voranstehenden oder ihrer Verlängerung über den gemeinsamen Endpunkt von diesem aus abgeschlagen hat, resp.  $D_{(1)}$ ,  $E_{(1)}$ ,  $F_{(1)}$ ,  $G_{(1)}$ ,  $H_{(1)}$ ,  $J_{(1)}$ .

## Einleitung.

§. 1. Hat man in einer graden Linie 3 Punkte, durch welche Parallelen bis zu einer zweiten Graden gezogen sind, und bezeichnet man das Product aus der Entfernung zweier Punkte und aus der Parallelen durch den dritten Punkt als „Moment“ dieses Punktes, so ist das Moment des inneren Punktes gleich der Summe der Momente der beiden äusseren, vorausgesetzt dass man die auf der einen Seite der zweiten Graden befindlichen Parallelen positiv und die auf der andern Seite befindlichen negativ nimmt.

Die Richtigkeit ergibt sich mit Leichtigkeit aus der Aehnlichkeit derjenigen Dreiecke, welche entstehen, wenn man durch den Fusspunkt einer der 3 Parallelen eine zu der ersten Graden parallele Linie legt, welche die beiden andern Parallelen schneidet.

Anm. Da die Gleichung durch das grösste gemeinsame Mass der Entfernungen der 3 Punkte dividirt werden kann, so dürfen an Stelle der Entfernungen ihre Verhältnisszahlen gesetzt werden.

Hieraus ergibt sich, wenn  $S'$ ,  $S''$ ,  $S'''$  die aus A, B, C auf eine beliebige Grade gefällten Senkrechten, und d vor dem eingeklammerten Buchstaben eines in der Vorbemerkung genannten Punktes die Entfernung dieses Punktes von der beliebig angenommenen Graden bezeichnet:

$$1. \quad \begin{aligned} \alpha) \quad d(U_1) &= \frac{2A}{b+c} \left( \frac{S''}{h_2} + \frac{S'''}{h_3} \right), \quad d(V_1) = \frac{2A}{a+c} \left( \frac{S'}{h_1} + \frac{S'''}{h_3} \right), \quad d(W_1) = \frac{2A}{a+b} \left( \frac{S'}{h_1} + \frac{S''}{h_2} \right) \\ \beta) \quad d(U) &= \frac{2A}{b-c} \left( \frac{S''}{h_2} - \frac{S'''}{h_3} \right), \quad d(V) = \frac{2A}{a-c} \left( \frac{S'}{h_1} - \frac{S'''}{h_3} \right), \quad d(W) = \frac{2A}{a-b} \left( \frac{S'}{h_1} - \frac{S''}{h_2} \right) \end{aligned}$$

Denn da die inneren und äusseren Winkelhalbirenden die Gegenseite resp. innerlich und äusserlich im Verhältnisse der beiden andern Seiten schneiden, so ist

$$d(U_1) = \frac{b \cdot S'' + c \cdot S'''}{b + c}, \quad d(V_1) = \frac{a \cdot S' + c \cdot S'''}{a + c}, \quad d(W_1) = \frac{a \cdot S' + b \cdot S''}{a + b} \quad \text{und}$$

$$d(U) = \frac{b \cdot S'' - c \cdot S'''}{b - c}, \quad d(V) = \frac{a \cdot S' - c \cdot S'''}{a - c}, \quad d(W) = \frac{a \cdot S' - b \cdot S''}{a - b}, \quad \text{woraus}$$

sich die Behauptung sogleich ergibt, wenn man berücksichtigt, dass  $2A = a \cdot h_1 = b \cdot h_2 = c \cdot h_3$  ist.

$$2. \quad \begin{aligned} d(O) &= \varrho \left( \frac{S'}{h_1} + \frac{S''}{h_2} + \frac{S'''}{h_3} \right), \quad d(O_1) = \varrho_1 \left( \frac{S''}{h_2} + \frac{S'''}{h_3} - \frac{S'}{h_1} \right), \\ d(O_2) &= \varrho_2 \left( \frac{S'}{h_1} + \frac{S'''}{h_3} - \frac{S''}{h_2} \right), \quad d(O_3) = \varrho_3 \left( \frac{S'}{h_1} + \frac{S''}{h_2} - \frac{S'''}{h_3} \right). \end{aligned}$$

Denn sieht man eine Winkelhalbirende als vom Scheitel und der Gegenseite begrenzt an, so wird jede innere Halbirungslinie vom Scheitel aus durch den Mittelpunkt des

inneren und des einen äusseren Berührungskreises resp. innerlich und äusserlich im Verhältnisse der Summe der beiden den halbirten Winkel einschliessenden Seiten zur Gegenseite getheilt, daher ist

$$d(O) = \frac{a \cdot S' + (b+c) \cdot d(U_1)}{a+b+c} \text{ und } d(O_1) = \frac{(b+c) \cdot d(U_1) - a \cdot S'}{b+c-a} \text{ und, wenn man}$$

den in 1) sich ergebenden ursprünglichen Ausdruck für  $d(U_1)$  einsetzt,

$$d(O) = \frac{a \cdot S' + b \cdot S'' + c \cdot S'''}{a+b+c}, \quad d(O_1) = \frac{b \cdot S'' + c \cdot S''' - a \cdot S'}{b+c-a}, \text{ woraus sich die}$$

Richtigkeit für die beiden ersten und in derselben Weise für die beiden anderen Behauptungen ergibt, wenn man berücksichtigt, dass

$$2r = (a+b+c) \cdot \varrho = (b+c-a) \cdot \varrho_1 = (a+c-b) \cdot \varrho_2 = (a+b-c) \cdot \varrho_3 \text{ ist.}$$

$$3. \quad \begin{cases} \alpha) \left\{ \begin{array}{l} d(K_1) = \frac{1}{2} \varrho \left( \frac{S'}{h_1} + \frac{S''}{h_2} + \frac{S'''}{h_3} \right) + \frac{1}{2} \varrho_1 \left( \frac{S''}{h_2} + \frac{S'''}{h_3} - \frac{S'}{h_1} \right) \\ d(L_1) = \frac{1}{2} \varrho \left( \frac{S'}{h_1} + \frac{S''}{h_2} + \frac{S'''}{h_3} \right) + \frac{1}{2} \varrho_2 \left( \frac{S'}{h_1} + \frac{S'''}{h_3} - \frac{S''}{h_2} \right) \\ d(N_1) = \frac{1}{2} \varrho \left( \frac{S'}{h_1} + \frac{S''}{h_2} + \frac{S'''}{h_3} \right) + \frac{1}{2} \varrho_3 \left( \frac{S'}{h_1} + \frac{S''}{h_2} - \frac{S'''}{h_3} \right) \end{array} \right. \\ \beta) \left\{ \begin{array}{l} d(K) = \frac{1}{2} \varrho_2 \left( \frac{S''}{h_2} + \frac{S'''}{h_3} - \frac{S'}{h_1} \right) + \frac{1}{2} \varrho_3 \left( \frac{S'}{h_1} + \frac{S''}{h_2} - \frac{S'''}{h_3} \right) \\ d(L) = \frac{1}{2} \varrho_1 \left( \frac{S''}{h_2} + \frac{S'''}{h_3} - \frac{S'}{h_1} \right) + \frac{1}{2} \varrho_3 \left( \frac{S'}{h_1} + \frac{S''}{h_2} - \frac{S'''}{h_3} \right) \\ d(N) = \frac{1}{2} \varrho_1 \left( \frac{S''}{h_2} + \frac{S'''}{h_3} - \frac{S'}{h_1} \right) + \frac{1}{2} \varrho_2 \left( \frac{S'}{h_1} + \frac{S''}{h_2} - \frac{S'''}{h_3} \right) \end{array} \right. \end{cases}$$

Denn da bekanntlich  $K_1$  und  $K$  in der Mitte von  $OO_1$  und  $O_2O_3$  liegen, so ist  $d(K_1) = \frac{1}{2} [d(O) + d(O_1)]$  und  $d(K) = \frac{1}{2} [d(O_2) + d(O_3)]$ , woraus sich mit Hülfe vom 2. die Behauptung ergibt.

Anm. Setzt man  $S' = h_1$  und  $S''$ , so wie  $S''' = 0$ , d. h. bestimmt man die Seite  $a$  als die bisher beliebig angenommene Grade, so ergibt sich  $d(K_1) = \frac{1}{2} \varrho - \frac{1}{2} \varrho_1$  und  $d(K) = \frac{1}{2} \varrho_2 + \frac{1}{2} \varrho_3$ . Nun liegen aber  $d(K_1)$  und  $S'$  auf verschiedenen Seiten von  $a$ , also ist  $d(K_1)$  negativ, wie auch schon daraus erkannt wird, dass  $\varrho_1 > \varrho$  ist, weshalb der absolute Werth von  $d(K_1) = \frac{1}{2} \varrho_1 - \frac{1}{2} \varrho$  ist. Da aber die Summe der absoluten von  $d(K_1)$  und  $d(K)$ , wie leicht einzusehen, gleich dem Durchmesser des umschriebenen Kreises ist, so ergibt sich  $\frac{1}{2} \varrho_1 - \frac{1}{2} \varrho + \frac{1}{2} \varrho_2 + \frac{1}{2} \varrho_3 = 2r$  oder  $\varrho_1 + \varrho_2 + \varrho_3 = 4r + \varrho$ .

$$4. \quad d(M) = \frac{1}{4} \varrho \left( \frac{S'}{h_1} + \frac{S''}{h_2} + \frac{S'''}{h_3} \right) + \frac{1}{4} \varrho_1 \left( \frac{S''}{h_2} + \frac{S'''}{h_3} - \frac{S'}{h_1} \right) \\ + \frac{1}{4} \varrho_2 \left( \frac{S'}{h_1} + \frac{S''}{h_2} - \frac{S'''}{h_3} \right) + \frac{1}{4} \varrho_3 \left( \frac{S'}{h_1} + \frac{S''}{h_2} - \frac{S'''}{h_3} \right)$$

Denn da  $K$  und  $K_1$  einander diametral gegenüber liegen, so ist  $d(M) = \frac{1}{2} [d(K) + d(K_1)]$ , woraus mit Hülfe von 3. die Behauptung folgt.

Anm. Werden  $S', S'', S'''$  der Reihe nach der entsprechenden Höhe und die beiden andern der Null gleich gesetzt, dann erhält man die Entfernungen des Mittelpuncts  $M$  von den Seiten  $a, b, c$  so, wie folgt,  $\frac{1}{4} \varrho - \frac{1}{4} \varrho_1 + \frac{1}{4} \varrho_2 + \frac{1}{4} \varrho_3$ ,  $\frac{1}{4} \varrho + \frac{1}{4} \varrho_1 - \frac{1}{4} \varrho_2 + \frac{1}{4} \varrho_3$ ,  $\frac{1}{4} \varrho + \frac{1}{4} \varrho_1 + \frac{1}{4} \varrho_2 - \frac{1}{4} \varrho_3$ . Daraus ergibt sich für  $M$  als Entfernungssumme von den 3 Seiten  $\frac{3}{4} \varrho + \frac{1}{4} \varrho_1 + \frac{1}{4} \varrho_2 + \frac{1}{4} \varrho_3$  oder  $r + \varrho$  zufolge Anm. zu 3.

$$\begin{array}{l}
 \alpha) \left\{ \begin{array}{l}
 1. d(D) = \left[ (b - a) \cdot \frac{S'''}{h_3} + c \cdot \frac{S'}{h_1} \right] \cdot \sin A \\
 2. d(E) = \left[ (c - a) \cdot \frac{S''}{h_2} + b \cdot \frac{S'}{h_1} \right] \cdot \sin A \\
 3. d(F) = \left[ (a - b) \cdot \frac{S'''}{h_3} + c \cdot \frac{S''}{h_2} \right] \cdot \sin B \\
 4. d(G) = \left[ (c - b) \cdot \frac{S'}{h_1} + a \cdot \frac{S''}{h_2} \right] \cdot \sin B \\
 5. d(H) = \left[ (a - c) \cdot \frac{S''}{h_2} + b \cdot \frac{S'''}{h_3} \right] \cdot \sin C \\
 6. d(J) = \left[ (b - c) \cdot \frac{S'}{h_1} + a \cdot \frac{S'''}{h_3} \right] \cdot \sin C
 \end{array} \right. \\
 5. \left\{ \begin{array}{l}
 \beta) \left\{ \begin{array}{l}
 1. d(D_1) = \left[ (b + a) \cdot \frac{S'''}{h_3} - c \cdot \frac{S'}{h_1} \right] \cdot \sin A \\
 2. d(E_1) = \left[ (c + a) \cdot \frac{S''}{h_2} - b \cdot \frac{S'}{h_1} \right] \cdot \sin A \\
 3. d(F_1) = \left[ (a + b) \cdot \frac{S'''}{h_3} - c \cdot \frac{S''}{h_2} \right] \cdot \sin B \\
 4. d(G_1) = \left[ (c + b) \cdot \frac{S'}{h_1} - a \cdot \frac{S''}{h_2} \right] \cdot \sin B \\
 5. d(H_1) = \left[ (a + c) \cdot \frac{S''}{h_2} - b \cdot \frac{S'''}{h_3} \right] \cdot \sin C \\
 6. d(J_1) = \left[ (b + c) \cdot \frac{S'}{h_1} - a \cdot \frac{S'''}{h_3} \right] \cdot \sin C
 \end{array} \right.
 \end{array} \right.
 \end{array}$$

Zufolge der Vorbemerkung ist D und D<sub>1</sub> durch Abschlagen der Seite a von dem Punkte C aus auf CA und auf deren Verlängerung über C hinaus entstanden, also ist AD = a - b, AD<sub>1</sub> = a + b und daher

$$d(D) = \frac{a \cdot S' - (a - b) \cdot S'''}{b} \quad \text{und} \quad d(D_1) = \frac{(a + b) \cdot S'''}{b} - a \cdot \frac{S'}{b}. \quad \text{Da nun}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{h_2}{h_1} = \frac{c \cdot \sin A}{h_1} \quad \text{und} \quad \frac{1}{b} = \frac{\sin A}{h_3} \quad \text{ist, so ergibt sich}$$

$$d(D) = c \cdot \sin A \cdot \frac{S'}{h_1} - (a - b) \cdot \sin A \cdot \frac{S'''}{h_3}$$

$$\text{und} \quad d(D_1) = (a + b) \cdot \sin A \cdot \frac{S'''}{h_3} - c \cdot \sin A \cdot \frac{S'}{h_1},$$

woraus für d(D) und d(D<sub>1</sub>) die Behauptung folgt; in gleicher Weise erfolgt der Nachweis für die Richtigkeit der andern Behauptungen.

Setzt man, um die Entfernungen der Punkte D, E, F von den Seiten a, b, c zu erhalten, zuerst S' = h<sub>1</sub> und S'' = S''' = 0, darnach S'' = h<sub>2</sub> und S' = S''' = 0, endlich S'' = h<sub>3</sub> und S' = S''' = 0, so ergibt sich, wenn man die Entfernungssumme eines Punktes kurz durch Σ und den darauf folgenden Buchstaben des Punktes bezeichnet

$$\text{aus } \alpha) \text{ 1 und 2 } \Sigma(D) = \Sigma(E) = (b + c - a) \cdot \sin A$$

$$\text{aus } \alpha) \text{ 3 und 4 } \Sigma(F) = \Sigma(G) = (a + c - b) \cdot \sin B$$

$$\text{aus } \alpha) \text{ 5 und 6 } \Sigma(H) = \Sigma(J) = (a + b - c) \cdot \sin C$$

Da nun in diesen Ausdrücken S', S'', S''' der Reihe nach = + h<sub>1</sub>, + h<sub>2</sub>, + h<sub>3</sub> gesetzt, somit also die positive Richtung der Senkrechten nach der Innenseite der Dreiecks-

seiten für die vorher berechneten Ausdrücke angenommen ist, so müssen auf Grund der allgemeinen Betrachtung in der Vorrede die Linien DE, FG, HJ die Richtung des einen Liniencomplexes angeben, also natürlich unter einander selbst parallel sein. Ändert man die Positivität der Senkrechten dahin ab, dass der Reihe nach die Senkrechten nach der Aussenseite der einen von den Seiten a, b, c und nach der Innenseite der beiden andern positiv genommen wird, d. h. setzt man zuerst  $S' = -h_1$ ,  $S'' = h_2$ ,  $S''' = h_3$ , darnach  $S' = h_1$ ,  $S'' = -h_2$ ,  $S''' = h_3$ , endlich  $S' = h_1$ ,  $S'' = h_2$ ,  $S''' = -h_3$ , und bezeichnet man die dadurch erhaltenen Entfernungssummen resp. mit  $\Sigma_1$ ,  $\Sigma_2$ ,  $\Sigma_3$  und dem Buchstaben des Punctes, so ergibt sich

$$\text{aus } \beta) 1 \text{ und } 2 \quad \Sigma_1 (D_1) = \Sigma_1 (E_1) = (a + b + c) \cdot \sin B$$

$$\text{aus } \alpha) 4 \text{ und } \beta) 3 \quad \Sigma_1 (G) = \Sigma_1 (F_1) = (a + b - c) \cdot \sin B$$

$$\text{aus } \alpha) 6 \text{ und } \beta) 5 \quad \Sigma_1 (J) = \Sigma_1 (H_1) = (a + c - b) \cdot \sin C, \text{ ferner}$$

$$\text{aus } \beta) 3 \text{ und } 4 \quad \Sigma_2 (F_1) = \Sigma_2 (G_1) = (a + b + c) \cdot \sin B$$

$$\text{aus } \alpha) 2 \text{ und } \beta) 1 \quad \Sigma_2 (E) = \Sigma_2 (D_1) = (a + b - c) \cdot \sin A$$

$$\text{aus } \alpha) 5 \text{ und } \beta) 6 \quad \Sigma_2 (H) = \Sigma_2 (J_1) = (b + c - a) \cdot \sin C, \text{ endlich}$$

$$\text{aus } \beta) 5 \text{ und } 6 \quad \Sigma_3 (H_1) = \Sigma_3 (J_1) = (a + b + c) \cdot \sin C$$

$$\text{aus } \alpha) 1 \text{ und } \beta) 2 \quad \Sigma_3 (D) = \Sigma_3 (E_1) = (a + c - b) \cdot \sin A$$

$$\text{aus } \alpha) 3 \text{ und } \beta) 4 \quad \Sigma_3 (F) = \Sigma_3 (G_1) = (b + c - a) \cdot \sin B$$

Hieraus ist, wie vorher, zu schliessen, dass die Linienternionen  $(D_1E_1, GF_1, JH_1)$ ,  $(F_1G_1, ED_1, HJ_1)$ ,  $(H_1J_1, DE_1, FG_1)$  die Richtung der drei anderen Liniencomplexe angeben. Wie aber schon früher erwähnt, können noch vier andere Veränderungen der Positivität eintreten, wenn man nämlich die Positivität gerade umgekehrt als in den 4 erwähnten Fällen feststellt, dann erhält man aber dieselben Resultate, mit dem  $-$  Zeichen, also bleiben die vier Linienternionen dieselben.

Diese vier Linienternionen hat Jacobi in den Programmen über innere und äussere Entfernungsrörter behandelt, aber irrthümlicher Weise die erste Ternion (DE, FG, HJ), die sogenannten inneren Entfernungsrörter, den Linien  $D_1E_1, F_1G_1, H_1J_1$ , den sogenannten äusseren Hauptörtern, gegenüber gestellt; die hübschen Betrachtungen über das durch die äusseren Hauptörter bestimmte Dreieck würde er, wenn er die Gleichstellung der 4 Linienternionen erkannt hätte, jedenfalls auch auf die durch  $(DE, FG_1, HJ_1)$ ,  $(DE_1, FG, JH_1)$ ,  $(D_1E, GF_1, HJ)$  bestimmten analogen Dreiecke ausgedehnt haben. Da sich an diese Dreiecke noch so manches Interessante anknüpft, so behalte ich mir vor, dieselben später ein Mal zu betrachten.

### Von den Nulllinien.

§ 2. Da bekanntlich die innere und äussere Halbirungslinie eines Dreieckswinkels die Gegenseite im Verhältnisse der beiden andern Seiten theilt, so ist

$$AV = \frac{b \cdot c}{a - c}, \quad AW = \frac{b \cdot c}{a - b}, \quad BU = \frac{a \cdot c}{b - c}, \quad BW = \frac{a \cdot c}{a - b}, \quad CU = \frac{a \cdot b}{b - c}, \quad CV = \frac{a \cdot b}{a - c}$$

$$AV_1 = \frac{b \cdot c}{a + c}, \quad AW_1 = \frac{b \cdot c}{a + b}, \quad BU_1 = \frac{a \cdot c}{b + c}, \quad BW_1 = \frac{a \cdot c}{a + b}, \quad CU_1 = \frac{a \cdot b}{b + c}, \quad CV_1 = \frac{a \cdot b}{a + c}$$

Hieraus ergibt sich:

1. Die Punkte, in welchen die 3 äusseren Winkelhalbirenden, so wie 2 innere und die dritte äussere die Gegenseiten treffen, liegen in einer graden Linie.

Denn es ist  $AV \cdot BW \cdot CU = AW \cdot BU \cdot CV$ ,  $AV_1 \cdot BW_1 \cdot CU = AW_1 \cdot BU \cdot CV_1$ ,  $AV \cdot BW_1 \cdot CU_1 = AW_1 \cdot BU_1 \cdot CV$  und  $AV_1 \cdot BW \cdot CU_1 = AW \cdot BU_1 \cdot CV_1$ , also sind nach dem Satze des Menelaos  $UVW$ ,  $UV_1W_1$ ,  $U_1VW_1$ ,  $U_1V_1W$  grade Linien.

Da sich später herausstellen wird, dass die Entfernungssumme eines jeden Punctes dieser 4 Linien = 0 ist, so sollen dieselben kurz Nulllinien genannt werden, und zwar  $UVW$  die innere,  $UV_1W_1$ ,  $U_1VW_1$ ,  $U_1V_1W$  bezüglich die erste, zweite, dritte oder zu  $a$ ,  $b$ ,  $c$  gehörige äussere Nulllinie, da für  $UVW$  die Senkrechten aus einem Puncte nach der Innenseite von  $a$ ,  $b$ ,  $c$  und für  $UV_1W_1$ ,  $U_1VW_1$ ,  $U_1V_1W$  bezüglich nach der Aussenseite von  $a$ ,  $b$ ,  $c$  und nach der Innenseite der beiden andern Dreiecksseiten positiv genommen werden.

Anm. Der voranstehende Satz ist offenbar nur ein specieller Fall des d'Alembert'schen Satzes, dass die drei äusseren Aehnlichkeitspuncte dreier Kreise, so wie 2 innere und 1 äusserer in grader Linie liegen, da die Ecken des Dreiecks und die Durchschnittspuncte der Winkelhalbirenden mit den Gegenseiten Aehnlichkeitspuncte der 4 Berührungskreise sind.

2. Die Linienternionen  $(DE, FG, HJ)$ ,  $(D_1E_1, F_1G_1, H_1J_1)$ ,  $(D_1E_1, F_1G_1, H_1J_1)$ ,  $(DE_1, FG_1, H_1J_1)$  sind bezüglich den Nulllinien  $UVW$ ,  $UV_1W_1$ ,  $U_1VW_1$ ,  $U_1V_1W$  parallel.

Denn es ist  $AV : AW = \frac{b \cdot c}{a - c} : \frac{b \cdot c}{a - b} = a - b : a - c = AD : AE$ , also  $VW \parallel DE$ ,

$$BU : BW = \frac{a \cdot c}{b - c} : \frac{a \cdot c}{a - b} = a - b : b - c = BF : BG, \text{ also } UW \parallel FG,$$

$$\text{und } CU : CV = \frac{a \cdot b}{b - c} : \frac{a \cdot b}{a - c} = a - c : b - c = CH : CJ, \text{ also } UV \parallel HJ,$$

woraus sich die Richtigkeit der Behauptung für die erste Ternion ergibt. In gleicher Weise folgt das Uebrige.

3. Es sind die Dreiecksquaternionen  $AV_{(1)}W_{(1)}$ ,  $BU_{(1)}W_{(1)}$ ,  $CU_{(1)}V_{(1)}$  bezüglich den Quaternionen  $AD_{(1)}E_{(1)}$ ,  $BF_{(1)}G_{(1)}$ ,  $CH_{(1)}J_{(1)}$  ähnlich, wenn die Indices so gewählt werden, dass  $U$  mit  $G$  und  $J$ ,  $V$  mit  $E$  und  $H$ ,  $W$  mit  $D$  und  $F$  übereinstimmen. Die Richtigkeit folgt unmittelbar aus 2).

Diese 6 Quaternionen von Dreiecken sollen durch  $T''_{(1,2,3)}$ ,  $T''_{(1,2,3)}$ ,  $T'''_{(1,2,3)}$ ,  $t'_{(1,2,3)}$ ,  $t''_{(1,2,3)}$ ,  $t'''_{(1,2,3)}$  bezeichnet werden, so dass der obere Index die im Dreiecke vorkommende Ecke  $A$ ,  $B$ ,  $C$  anzeigt, der fehlende oder vorhandene untere Index die innere oder erste, zweite, dritte äussere Nulllinie, welche eine Seite der Dreiecke  $T$  und parallel zu einer Seite der Dreiecke  $t$  ist.

$$4. \quad T''_{(1,2,3)} : A : t'_{(1,2,3)} = \frac{b \cdot c}{(a \mp b)(a \mp c)} : 1 : \frac{(a \mp b)(a \mp c)}{b \cdot c}$$

$$T''_{(1,2,3)} : A : t''_{(1,2,3)} = \frac{a \cdot c}{(a \mp b)(b \mp c)} : 1 : \frac{(a \mp b)(b \mp c)}{a \cdot c}$$

$$T'''_{(1,2,3)} : A : t'''_{(1,2,3)} = \frac{a \cdot b}{(a \mp c)(b \mp c)} : 1 : \frac{(a \mp c)(b \mp c)}{a \cdot b}$$

Denn zwei Dreiecke, bei denen ein Winkel des einen einem Winkel des andern gleich ist, oder denselben zu 2 Rechten ergänzt, verhalten sich wie die Producte der beiden diese Winkel einschliessenden Seiten, also

$$\begin{aligned} T'_{(1,2,3)} : A : t'_{(1,2,3)} &= AV_{(1)} \cdot AW_{(1)} : AB \cdot AC = AD_{(1)} : AE_{(1)} \\ &= \frac{b \cdot c}{a \mp c} \cdot \frac{b \cdot c}{a \mp b} : b \cdot c : (a \mp b) (a \mp c) \\ &= \frac{b \cdot c}{(a \mp b) (a \mp c)} : 1 : \frac{(a \mp b) (a \mp c)}{b \cdot c} \end{aligned}$$

In gleicher Weise ergibt sich das Uebrige.

Anm. 1. Da  $AV_{(1)}$  und  $AD_{(1)}$  homologe Seiten in den ähnlichen Dreiecken  $T'_{(1,2,3)}$  und  $t'_{(1,2,3)}$  sind, ferner  $BW_{(1)}$  und  $BG_{(1)}$  in  $T''_{(1,2,3)}$  und  $t''_{(1,2,3)}$ , endlich  $CU_{(1)}$  und  $CH_{(1)}$  in  $T'''_{(1,2,3)}$  und  $t'''_{(1,2,3)}$ , und da

$AV_{(1)} : AD_{(1)} = \frac{b \cdot c}{a \mp c} = (a \mp b) = \frac{b \cdot c}{(a \mp b) (a \mp c)} : 1$  sich verhält, sowie  $BW_{(1)} : BG_{(1)} = \frac{a \cdot c}{a \mp b} : (b \pm c) = \frac{a \cdot c}{(a \mp b) (b \pm c)} : 1$ , und  $CU_{(1)} : CH_{(1)} = \frac{a \cdot b}{b \mp c} : (a \mp c) = \frac{a \cdot b}{(a \mp c) (b \mp c)} : 1$ , so kann man, wenn  $T$  und  $t$  ein Paar jener 12 ähnlichen Dreieckspaare und  $L$  und  $l$  ein Paar homologer Linien in denselben bezeichnen, obigen Satz kurz ausdrücken  $T : A = A : t = L : l$ .

Anm. 2. Da die unteren Zeichen dem eingeklammerten Index von  $U, V, W, D, E, F, G, H, J$  zugehören, so ist es nicht schwer, für ein bestimmtes  $T$  und  $t$  die richtige Verhältnisszahl anzugeben.

5. Wenn  $S$  und  $s$  homologe Seiten,  $H$  und  $h$  die dazu gehörigen Höhen in einem jener 12 Dreieckspaare  $T$  und  $t$  bezeichnen, so ist  $2 \cdot A = S \cdot h = s \cdot H$ .

Denn es ist  $T = \frac{1}{2} S \cdot H$  und  $t = \frac{1}{2} s \cdot h$ , und nach vorigem Satze Anm.  $T : A = A : t = S : s$ , also ist  $\frac{1}{2} S \cdot H : A = A : \frac{1}{2} s \cdot h = S : s$ , woraus sich die Behauptung sogleich ergibt.

Anm. Dieser Satz gilt im Bezug auf jedes Paar ähnlicher Dreiecke, zu welchem  $A$  mittlere geometrische Proportionale ist, wie man sogleich an dem Beweise erkennt. Derartige Dreiecke kommen öfter vor, wenn nämlich die Ecken des einen in den Seiten von  $A$  liegen, und die Seiten des andern durch die Ecken von  $A$  parallel zu den Seiten des ersten gehen, wie z. B. die Dreiecke, deren Ecken einerseits die 3 Berührungspunkte eines Berührungskreises von  $A$ , andererseits die Mittelpunkte der 3 übrigen Berührungskreise sind.

$$\begin{aligned} 6. \quad T'_{(1,2,3)} &= \frac{b \cdot c}{(a \mp b) (a \mp c)} \cdot A, \quad T''_{(1,2,3)} = \frac{a \cdot c}{(a \mp b) (b \mp c)} \cdot A, \quad T'''_{(1,2,3)} = \frac{a \cdot b}{(a \mp c) (b \mp c)} \cdot A \\ \text{und } t'_{(1,2,3)} &= \frac{(a \mp b) (a \mp c)}{b \cdot c} \cdot A, \quad t''_{(1,2,3)} = \frac{(a \mp b) (b \mp c)}{a \cdot c} \cdot A, \quad t'''_{(1,2,3)} = \frac{(a \mp c) (b \mp c)}{a \cdot b} \cdot A \end{aligned}$$

Dies ergibt sich unmittelbar aus 4), wie auch

$$7. \quad T'_{(1,2,3)} \cdot t'_{(1,2,3)} = T''_{(1,2,3)} \cdot t''_{(1,2,3)} = T'''_{(1,2,3)} \cdot t'''_{(1,2,3)} = A^2$$

$$8. \quad T' \cdot T'_1 = T'_2 \cdot T'_3, \quad T'' \cdot T''_1 = T''_2 \cdot T''_3, \quad T''' \cdot T'''_1 = T'''_2 \cdot T'''_3 \quad \text{und}$$

$$t' \cdot t'_1 = t'_2 \cdot t'_3, \quad t'' \cdot t''_1 = t''_2 \cdot t''_3, \quad t''' \cdot t'''_1 = t'''_2 \cdot t'''_3$$

Denn es ist  $T' = \frac{b \cdot c}{(a-b)(a-c)} \cdot A, T'_1 = \frac{b \cdot c}{(a+b)(a+c)} \cdot A, T'_2 = \frac{b \cdot c}{(a+b)(a-c)} \cdot A,$   
 $T'_3 = \frac{b \cdot c}{(a-b)(a+c)} \cdot A$ , also  $T' \cdot T'_1 = \frac{b^2 \cdot c^2 \cdot A^2}{(a^2 - b^2)(a^2 - c^2)} = T'_2 \cdot T'_3$ . In gleicher Weise ergibt sich das Uebrige.

Anm. Dieser Satz kommt den Dreiecken T und t deshalb zu, weil die T und t mit gleichem oberen Index, die durch die Diagonalen eines Vierecks gebildeten Dreiecke, und da bei jedem Vierecke die Producte je zweier durch die Diagonalen gebildeten, einander gegenüber liegenden Dreiecke gleich sind.

$$9. \frac{1}{t^{(1)}} + \frac{1}{t^{(2)}} = \frac{1}{t^{(1)}} + \frac{1}{A} \text{ und } \frac{1}{t^{(2)}} + \frac{1}{t^{(3)}} = \frac{1}{t^{(2)}} + \frac{1}{A}$$

Denn wie aus der Figur sogleich zu erkennen ist, muss

$$T^{(1)} + T^{(2)} = T^{(1)} + A \text{ und } T^{(2)} + T^{(3)} = T^{(2)} + A, \text{ also auch zufolge 7)}$$

$$\frac{A^2}{t^{(1)}} + \frac{A^2}{t^{(2)}} = \frac{A^2}{t^{(1)}} + A \text{ und } \frac{A^2}{t^{(2)}} + \frac{A^2}{t^{(3)}} = \frac{A^2}{t^{(2)}} + A \text{ sein, woraus durch Division mit}$$

$A^2$  die Behauptung folgt.

10. Da jeder von den Punkten  $U_{(1)}$ ,  $V_{(1)}$ ,  $W_{(1)}$  in einer Dreiecksseite und zugleich in der Halbierungslinie des Gegenwinkels dieser Seite liegt, so sind die aus einem dieser Punkte auf die beiden andren Seiten gefällten Senkrechten gleich. Bezeichnet man nun die aus  $U_{(1)}$ ,  $V_{(1)}$ ,  $W_{(1)}$  gefällten Senkrechten bezüglich mit  $P'_{(1)}$ ,  $P''_{(1)}$ ,  $P'''_{(1)}$ ; so ist

$$P'_{(1)} = \frac{2A}{b+c}, P''_{(1)} = \frac{2A}{a+c}, P'''_{(1)} = \frac{2A}{a+b}.$$

Denn da  $T^{(1)} = \frac{1}{2}AV_{(1)} \cdot P'''_{(1)} = \frac{1}{2}AW_{(1)} \cdot P''_{(1)}$ ,  $T^{(2)} = \frac{1}{2}BU_{(1)} \cdot P'''_{(1)} = \frac{1}{2}BW_{(1)} \cdot P'_{(1)}$  und  $T^{(3)} = \frac{1}{2}CU_{(1)} \cdot P''_{(1)} = \frac{1}{2}CV_{(1)} \cdot P'_{(1)}$  ist, so ergibt sich zufolge 6)

$$\frac{b \cdot c \cdot A}{(a+b)(a+c)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{b \cdot c}{a+c} \cdot P'''_{(1)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{b \cdot c}{a+c} \cdot P''_{(1)},$$

$$\frac{a \cdot c \cdot A}{(a+b)(b+c)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a \cdot c}{b+c} \cdot P'''_{(1)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a \cdot c}{a+b} \cdot P'_{(1)},$$

und  $\frac{a \cdot b \cdot A}{(a+c)(b+c)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a \cdot b}{b+c} \cdot P''_{(1)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a \cdot b}{a+c} \cdot P'_{(1)}$ , und daraus die Behauptung.

Anm. Der Satz kann auch mit Leichtigkeit aus §. 1 (1) entwickelt werden.

$$11. \frac{1}{P'_{(1)}} = \frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3}, \frac{1}{P''_{(1)}} = \frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_3}, \frac{1}{P'''_{(1)}} = \frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2}$$

$$\text{denn } \frac{1}{P'_{(1)}} = \frac{b+c}{2A} = \frac{b}{2A} + \frac{c}{2A} = \frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3}$$

$$12. P'_{(1)} = \frac{h_2 \cdot h_3}{h_3 + h_2}, P''_{(1)} = \frac{h_1 \cdot h_3}{h_3 + h_1}, P'''_{(1)} = \frac{h_1 \cdot h_2}{h_2 + h_1}$$

Folgt sogleich aus 11).

$$13. \frac{1}{P'_{(1)}} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\rho_3} - \frac{1}{\rho_2} \right), \frac{1}{P''_{(1)}} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\rho_3} - \frac{1}{\rho_1} \right), \frac{1}{P'''_{(1)}} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\rho_2} - \frac{1}{\rho_1} \right)$$

$$\frac{1}{P'_{(1)}} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\rho} + \frac{1}{\rho_1} \right), \frac{1}{P''_{(1)}} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\rho} + \frac{1}{\rho_2} \right), \frac{1}{P'''_{(1)}} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\rho} + \frac{1}{\rho_3} \right)$$

Denn es ist  $b - c = \frac{1}{2}(a + b - c) - \frac{1}{2}(a + c - b)$

$$\text{und } b + c = \frac{1}{2}(a + b + c) + \frac{1}{2}(b + c - a)$$

$$\text{also auch } \frac{b-c}{2A} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a+b-c}{2A} - \frac{1}{2} \cdot \frac{a+c-b}{2A}$$

$$\text{und } \frac{b+c}{2A} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a+b+c}{2A} + \frac{1}{2} \cdot \frac{b+c-a}{2A}$$

oder zufolge 10) und, da

$$2A = (a+b+c) \cdot \varrho = (b+c-a) \cdot \varrho_1 = (a+c-b) \cdot \varrho_2 = (a+b-c) \cdot \varrho_3 \text{ ist,}$$

$$\frac{1}{P'} = \frac{1}{2\varrho_3} - \frac{1}{2\varrho_2} \text{ und } \frac{1}{P_1'} = \frac{1}{2\varrho} + \frac{1}{2\varrho_1}.$$

$$14. P' = \frac{2 \cdot \varrho_2 \cdot \varrho_3}{\varrho_2 - \varrho_3}, P'' = \frac{2 \cdot \varrho_1 \cdot \varrho_3}{\varrho_1 - \varrho_3}, P''' = \frac{2 \cdot \varrho_1 \cdot \varrho_2}{\varrho_1 - \varrho_2}, P_1' = \frac{2 \cdot \varrho \cdot \varrho_1}{\varrho + \varrho_1}, P_1'' = \frac{2 \cdot \varrho \cdot \varrho_2}{\varrho + \varrho_2},$$

$$P_1''' = \frac{2 \cdot \varrho \cdot \varrho_3}{\varrho + \varrho_3}$$

Folgt sogleich aus 13.

$$15. \frac{1}{P'} + \frac{1}{P''} = \frac{1}{P''}, \frac{1}{P'} + \frac{1}{P_1''} = \frac{1}{P_1''}, \frac{1}{P_1''} + \frac{1}{P_1''} = \frac{1}{P_1''} \text{ und } \frac{1}{P_1'} + \frac{1}{P''} = \frac{1}{P_1''}.$$

Denn es ist  $(b-c) + (a-b) = a-c$ ,  $(b-c) + (a+c) = a+b$ ,  $(b+c) + (a-b) = a+c$ ,  $(b+c) + (a-c) = a+b$ , woraus sich die Behauptung durch Division mit  $2A$  ergibt.

§. 3. Schlägt man um  $O_{(1,2,3)}$  mit  $e_{(1,2,3)}$  oder  $MO_{(1,2,3)}$  einen Kreis und zieht in demselben Sehnen durch  $M$  parallel zu den Seiten  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , so sind diese gleich der Differenz oder Summe der nicht parallelen Seiten, je nachdem  $O_{(1,2,3)}$  Mittelpunkt des inneren und des zu der parallelen Seite gehörenden äusseren Berührungskreises oder eines der beiden anderen ist.

Der Beweis ergibt sich mit Leichtigkeit aus dem Satze, dass die Mitte einer Seite von den beiden in ihr befindlichen Berührungspuncten um die halbe Differenz und von den beiden in ihrer Verlängerung befindlichen um die halbe Summe entfernt ist, wenn man berücksichtigt, dass die durch  $M$  gezogene Parallele auf dem nach dem Berührungspuncte gezogenen Radius des Berührungskreises, um dessen Mittelpunkt der Kreis mit  $e_{(1,2,3)}$  geschlagen worden ist, also auch auf einem Radius des mit  $e_{(1,2,3)}$  geschlagenen Kreises senkrecht stehen muss.

Hieraus ergibt sich, wenn man die Sehnen, welche durch  $M$  in den um  $O_{(1,2,3)}$  mit  $e_{(1,2,3)}$  geschlagenen Kreisen parallel zu  $a$ ,  $b$ ,  $c$  gezogen worden sind, resp.  $Ma_{(1,2,3)}$ ,  $M\beta_{(1,2,3)}$ ,  $M\gamma_{(1,2,3)}$  nennt:

$$1. M\beta_{(1,2,3)} \gamma_{(1,2,3)} \cong t'_{(1,2,3)}, Ma_{(1,2,3)} \gamma_{(1,2,3)} \cong t''_{(1,2,3)}, Ma_{(1,2,3)} \beta_{(1,2,3)} \cong t'''_{(1,2,3)}$$

da die Winkel, deren Schenkel parallel sind und nach derselben oder entgegengesetzten Richtung gehen, einander gleich sein müssen.

2. Die Radien der um  $t'_{(1,2,3)}$ ,  $t''_{(1,2,3)}$ ,  $t'''_{(1,2,3)}$  beschriebenen Kreise sind einander und  $e_{(1,2,3)}$  gleich, da in congruenten Dreiecken homologe Stücke gleich sind.

Anm. Dieser für das Folgende wichtige Satz kann auch ohne Schwierigkeit durch Berechnung gefunden werden, wie es Jacobi in den Programmen über die Entfernungörter gethan hat, doch empfiehlt sich diese Herleitung durch die Einfachheit, mit welcher man zu dem allgemeinen Resultate gelangt.

$$3. \beta_{(1,2,3)} \gamma_{(1,2,3)} = \frac{a}{r} \cdot e_{(1,2,3)}, \alpha_{(1,2,3)} \gamma_{(1,2,3)} = \frac{b}{r} \cdot e_{(1,2,3)}, \alpha_{(1,2,3)} \beta_{(1,2,3)} = \frac{c}{r} \cdot e_{(1,2,3)}$$

Denn in 2 Kreisen verhalten sich die Sehnen, welche zu gleichen oder 2 Rechte betragenden Peripheriewinkeln gehören, wie die Radien.

$$\text{Anm. Zufolge 1) kann man auch sagen } D_{(1)} E_{(1)} = \frac{a}{r} e_{(1,2,3)}, F_{(1)} G_{(1)} = \frac{b}{r} e_{(1,2,3)},$$

$$H_{(1)} J_{(1)} = \frac{c}{r} \cdot e_{(1,2,3)}$$

4.  $\alpha_{(1,2,3)} \beta_{(1,2,3)} \gamma_{(1,2,3)} \sim ABC$ , da die Seiten gleiches Verhältniss haben und die Winkel gleich sind.

Anm. Die weiteren Beziehungen dieser Dreiecke sind im vorigen Programme schon besprochen.

5. Bezeichnet man die von A, B, C ausgehende Höhe in den Dreiecken  $T'_{(1,2,3)}$ ,

$T''_{(1,2,3)}$ ,  $T'''_{(1,2,3)}$  mit  $S'_{(1,2,3)}$ ,  $S''_{(1,2,3)}$ ,  $S'''_{(1,2,3)}$ , so ist

$$S'_{(1,2,3)} = \frac{r \cdot h_1}{e_{(1,2,3)}}, S''_{(1,2,3)} = \frac{r \cdot h_2}{e_{(1,2,3)}}, S'''_{(1,2,3)} = \frac{r \cdot h_3}{e_{(1,2,3)}}.$$

Denn in den Dreiecken  $T'_{(1,2,3)}$  und  $t'_{(1,2,3)}$  sind  $V_{(1)} W_{(1)}$  und  $D_{(1)} E_{(1)}$  homologe Seiten, also muss nach 3) und §. 2, (5)

$2 \mathcal{A} = \frac{a}{r} \cdot e_{(1,2,3)} \cdot S'_{(1,2,3)}$ , also  $S'_{(1,2,3)} = \frac{r}{e_{(1,2,3)}} \cdot \frac{2 \mathcal{A}}{a} = \frac{r \cdot h_1}{e_{(1,2,3)}}$  sein. In gleicher Weise ergibt sich das Uebrige. Hieraus folgt sogleich

$$6. S'_{(1,2,3)} : h_1 = S''_{(1,2,3)} : h_2 = S'''_{(1,2,3)} : h_3 = r : e_{(1,2,3)} \text{ und}$$

$$7. e \cdot S' = e_1 \cdot S'_1 = e_2 \cdot S'_2 = e_3 \cdot S'_3 = r \cdot h_1, e \cdot S'' = e_1 \cdot S''_1 = e_2 \cdot S''_2 = e_3 \cdot S''_3 = r \cdot h_2, \\ e \cdot S''' = e_1 \cdot S'''_1 = e_2 \cdot S'''_2 = e_3 \cdot S'''_3 = r \cdot h_3.$$

8. Bezeichnen  $R'_{(1,2,3)}$ ,  $R''_{(1,2,3)}$ ,  $R'''_{(1,2,3)}$  die Radien der um die Dreiecke  $T'_{(1,2,3)}$ ,

$T''_{(1,2,3)}$ ,  $T'''_{(1,2,3)}$  beschriebenen Kreise, so ist  $T'_{(1,2,3)} = \frac{R'_{(1,2,3)}}{e_{(1,2,3)}} \cdot \mathcal{A}$ ,  $T''_{(1,2,3)} = \frac{R''_{(1,2,3)}}{e_{(1,2,3)}} \cdot \mathcal{A}$ ,

$$T'''_{(1,2,3)} = \frac{R'''_{(1,2,3)}}{e_{(1,2,3)}} \cdot \mathcal{A}.$$

Denn da  $R'_{(1,2,3)}$  und  $e_{(1,2,3)}$  homologe Linien in den ähnlichen Dreiecken  $T'_{(1,2,3)}$  und  $t'_{(1,2,3)}$  sind, so ergibt sich die Behauptung sogleich aus §. 2 (4), Anm. 1.

$$9. \frac{T' \cdot T'_1 \cdot T'_2 \cdot T'_3}{R' \cdot R'_1 \cdot R'_2 \cdot R'_3} = \frac{T'' \cdot T''_1 \cdot T''_2 \cdot T''_3}{R'' \cdot R''_1 \cdot R''_2 \cdot R''_3} = \frac{T''' \cdot T'''_1 \cdot T'''_2 \cdot T'''_3}{R''' \cdot R'''_1 \cdot R'''_2 \cdot R'''_3} = \frac{\mathcal{A}^4}{e \cdot e_1 \cdot e_2 \cdot e_3}$$

Denn nach 8) ist  $\frac{T'}{R'} = \frac{\mathcal{A}}{e}$ ,  $\frac{T'_1}{R'_1} = \frac{\mathcal{A}}{e_1}$ ,  $\frac{T'_2}{R'_2} = \frac{\mathcal{A}}{e_2}$ ,  $\frac{T'_3}{R'_3} = \frac{\mathcal{A}}{e_3}$ , woraus sich durch Multiplication die Behauptung ergibt.

$$10. \frac{R' \cdot R'_1}{R'_2 \cdot R'_3} = \frac{e \cdot e_1}{e_2 \cdot e_3}, \frac{R'' \cdot R''_1}{R''_2 \cdot R''_3} = \frac{e \cdot e_2}{e_1 \cdot e_3}, \frac{R''' \cdot R'''_1}{R'''_2 \cdot R'''_3} = \frac{e \cdot e_3}{e_1 \cdot e_2}.$$

Denn nach §. 2 (8) ist  $T' \cdot T_1' = T_2' \cdot T_3'$ , also nach 8)  $\frac{R'}{e} \cdot \mathcal{A} \cdot \frac{R_1'}{e_1} \cdot \mathcal{A} = \frac{R_2'}{e_2} \cdot \mathcal{A} \cdot \frac{R_3'}{e_3} \cdot \mathcal{A}$ , daher  $\frac{R' \cdot R_1'}{e \cdot e_1} = \frac{R_2' \cdot R_3'}{e_2 \cdot e_3}$ , oder  $\frac{R' \cdot R_1'}{R_2' \cdot R_3'} = \frac{e \cdot e_1}{e_2 \cdot e_3}$ .

$$11. R'_{(1)} + R''_{(1)} = R''_{(1)} + e_{(1)} \quad \text{und} \quad R''_{2(3)} + R'''_{2(3)} = R'_{2(3)} + e_{2(3)}.$$

Denn wie aus der Figur sogleich zu erkennen ist, ist  $T' + T'' = T'' + \mathcal{A}$  und

$$T''_{2(3)} + T'''_{2(3)} = T'_{2(3)} + \mathcal{A}, \quad \text{also zufolge 8)} \quad \frac{R'_{(1)}}{e_{(1)}} \cdot \mathcal{A} + \frac{R'''_{(1)}}{e_{(1)}} \cdot \mathcal{A} = \frac{R'_{(1)}}{e_{(1)}} \cdot \mathcal{A} + \mathcal{A} \quad \text{und}$$

$$\frac{R''_{2(3)}}{e_{2(3)}} \cdot \mathcal{A} + \frac{R'''_{2(3)}}{e_{2(3)}} \cdot \mathcal{A} = \frac{R'_{2(3)}}{e_{2(3)}} \cdot \mathcal{A} + \mathcal{A}, \quad \text{woraus sich die Behauptung sogleich ergibt.}$$

$$12. R'_{(1,2,3)} = \frac{b \cdot c}{(a \mp b)(a \mp c)} \cdot e_{(1,2,3)}, \quad R''_{(1,2,3)} = \frac{a \cdot c}{(a \mp b)(b \mp c)} \cdot e_{(1,2,3)},$$

$$R'''_{(1,2,3)} = \frac{a \cdot b}{(a \mp c)(b \mp c)} \cdot e_{(1,2,3)}$$

$$\text{Zufolge 8) und §. 2 (6) ist } T'_{(1,2,3)} = \frac{R'_{(1,2,3)}}{e_{(1,2,3)}} \cdot \mathcal{A} = \frac{b \cdot c}{(a \mp b)(a \mp c)} \cdot \mathcal{A},$$

$$\text{also } R'_{(1,2,3)} = \frac{b \cdot c}{(a \mp b)(a \mp c)} \cdot e_{(1,2,3)}$$

$$13. V_{(1)} W_{(1)} = \frac{4 \mathcal{A}}{(a \mp b)(a \mp c)} \cdot e_{(1,2,3)}, \quad U_{(1)} W_{(1)} = \frac{4 \mathcal{A}}{(a \mp b)(b \mp c)} \cdot e_{(1,2,3)}$$

$$U_{(1)} V_{(1)} = \frac{4 \mathcal{A}}{(a \mp c)(b \mp c)} \cdot e_{(1,2,3)}$$

$$\text{Denn } V_{(1)} W_{(1)} = 2 \cdot R'_{(1,2,3)} \cdot \sin A = \frac{2 \cdot b \cdot c \cdot \sin A}{(a \mp b)(a \mp c)} \cdot e_{(1,2,3)} = \frac{4 \mathcal{A}}{(a \mp b)(a \mp c)} \cdot e_{(1,2,3)}$$

$$14. V_{(1)} W_{(1)} : U_{(1)} W_{(1)} : U_{(1)} V_{(1)} = (b \mp c) : (a \mp c) : (a \mp b). \quad \text{Folgt sogleich aus 13.}$$

$$15. \text{ Seien } i'_{(1,2,3)}, i''_{(1,2,3)}, i'''_{(1,2,3)} \text{ die Neigungswinkel der 4 Nulllinien gegen die Seiten } a, b, c, \text{ so ist } \sin i'_{(1,2,3)} : \sin i''_{(1,2,3)} : \sin i'''_{(1,2,3)} = V_{(1)} W_{(1)} : U_{(1)} W_{(1)} : U_{(1)} V_{(1)}.$$

Denn da  $CW_{(1)}$  und  $AU_{(1)}$  Halbierungslinien der Winkel  $U_{(1)}CV_{(1)}$  und  $V_{(1)}AW_{(1)}$  sind, so verhält sich  $V_{(1)}W_{(1)} : U_{(1)}W_{(1)} = CV_{(1)} : CU_{(1)} = \sin i'_{(1,2,3)} : \sin i''_{(1,2,3)}$  und  $U_{(1)}W_{(1)} : U_{(1)}V_{(1)} = AW_{(1)} : AV_{(1)} = \sin i''_{(1,2,3)} : \sin i'''_{(1,2,3)}$ , woraus sich die Behauptung ergibt.

$$16. \sin i'_{(3)} + \sin i'''_{(3)} = \sin i''_{(3)} \quad \text{und} \quad \sin i'_{1(2)} + \sin i'''_{1(2)} = \sin i''_{1(2)}.$$

Denn man erkennt sogleich aus der Figur, dass  $VW + UV = UW$ ,  $V_1W_1 + UW_1 = UV_1$ ,  $VW_1 + U_1W_1 = U_1V_1$ ,  $V_1W + U_1V_1 = U_1W$  ist, also muss zufolge 15) auch  $\sin i' + \sin i''' = \sin i''$ ,  $\sin i'_1 + \sin i'''_1 = \sin i''_1$ ,  $\sin i'_2 + \sin i'''_2 = \sin i''_2$ ,  $\sin i'_3 + \sin i'''_3 = \sin i''_3$  sein.

Hieraus ergibt sich folgender bemerkenswerthe Satz:

17. Trägt man in A an die Aussen- oder Innenseite von b den Winkel an, welchen resp. die innere und erste äussere, oder die zweite und dritte äussere Nulllinie mit der Seite c bildet, so schneidet der Schenkel des angetragenen Winkels die Peripherie des umschriebenen Kreises in einem Punkte, welcher in Bezug auf die innere und dritte äussere Nulllinie von der Ecke B, in Bezug auf die erste und zweite äussere von der Ecke C eben so weit entfernt ist, als von den andern beiden Ecken zusammengenommen.

Trägt man den Winkel, welchen die innere Nulllinie mit c bildet, d. i.  $i'''$  in AC an AC nach Aussen hin an und schneidet der Schenkel des angetragenen Winkels die Peripherie des umschriebenen Kreises in Z, so muss Z im Bogen AC liegen, da bekanntlich die äussere Halbirungslinie von A den Bogen AC schneidet und da  $i''' < 90^\circ - \frac{A}{2}$  sein muss, denn  $i'' + i''' = 180^\circ - A$  und zufolge 16)  $i'' > i'''$ . Verbindet man nun Z mit B und C, so ist  $\sphericalangle ZAC$  oder  $i''' = \sphericalangle ZBC$ , es ist aber  $\sphericalangle B = i' + i'''$  also  $\sphericalangle ABZ = i'$ , also auch  $\sphericalangle ACZ = i'$  und daher  $\sphericalangle BCZ = i''$ , da  $i'' = i' + C$ . Da nun aber jede Sehne gleich dem Producte aus dem Durchmesser des Kreises und dem Sinus des zugehörigen Peripheriewinkels ist, so ist  $AZ = 2r \cdot \sin i'$ ,  $BZ = 2r \sin i''$ ,  $CZ = 2r \sin i'''$ . Es ist aber nach 16)  $\sin i' + \sin i''' = \sin i''$ , also auch  $2r \cdot \sin i' + 2r \cdot \sin i''' = 2r \cdot \sin i''$ , d. h.  $AZ + CZ = BZ$ . In gleicher Weise ergibt sich die Behauptung für die übrigen Nulllinien.

Anm. 1. Für das ungleichseitige Dreieck giebt es hiernach in der Peripherie des umschriebenen Kreises 4 Punkte von der Beschaffenheit, dass die Entfernung eines jeden derselben von einer Ecke (Scheitel der beiden kleineren Winkel) so gross ist, als von den beiden andern zusammengenommen. Es giebt aber nur einen Punkt, bei welchem die grösste Entfernung zwischen den beiden andern liegt: derselbe liegt in dem Bogen des mittleren Winkels und wird mit Hilfe der inneren Nulllinie gefunden. Dieser eine Punkt geht für das gleichseitige Dreieck in die Gesamtheit der Punkte der Peripherie über, da für dasselbe die innere Nulllinie in der Unendlichkeit liegt, also in jeder Richtung liegend gedacht werden kann. Die drei andern Punkte sind die Ecken des gleichseitigen Dreiecks. Beim gleichschenkligen Dreiecke fallen 2 von jenen 4 Punkten mit der Spitze zusammen.

Anm. 2. Der eben erwähnte Satz kann auch folgender Massen ausgesprochen werden: Schlägt man einen Kreis um den Mittelpunkt eines Berührungskreises mit seiner Entfernung von dem Mittelpunkt des umschriebenen Kreises, zieht man in diesem durch den Mittelpunkt des umschriebenen Kreises zu 2 Dreiecksseiten parallele Sehnen und durch die von den beiden Seiten gebildete Ecke eine Parallele zu der Linie, welche die andern Endpunkte der parallelen Sehnen verbindet, so schneidet diese den umschriebenen Kreis in einem Punkte, dessen Entfernung von einer Ecke des Dreiecks so gross ist, als von den beiden andern zusammen genommen.

§. 4. In der Einleitung sind für eine Anzahl bestimmter Punkte (die natürlich bedeutend vermehrt werden kann, wobei man zu beachtenswerthen Resultaten gelangt) Formeln aufgestellt, die man als unentwickelte Entfernungssummen dieser Punkte, wie auch dort gezeigt ist, ansehen kann. Sie haben aber noch eine weitere Bedeutung, da durch §. 3 (5) die Entfernung der Ecken des Dreiecks, also auch die Entfernung der in der Einleitung betrachteten Punkte von den Nulllinien festgestellt ist. Will man die Entfernung jener Punkte von der inneren Nulllinie erhalten, so hat man nur  $\frac{S'}{h_1} = \frac{S''}{h_2} = \frac{S'''}{h_3} = \frac{r}{e}$  zu setzen, da die Punkte A, B, C sämmtlich auf derselben Seite dieser Nulllinie liegen; will man dagegen die Entfernung jener Punkte von der ersten äusseren Nulllinie haben, so muss man

zuerst  $S'$  (oder  $S''$  und  $S'''$ ) negativ setzen, da für diese Nulllinie A mit B und C auf verschiedenen Seiten liegt, und darnach  $\frac{S'}{h_1} = \frac{S''}{h_2} = \frac{S'''}{h_3} = \frac{r}{e_1}$ . Bei der zweiten und dritten äusseren Nulllinie setzt man zuerst  $S''$  resp.  $S'''$  negativ und darnach die Werthe aus §. 3 (6) ein. Wird die Bezeichnung in der Einleitung für die innere Nulllinie beibehalten und für die erste, zweite, dritte äussere Nulllinie an d der Index 1, 2, 3 gesetzt, so ergeben sich folgende Entfernungen der Punkte  $D_{(1)}$ ,  $E_{(1)}$ ,  $F_{(1)}$ ,  $G_{(1)}$ ,  $H_{(1)}$ ,  $J_{(1)}$  von der inneren Nulllinie:

$$\begin{aligned} 1. \quad d(D) = d(E) &= (a + c - a) \cdot \frac{e}{r} \cdot \sin A, & d(F) = d(G) &= (a + c - b) \cdot \frac{e}{r} \cdot \sin B, \\ d(G_1) &= (b + c - a) \cdot \frac{e}{r} \cdot \sin B, & d(E_1) &= (a + c - b) \cdot \frac{e}{r} \cdot \sin A, \\ d(J_1) &= (b + c - a) \cdot \frac{e}{r} \cdot \sin C, & d(H_1) &= (a + c - b) \cdot \frac{e}{r} \cdot \sin C, \\ d(H) = d(J) &= (a + b - c) \cdot \frac{e}{r} \cdot \sin C \\ d(D_1) &= (a + b - c) \cdot \frac{e}{r} \cdot \sin A \\ d(F_1) &= (a + b - c) \cdot \frac{e}{r} \cdot \sin B \end{aligned}$$

woraus sogleich noch folgt  $d(D, E) + d(D_1) + d(E_1) = (a + b + c) \cdot \frac{e}{r} \cdot \sin A$ ,  
 $d(F, G) + d(F_1) + d(G_1) = (a + b + c) \cdot \frac{e}{r} \cdot \sin B$ ,  
 $d(H, J) + d(H_1) + d(J_1) = (a + b + c) \cdot \frac{e}{r} \cdot \sin C$ .

Da nun  $\sin A : \sin B : \sin C = a : b : c$  sich verhält, so sind in diesen Ausdrücken 4 Ternionen von Linien enthalten, die dasselbe Verhältniss wie die Seiten des Urdreiecks haben, die also dem Urdreiecke ähnliche Dreiecke ergeben. Ein Gleiches ergibt sich für die 3 andern Nulllinien, wenn man die dabei sich ergebende Negativität, die sich ja nur auf die besondere Lage der Senkrechten bezieht, ausser Acht lässt. Fügt man hierzu noch die Quaternion von Dreiecken, die sich, wie man aus der Einleitung erkennt, aus den Entfernungssummen jener Punkte ergeben, so erhält man im Ganzen 5 Quaternionen von Dreiecken, die dem Urdreiecke ähnlich sind. Ihre Betrachtung führt, wie in Jacobi's äusseren Entfernungsrörtern an der letzten Quaternion erwiesen ist, zu interessanten Resultaten, es kann jedoch dieselbe wegen mangelnden Raumes hier nicht erfolgen.

Bestimmt man in der angegebenen Weise die Entfernung der Punkte  $U_{(1)}$ ,  $V_{(1)}$ ,  $W_{(1)}$  von den Nulllinien, so ergibt sich

$$\begin{aligned} 2. \quad d_1(U_1) &= \frac{4 \mathcal{A} \cdot r}{(b + c) \cdot e_1}, & d(U_1) &= \frac{4 \mathcal{A} \cdot r}{(b + c) \cdot e}, & d_3(U) &= \frac{4 \mathcal{A} \cdot r}{(b - c) \cdot e_3}, & d_2(U) &= \frac{-4 \mathcal{A} \cdot r}{(b - c) \cdot e_2} \\ d_2(V_1) &= \frac{4 \mathcal{A} \cdot r}{(a + c) \cdot e_2}, & d_3(V) &= \frac{4 \mathcal{A} \cdot r}{(a - c) \cdot e_3}, & d(V_1) &= \frac{4 \mathcal{A} \cdot r}{(a + c) \cdot e}, & d_1(V) &= \frac{-4 \mathcal{A} \cdot r}{(a - c) \cdot e_1} \\ d_3(W_1) &= \frac{4 \mathcal{A} \cdot r}{(a + b) \cdot e_3}, & d_2(W) &= \frac{4 \mathcal{A} \cdot r}{(a - b) \cdot e_2}, & d_1(W) &= \frac{-4 \mathcal{A} \cdot r}{(a - b) \cdot e_1}, & d(W_1) &= \frac{4 \mathcal{A} \cdot r}{(a + b) \cdot e} \end{aligned}$$

2\*

Bezeichnet man nun die durch die 4 Nulllinien bestimmten 4 Dreiecke durch  $\tau_{(1,2,3)}$ , so dass  $\tau$  von den 3 äusseren Nulllinien,  $\tau_1$  von der inneren und zweiten und dritten äusseren,  $\tau_2$  von der inneren und ersten und dritten äusseren und  $\tau_3$  von der inneren und ersten und zweiten äusseren gebildet wird, so sind die berechneten Entfernungen der Reihe nach die Höhen dieser Dreiecke und daher zufolge § 3 (13) und weil  $a \cdot b \cdot c = 4 \mathcal{A} \cdot r$  ist

$$\tau = \frac{1}{2} \cdot V_1 W_1 \cdot d_1(U_1) = \frac{2 \mathcal{A} \cdot e_1}{(a+b)(a+c)} \cdot \frac{4 \mathcal{A} \cdot r}{(b+c) \cdot e_1} = \frac{2 a b c \mathcal{A}}{(a+b)(a+c)(b+c)}$$

$$3. \quad \tau_1 = \frac{1}{2} \cdot V W \cdot d(U_1) = \frac{2 \mathcal{A} \cdot e}{(a-b)(a-c)} \cdot \frac{4 \mathcal{A} \cdot r}{(b+c) \cdot e} = \frac{2 a b c \mathcal{A}}{(a-b)(a-c)(b+c)}$$

$$\tau_2 = \frac{1}{2} \cdot U W \cdot d(V_1) = \frac{2 \mathcal{A} \cdot e}{(a-b)(b-c)} \cdot \frac{4 \mathcal{A} \cdot r}{(a+c) \cdot e} = \frac{2 a b c \mathcal{A}}{(a-b)(a+c)(b-c)}$$

$$\tau_3 = \frac{1}{2} \cdot U V \cdot d(W_1) = \frac{2 \mathcal{A} \cdot e}{(a-c)(b-c)} \cdot \frac{4 \mathcal{A} \cdot r}{(a+b) \cdot e} = \frac{2 a b c \mathcal{A}}{(a+b)(a-c)(b-c)}$$

Hieraus ergibt sich sogleich

$$4. \quad \tau : \tau_1 : \tau_2 : \tau_3 = \frac{a-b}{a+b} \cdot \frac{a-c}{a+c} \cdot \frac{b-c}{b+c} : \frac{b-c}{b+c} : \frac{a-c}{a+c} : \frac{a-b}{a+b}$$

Bedeute  $r_{(1,2,3)}$ ,  $r'_{(1,2,3)}$ ,  $r''_{(1,2,3)}$ ,  $r'''_{(1,2,3)}$  bezüglich die Radien des innern und der 3 äusseren Berührungskreise der Dreiecke  $\tau$ ,  $\tau_1$ ,  $\tau_2$ ,  $\tau_3$ , so ergibt sich aus den bekannten Formeln

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3}, \quad \frac{1}{\rho_1} = \frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3} - \frac{1}{h_1} \text{ u. s. w.}$$

$$5. \quad r = \frac{4 \mathcal{A} \cdot r}{(b+c) \cdot e_1 + (a+c) \cdot e_2 + (a+b) \cdot e_3}, \quad r' = \frac{4 \mathcal{A} \cdot r}{(b+c) \cdot e + (a-b) \cdot e_2 + (a-c) \cdot e_3}$$

$$r'' = \frac{4 \mathcal{A} \cdot r}{(a+c) \cdot e + (a-b) \cdot e_1 + (b-c) \cdot e_3}, \quad r''' = \frac{4 \mathcal{A} \cdot r}{(a+b) \cdot e + (a-c) \cdot e_1 + (b-c) \cdot e_2}$$

Denn zufolge 2) ist  $\frac{1}{r} = \frac{(b+c) \cdot e_1}{4 \mathcal{A} \cdot r} + \frac{(a+c) \cdot e_2}{4 \mathcal{A} \cdot r} + \frac{(a+b) \cdot e_3}{4 \mathcal{A} \cdot r}$ , woraus sich durch

Addition und Umkehren des Bruches der Werth von  $r$  ergibt. Aus diesen Formeln kann man sogleich die Formeln für die Radien der äusseren Berührungskreise der Dreiecke  $\tau_{(1,2,3)}$  ableiten, wenn man der Reihe nach einen der 3 Summanden im Nenner negativ setzt.

Legt man durch jede Ecke des Urdreiecks zu derjenigen Seite eines jeden von den Nulllinien gebildeten Dreiecks, welche zwischen den Schenkeln des Winkels der Ecke liegt, Parallelen, also durch A zu  $V_{(1)} W_{(1)}$ , durch B zu  $U_{(1)} W_{(1)}$  und durch C zu  $U_{(1)} V_{(1)}$ , so ergeben sich 4 Dreiecke  $\delta_{(1,2,3)}$ , welche den Dreiecken  $\tau_{(1,2,3)}$  ähnlich sind, und nach einem bekannten Satze zu  $\tau_{(1,2,3)}$  und  $\mathcal{A}$  die dritte Proportionale bilden. Daher ergibt sich

$$6. \quad \delta = \frac{(a+b)(a+c)(b+c) \cdot \mathcal{A}}{2 abc}, \quad \delta_1 = \frac{(a-b)(a-c)(b+c) \cdot \mathcal{A}}{2 abc},$$

$$\delta_2 = \frac{(a-b)(a+c)(b-c) \cdot \mathcal{A}}{2 abc}, \quad \delta_3 = \frac{(a+b)(a-c)(b-c) \cdot \mathcal{A}}{2 abc}.$$

7. Aus 2) ergeben sich nun zufolge §. 2 (5) und Anmerkung sogleich die Seiten dieser Dreiecke, nämlich für  $\delta$ ,  $\frac{(b+c) \cdot e_1}{2r}$ ,  $\frac{(a+c) \cdot e_2}{2r}$ ,  $\frac{(a+b) \cdot e_3}{2r}$ , für  $\delta_1$ ,  $\frac{(b+c) \cdot e}{2r}$ ,  $\frac{(a-b) \cdot e_2}{2r}$ ,  $\frac{(a-c) \cdot e_3}{2r}$ , für  $\delta_2$ ,  $\frac{(a+c) \cdot e}{2r}$ ,  $\frac{(a-b) \cdot e_1}{2r}$ ,  $\frac{(b-c) \cdot e_3}{2r}$ , für  $\delta_3$ ,  $\frac{(a+b) \cdot e}{2r}$ ,  $\frac{(a-c) \cdot e_1}{2r}$ ,  $\frac{(b-c) \cdot e_2}{2r}$ . Dann  $2A : \frac{4A \cdot r}{(b+c) \cdot e_1} = \frac{(b+c) \cdot e_1}{2r}$  u. s. w.

Bezeichnet man die Radien der um  $\delta_{(1,2,3)}$  beschriebenen Kreise mit  $\mathfrak{R}_{(1,2,3)}$ , so ergibt sich mit Hülfe der Formel  $r = \frac{a \cdot b \cdot c}{4A}$ .

$$8. \quad \mathfrak{R} = \frac{e_1}{r} \cdot \frac{e_2}{r} \cdot \frac{e_3}{r} \cdot \frac{r}{4}, \quad \mathfrak{R}_1 = \frac{e}{r} \cdot \frac{e_2}{r} \cdot \frac{e_3}{r} \cdot \frac{r}{4}, \quad \mathfrak{R}_2 = \frac{e}{r} \cdot \frac{e_1}{r} \cdot \frac{e_3}{r} \cdot \frac{r}{4}, \\ \mathfrak{R}_3 = \frac{e}{r} \cdot \frac{e_1}{r} \cdot \frac{e_2}{r} \cdot \frac{r}{4}$$

$$\text{Denn } \mathfrak{R} = \frac{(b+c) \cdot e_1}{2r} \cdot \frac{(a+c) \cdot e_2}{2r} \cdot \frac{(a+b) \cdot e_3}{2r} \cdot \frac{abc}{2(a+b)(a+c)(b+c)A} = \\ \frac{e_1}{r} \cdot \frac{e_2}{r} \cdot \frac{e_3}{r} \cdot \frac{a \cdot b \cdot c}{16A} = \frac{e_1}{r} \cdot \frac{e_2}{r} \cdot \frac{e_3}{r} \cdot \frac{r}{4}$$

Hieraus folgt sogleich

$$9. \quad \mathfrak{R} : \mathfrak{R}_1 : \mathfrak{R}_2 : \mathfrak{R}_3 = \frac{1}{e} : \frac{1}{e_1} : \frac{1}{e_2} : \frac{1}{e_3}$$

§. 5. Beim Aufsuchen der Verallgemeinerung des Satzes vom gleichseitigen Dreiecke, dass die Entfernungssumme jedes Punctes (die Senkrechten nach der Innenseite der Dreiecksseiten positiv genommen) gleich der Höhe ist, kommt Jacobi einerseits auf die sogenannten Entfernungsorter, andererseits auf den Satz, dass die algebraische Summe der Normalquotienten eines Punctes der Einheit gleich ist. Wegen Verkennung der Hauptlinien für die Entfernungssummen (Nulllinien) bleibt ihm unbekannt, dass der letztere Satz derjenige allgemeine Satz ist, welcher den Satz von der Entfernungssumme für das gleichseitige Dreieck eben so wohl in sich schliesst, wie für das gleichseitige.

Seien  $x_1, x_2, x_3$  die von einem Puncte X auf die Seiten a, b, c gefällten Senkrechten, welche auf der Innenseite der Dreiecksseiten positiv genommen werden sollen, so ist  $\frac{x_1}{h_1} + \frac{x_2}{h_2} + \frac{x_3}{h_3} = 1$ .

Denn es ist  $XBC + XAC + XAB = A$  oder  $\frac{1}{2}a \cdot x_1 + \frac{1}{2}b \cdot x_2 + \frac{1}{2}c \cdot x_3 = A$ , woraus sich die Behauptung durch Division mit A ergibt.

Hieraus folgt, wenn  $d_{(1,2,3)}$  die Entfernung des Punctes X von der innern resp. der ersten, zweiten, dritten äusseren Nulllinie bezeichnet, und wenn  $d_{(1,2,3)}$  auf derjenigen Seite der Nulllinien, auf welcher die grössere Anzahl der Ecken des Urdreiecks liegt, positiv genommen wird, was wegen der entsprechenden Lage der Seiten  $V_{(1)}W_{(1)}, U_{(1)}W_{(1)}, U_{(1)}V_{(1)}$  in den Dreiecken  $AV_{(1)}W_{(1)}, BU_{(1)}W_{(1)}, CU_{(1)}V_{(1)}$  mit den Seiten a, b, c des Urdreiecks geschehen muss:

$$\begin{aligned} \text{I} \quad x_1 + x_2 + x_3 &= \frac{d \cdot h_1}{S'} = \frac{d \cdot h_2}{S''} = \frac{d \cdot h_3}{S'''} = \frac{d \cdot e}{r} \\ \text{II} \quad -x_1 + x_2 + x_3 &= \frac{d_1 \cdot h_1}{S_1'} = \frac{d_1 \cdot h_2}{S_1''} = \frac{d_1 \cdot h_3}{S_1'''} = \frac{d_1 \cdot e_1}{r} \\ \text{III} \quad x_1 - x_2 + x_3 &= \frac{d_2 \cdot h_1}{S_2'} = \frac{d_2 \cdot h_2}{S_2''} = \frac{d_2 \cdot h_3}{S_2'''} = \frac{d_2 \cdot e_2}{r} \\ \text{IV} \quad x_1 + x_2 - x_3 &= \frac{d_3 \cdot h_1}{S_3'} = \frac{d_3 \cdot h_2}{S_3''} = \frac{d_3 \cdot h_3}{S_3'''} = \frac{d_3 \cdot e_3}{r} \end{aligned}$$

Nach dem voranstehenden Satze ist im Bezug auf Dreieck ABC  $\frac{x}{h_1} + \frac{x_2}{h_2} + \frac{x_3}{h_3} = 1$ , ferner im Bezug auf Dreieck CUV  $\frac{x_1}{P''} + \frac{x_2}{P'} + \frac{d}{S''} = 1$ , also, wenn man die zweite Gleichung von der ersten subtrahirt und  $\frac{d}{S''}$  transponirt,

$x_1 \cdot \left(\frac{1}{h_1} - \frac{1}{P''}\right) + x_2 \cdot \left(\frac{1}{h_2} - \frac{1}{P'}\right) + \frac{x_3}{h_3} = \frac{d}{S''}$  und zufolge §. 2 (11)  $\frac{x_1}{h_3} + \frac{x_2}{h_3} + \frac{x_3}{h_3} = \frac{d}{S''}$  oder  $x_1 + x_2 + x_3 = \frac{d \cdot h_3}{S''}$ , woraus mit Hülfe von §. 3 (6) folgt

$$\text{I} \quad x_1 + x_2 + x_3 = \frac{d \cdot h_1}{S'} = \frac{d \cdot h_2}{S''} = \frac{d \cdot h_3}{S'''} = \frac{d \cdot e}{r}$$

Mit Berücksichtigung der positiven und negativen Lage von  $d_{1(2,3)}$  ergibt sich

$$\text{im Bezug auf Dreieck } AV_1W_1, \quad -\frac{d_1}{S_1'} + \frac{x_2}{P_1'''} + \frac{x_3}{P_1''} = 1$$

$$\text{und im Bezug auf Dreieck } BU_1W_1, \quad -\frac{d_2}{S_2''} + \frac{x_1}{P_2'''} + \frac{x_3}{P_2'} = 1$$

$$\text{endlich im Bezug auf Dreieck } CU_1V_1, \quad -\frac{d_3}{S_3'''} + \frac{x_1}{P_3''} + \frac{x_2}{P_3'} = 1$$

Hieraus folgt II, III, IV, wenn man die erste Gleichung von diesen der Reihe nach subtrahirt und die vorher citirten Sätze anwendet.

Anm. 1. Man kann auch die von den betreffenden Nulllinien mit den andern Dreiecksseiten gebildeten Dreiecke nehmen, wenn man nach der Lage der  $x$  die Vorzeichen derselben wählt.

Anm. 2. Bedeuten  $\xi_1, \xi_2, \xi_3$  Linien aus dem Punkte X, welche gegen die Seiten  $a, b, c$  gleich geneigt sind, und sei  $\varphi$  der Neigungswinkel, so ist, wenn entsprechend den Zeichen der  $x$  die nach der Innen-

seite der Dreiecksseiten führenden  $\xi$  positiv genommen werden,  $\xi_1 = \frac{x_1}{\sin \varphi}$ ,  $\xi_2 = \frac{x_2}{\sin \varphi}$ ,  $\xi_3 = \frac{x_3}{\sin \varphi}$

also  $\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{\sin \varphi} = \frac{d \cdot e}{r \cdot \sin \varphi}$  u. s. w. Es gelten also obige Sätze auch für schiefe, unter gleichem Winkel gegen die Dreiecksseiten geneigte Linien, wenn man die Entfernungssummen durch den Sinus des Neigungswinkels dividirt.

In Worten lautet dieser bemerkenswerthe Satz:

Nimmt man die aus einem Punkte auf die Dreiecksseiten gefällten Senkrechten nach der Innenseite aller Dreiecksseiten oder nach der Aussenseite von  $a, b, c$  und der Innenseite der beiden andern positiv an, so verhält sich die Entfernungssumme dieses Punktes zu seiner Entfernung von der inneren oder zu  $a, b, c$  gehörigen äusseren Nulllinie, wie die Entfernung einer Ecke des Urdreiecks von der Gegenseite zur Entfernung dieser Ecke von der inneren oder zu  $a, b, c$  gehörigen äusseren Nulllinie, wie die Excentricität des

inneren oder zu a, b, c gehörigen äusseren Berührungskreises zum Radius des umschriebenen Kreises.

Die obigen Entfernungssummen oder  $\sum_{(1,2,3)}$  sollen der Reihe nach die innere, und erste, zweite, dritte äussere genannt werden, und ihnen, wie auch den entsprechenden Nulllinien soll die innere, und die erste, zweite, dritte äussere Excentricität zugehörig heissen.

Aus obigen Gleichungen folgt nun:

1. Kennt man die Entfernung eines Punctes von einer der Nulllinien, so kennt man auch die betreffende Entfernungssumme.

Für einen Punct in einer der Nulllinien ist die Entfernung von dieser, also auch die betreffende Entfernungssumme = 0, woher der Name „Nulllinien“.

Ist die Entfernung eines Punctes von einer Nulllinie = r, so ist die betreffende Entfernungssumme gleich der zur Nulllinie zugehörigen Excentricität.

Ist die Entfernung eines Punctes von der inneren, oder ersten, zweiten, dritten äusseren Nulllinie gleich der zugehörigen Excentricität, so ist die betreffende Entfernungssumme doppelt so gross als  $e_{(1,2,3)}$  d. i. die Entfernung des Mittelpunctes des zu der Excentricität gehörigen Berührungskreises vom Mittelpuncte des alle Seiten halbirenden Kreises, da bekanntlich  $e_{(1,2,3)}^2 = 2 r \cdot e_{(1,2,3)}$  ist.

Ist die Entfernung eines Punctes von einer Nulllinie = a, b, c, so ist die betreffende Entfernungssumme bezüglich =  $D_{(1)} E_{(1)}$ ,  $F_{(1)} G_{(1)}$ ,  $H_{(1)} J_{(1)}$ , da nach §. 3 (3) Anmerkung

$$D_{(1)} E_{(1)} = \frac{a \cdot e_{(1,2,3)}}{r}, \quad F_{(1)} G_{(1)} = \frac{b \cdot e_{(1,2,3)}}{r}, \quad H_{(1)} J_{(1)} = \frac{c \cdot e_{(1,2,3)}}{r} \text{ ist. U. s. w.}$$

2.  $d_{(1,2,3)} = \frac{r \cdot \sum_{(1,2,3)}}{e_{(1,2,3)}}$  d. h. kennt man von einem Puncte seine innere, oder erste, zweite, dritte äussere Entfernungssumme, so kennt man auch seine Entfernung von der inneren oder ersten, zweiten, dritten äusseren Nulllinie.

3. Alle Puncte in gleicher Entfernung von einer der Nulllinien d. h. alle Puncte einer Parallelen zu einer der Nulllinien haben gleiche, der Nulllinie entsprechende Entfernungssumme.

Bekanntlich ist die innere, und erste, zweite, dritte Entfernungssumme

von A	$h_1,$	$-h_1,$	$h_1,$	$h_1$
B	$h_2,$	$h_2,$	$-h_2,$	$h_3$
C	$h_3,$	$h_3,$	$h_3,$	$-h_3$
M	$r + e,$	$\frac{1}{4}(e + e_1),$	$\frac{1}{4}(e + e_2),$	$\frac{1}{4}(e + e_3)$
O	$3e,$	$e,$	$e,$	$e$
$O_1$	$e_1,$	$3e_1,$	$-e_1,$	$-e_1$

von Schwerpunkte  $\frac{1}{3}(h_1 + h_2 + h_3), \frac{1}{3}(h_2 + h_3 - h_1), \frac{1}{3}(h_1 + h_3 - h_2), \frac{1}{3}(h_1 + h_2 - h_3)$  u. s. w., also haben alle Puncte der Parallelen, welche durch einen der erwähnten Puncte zur inneren oder ersten, zweiten, dritten äusseren Nulllinie gezogen ist, die angeführte Entfernungssumme.

4. Die Entfernungssummen zweier Parallelen zu einer der Nulllinien (d. h. der Puncte in diesen Parallelen) verhalten sich wie ihre Entfernungen von der Nulllinie.

Denn wenn  $\Sigma_{(1,2,3)}$  und  $\Sigma'_{(1,2,3)}$  die Entfernungssummen der beiden Parallelen und  $d$  und  $d'$  ihre Entfernungen von einer Nulllinie bedeuten, so ist

$$\Sigma_{(1,2,3)} : \Sigma'_{(1,2,3)} = \frac{d \cdot e_{(1,2,3)}}{r} : \frac{d' \cdot e_{(1,2,3)}}{r} = d : d'$$

Daher ist die Entfernungssumme einer Parallelen, welche von der inneren Nulllinie 3mal so weit entfernt ist, als der Schwerpunkt,  $= h_1 + h_2 + h_3$ , die Entfernungssumme einer Parallelen, welche von der inneren Nulllinie  $\frac{1}{3}$ mal so weit entfernt ist, als der Mittelpunkt des umschriebenen Kreises,  $= \rho$  u. s. w.

5. Die Entfernungssummen von Parallelen, welche in gleicher (natürlich auch dem Vorzeichen nach) Entfernung von den Nulllinien gezogen sind, verhalten sich wie die den Nulllinien zugehörigen Excentricitäten.

Denn wenn  $d$  die Entfernung der Parallelen von den Nulllinien ist, so ist

$$\Sigma : \Sigma_1 : \Sigma_2 : \Sigma_3 = \frac{d \cdot e}{r} : \frac{d \cdot e_1}{r} : \frac{d \cdot e_2}{r} : \frac{d \cdot e_3}{r} = e : e_1 : e_2 : e_3$$

6. Verhalten sich die Entfernungen von Parallelen zu den 4 Nulllinien wie die reciproken Werthe der den Nulllinien zugehörigen Excentricitäten, so sind die Entfernungssummen dieser Parallelen einander gleich.

Denn  $\Sigma : \Sigma_1 : \Sigma_2 : \Sigma_3 = d \cdot e : d_1 \cdot e_1 : d_2 \cdot e_2 : d_3 \cdot e_3$  also

$$\frac{\Sigma}{e} : \frac{\Sigma_1}{e_1} : \frac{\Sigma_2}{e_2} : \frac{\Sigma_3}{e_3} = d : d_1 : d_2 : d_3 = \frac{1}{e} : \frac{1}{e_1} : \frac{1}{e_2} : \frac{1}{e_3} \text{ und daher}$$

$$\Sigma = \Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma_3$$

7. Die Entfernungssummen von Parallelen, welche bezüglich in der Entfernung  $\mathfrak{R}$ ,  $\mathfrak{R}_1$ ,  $\mathfrak{R}_2$ ,  $\mathfrak{R}_3$  zu der inneren und ersten, zweiten, dritten äusseren Nulllinie gezogen sind,

$$\text{sind} = \frac{e}{r} \cdot \frac{e_1}{r} \cdot \frac{e_2}{r} \cdot \frac{e_3}{r} \cdot \frac{r}{4}$$

Denn zufolge 6 und §. 4 (9) sind die Entfernungssummen einander gleich, und, da die Entfernung von der inneren Nulllinie  $= \mathfrak{R}$  ist, so muss  $\Sigma = \frac{\mathfrak{R} \cdot e}{r}$ , oder nach

$$\S. 4 (8) = \frac{e}{r} \cdot \frac{e_1}{r} \cdot \frac{e_2}{r} \cdot \frac{e_3}{r} \cdot \frac{r}{4} \text{ sein.}$$

$$8. d \cdot e = d_1 \cdot e_1 + d_2 \cdot e_2 + d_3 \cdot e_3$$

Denn es ist  $x_1 + x_2 + x_3 = (-x_1 + x_2 + x_3) + (x_1 - x_2 + x_3) + (x_1 + x_2 - x_3)$ , also auch  $\frac{d \cdot e}{r} = \frac{d_1 \cdot e_1}{r} + \frac{d_2 \cdot e_2}{r} + \frac{d_3 \cdot e_3}{r}$  und  $d \cdot e = d_1 \cdot e_1 + d_2 \cdot e_2 + d_3 \cdot e_3$ .

Ist daher ein Punkt von 3 Nulllinien gleich weit entfernt, so verhält sich diese Entfernung zur Entfernung von der vierten Nulllinie, wie die der letzteren zugehörige Excentricität zur algebraischen Summe der 3 andern Excentricitäten.

$$9. x_1 = \frac{d \cdot h_1}{2 \cdot S'} - \frac{d_1 \cdot h_1}{2 \cdot S_1'} = \frac{d_2 \cdot h_1}{2 \cdot S_2'} + \frac{d_3 \cdot h_1}{2 \cdot S_3'}, x_2 = \frac{d \cdot h_2}{2 \cdot S''} - \frac{d_2 \cdot h_2}{2 \cdot S_2''} = \frac{d_1 \cdot h_2}{2 \cdot S_1''} + \frac{d_3 \cdot h_2}{2 \cdot S_3''}$$

$$x_3 = \frac{d \cdot h_3}{2 \cdot S'''} - \frac{d_3 \cdot h_3}{2 \cdot S_3'''} = \frac{d_1 \cdot h_3}{2 \cdot S_1'''} + \frac{d_2 \cdot h_3}{2 \cdot S_2'''}$$

Denn, wenn man II von I abzieht, sowie III und IV addirt, so erhält man  $2 x_1$ .

10. Zieht man durch eine Ecke des Urdreiecks eine Parallele zur Gegenseite, so schneidet diese die innere und die zu der Dreiecksseite zugehörige äussere Nulllinie, so wie auch jede der beiden andern äusseren in einem Punkte, welcher von der andern der beiden zusammen geordneten Nulllinie doppelt so weit entfernt ist, als die Ecke.

Denn, wenn die durch A zu a gezogene Parallele die innere Nulllinie in X schneidet, so ist für X  $d = 0$  und  $x_1 = h_1$ , also nach 9)  $h_1 = -\frac{d_1 \cdot h_1}{2 \cdot S_1'}$  oder  $d_1 = -2 \cdot S_1'$ .

11. Wenn ein Punkt in einer der 3 äusseren Nulllinien liegt, so ist seine Entfernung von der zu der Nulllinie zugehörigen Seite gleich der Hälfte der inneren Entfernungssumme des Punktes, von einer der beiden andern Seiten aber gleich der Hälfte derjenigen Entfernungssumme, welche der zur dritten Seite zugehörigen Nulllinie entspricht; wenn dagegen ein Punkt in der inneren Nulllinie liegt, so ist seine Entfernung von den Seiten a, b, c gleich der mit entgegengesetztem Vorzeichen genommenen Hälfte der ersten, zweiten, dritten äusseren Entfernungssumme.

Denn, wenn X in der ersten äusseren Nulllinie liegt, so ist  $d_1 = 0$ , also nach 9)  $x_1 = \frac{d \cdot h_1}{2 \cdot S_1'}$ ,  $x_2 = \frac{d_2 \cdot h_2}{2 \cdot S_2''}$ ,  $x_3 = \frac{d_3 \cdot h_3}{2 \cdot S_3'''}$ . Das Uebrige folgt ebenso.

Anm. Hieraus ergibt sich, wie man sogleich erkennt, eine leichte Construction des Ortes für diejenigen Punkte, welche eine vorgeschriebene innere, oder erste, zweite, dritte äussere Entfernungssumme haben sollen.

12. Eine zu einer Nulllinie gezogene Parallele trifft die drei übrigen Nulllinien in 3 Punkten so, dass dem absoluten Werthe nach die Entfernungen des einen Punktes von der Seite a, eines andern von der Seite b und des dritten von der Seite c einander und der jener Nulllinie entsprechenden halben Entfernungssumme der Parallelen gleich sind.

Denn treffe die in der Entfernung d zur innern Nulllinie gezogene Parallele die erste, zweite, dritte äussere Nulllinie in den Punkten X, Y, Z, und seien die aus diesen Punkten auf a, b, c gefällten Senkrechten  $x_{1(2,3)}$ ,  $y_{1(2,3)}$ ,  $z_{1(2,3)}$ , so muss, da für die Punkte X, Y, Z bezüglich  $d_1 = d_2 = d_3 = 0$  ist, nach 9)  $x_1 = \frac{d \cdot h_1}{2 \cdot S_1'}$ ,  $y_2 = \frac{d \cdot h_2}{2 \cdot S_2''}$ ,  $z_3 = \frac{d \cdot h_3}{2 \cdot S_3'''}$  also nach dem Hauptsatze dieses §.  $x_1 = y_2 = z_3 = \frac{1}{2} \Sigma$  sein. In gleicher Weise ergibt sich das Uebrige.

Es kann offenbar nicht davon die Rede sein, das Thema erschöpft zu haben, doch hoffe ich, dass nichts Wesentliches von mir übersehen ist; ich schliesse daher hiermit ab, und wünsche nur, dass die Arbeit nachsichtige Leser finden möge.

A. Dietrich.

## Schulnachrichten.

### I. Verfügungen des Königl. Provinzial-Schulcollegiums.

1868. Juni: Rabe Ansichten aus dem heiligen Lande mitgeteilt.  
 15. August: Die wissenschaftlichen Unternehmungen von Zacher und Höpfner für deutsche Philologie empfohlen.  
 20. Novbr.: Ministerial-Verfügung über die Atteste für einjährige Freiwillige mitgeteilt.  
 24. Novbr.: Ministerial-Verfügung über portopflichtige Dienstsachen mitgeteilt.  
 1869. 22. Januar: Die Kartenwerke von Raatz empfohlen.

### II. Lehrmittel.

Aus der Privat-Canzlei Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen gingen dem Gymnasium als Geschenk Sr. Königl. Hoheit die Fortsetzungen von Berghaus pommerschem Landbuche zu. Für dieses Geschenk spreche ich hier Namens der Anstalt ehrerbietigsten Dank aus.

### III. Lehrverfassung.

In den Pensen der einzelnen Klassen und in den Lehrbüchern ist keine Veränderung eingetreten.

Gelesen sind im verflossenen Schuljahre:

1) im Lateinischen:

in Prima: Cicero's Officien Buch I., Cicero's Academica Buch I. und ein Teil des zweiten (Lucullus), Abschnitte aus Cic. de Inventione I., Tacitus Annalen Buch I., Horaz Satiren Buch I. II. und Episteln Buch I.,

in Obersecunda: Cicero pro Milone und de imperio C. Pompeji, Virgil Aeneis Buch IV.—VI.,

in Untersecunda: Cicero pro Dejotaro, pro Ligario und pro Archia, Livius Buch 3 ff. Virgil Aeneis Buch II., VII. und ein Teil des achten Buches.

in Obertertia: Caesar B. G. Buch IV.—VII., und Abschnitte aus Ovid's Metamorphosen,

in Untertertia: einige Bücher des Curtius und Abschnitte aus Ovid's Metamorphosen.

In Quarta u. Quinta sind Nepos und neben ihm das Tirocinium von Siebelis, so wie Eutrop gelesen.

In Sexta wird das Tirocinium von O. Schulz gebraucht.

2) Im Griechischen:

in Prima: Plato's Crito, die Apologie, Laches u. Protagoras; Sophocles Philoctet u. Oedipus; privatim die 2. Hälfte der Ilias; die 3 ersten Idyllen des Theocrit,

in Obersecunda: Plutarch's Agis u. Cleomenes, von Herodot Buch VII., die 2. Hälfte der Odyssee,

in Untersecunda: Homer's Odyssee, die erste Hälfte, Xenophon's Memorabilien Buch II. u. III.,

in beiden Tertien ist die Anabasis gelesen;  
in Quarta wird Jacobs Lesebuch benutzt.

3) Im Hebräischen

sind in Prima der Anfang von 1. Regum, zehn Capitel aus d. r. Mitte der Genesis, mehrere Psalme und der Anfang des Exodus gelesen;  
in Secunda wird das Lesebuch von Gesenius benutzt.

4) Im Französischen

in Prima: die Athalie von Racine und l'Avare von Molière;  
in Obersecunda: Montesquieu sur la grandeur des Romains;  
in Untersecunda: Charles XII;  
in beiden Tertien werden die Lectures choisies von Ploetz gebraucht.

5) Im Englischen ist in der ersten Klasse das Sketchbook von Irving gelesen.

Am Zeichnen haben aus Prima, Secunda und Tertia 13 Schüler Theil genommen. Der englische Unterricht wird in 2 Klassen erteilt. Es ist sehr zu bedauern, dass die den Schülern dargebotene Gelegenheit, unentgeltlich in diese Sprache eingeführt zu werden, verhältnismässig nur von wenigen Schülern benutzt wird. Es ist kaum nöthig, die Eltern unserer Zöglinge auf die Wichtigkeit und Unentbehrlichkeit dieser Sprache für das Leben hinzuweisen.

#### IV. Chronik des Gymnasiums.

Ostern 1868 verlieszen uns die beiden Schulamtsandidaten, Dr. Campe und Herr Schulz aus Treptow, der erstere, um provisorisch eine Adjunctur am Königl. Pädagogium in Putbus zu übernehmen, während der letztere auf einige Zeit in das väterliche Haus zurückkehrte. An ihre Stelle traten die Schulamtsandidaten, Herr Friedrich Albrecht Hugo Panse aus Freiburg a. U. und Herr Ernst Wilhelm Carl Friedrich Himbürg aus Wildberg bei Treptow a. T. Der Erstere hatte bereits an dem Gymnasium seiner Vaterstadt das gesetzliche Probejahr absolvirt; der Letztere legte, indem er hier eine provisorische Hilfslehrerstelle bekleidete, zugleich das vorschriftsmässige Probejahr ab.

Herr Panse wurde noch im Lauf des Schuljahres definitiv angestellt, und von dem Director in einer lateinischen Rede in sein Amt eingeführt. Herr Panse, Sohn eines Kreisgerichtsrates zu Merseburg, ist geboren 1840 und auf dem Gymnasium zu Merseburg gebildet, welches er 1861 verliesz, um sich dem Studium der Philologie zu widmen. Er hat hierauf die Universitäten Halle und Erlangen besucht.

Herr Himbürg wird zu Ostern d. J. wieder nach seiner Heimat zurückkehren.

Noch steht uns der Verlust des 3. Oberlehrers Herrn Hanow bevor, welcher, nachdem er der Anstalt 2 Jahre lang treue und erfolgreiche Dienste geleistet hat, wieder nach Anclam, von woher er zu uns gekommen war, zurückkehrt. Unsere herzlichsten Wünsche begleiten ihn bei seinem Abgange.

Die hierdurch im Lehrer-Collegium entstandene Lücke ist zum Theil durch Ascension mehrerer Lehrer ausgefüllt worden. Der Herr Dr. Günther rückte in die 3. Oberlehrerstelle, Herr Dr. Domke in die erste, Herr Fritsch in die 3. ordentliche Lehrstelle ein. Die 4. ordentliche Lehrstelle ist Herrn Clemens Könnecke verliehen worden, welcher bis jetzt am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Berlin unterrichtet hat. Er wird namentlich den Religionsunterricht in mehreren Klassen übernehmen. Ueber seine bisherigen Lebensverhältnisse wird das nächste Programm die üblichen Mittheilungen bringen.

Ein für uns alle sehr erfreuliches Ereignis war, dass auf Anregung des Unterzeichneten und in Folge der Befürwortung des Königl. Provinzialschulcollegiums Se. Excellenz der Herr Minister v. Mühler geruht hat, unserm teuren Collegen Herrn Prorector Riemann den Titel eines Professors zu verleihen. Der Director überreichte dem Herrn

Professor Riemann das betreffende Diplom, so wie die das Diplom begleitende Zuschrift des Königl. Schulcollegiums am 23. Mai in festlicher Schulversammlung in einer lateinischen Ansprache.

Der Gesundheitszustand von Lehrern und Schülern ist ein befriedigender gewesen. Nur einen sehr schmerzlichen und uns alle tief ergreifenden Verlust haben wir zu beklagen. Der Oberprimaner Gustav Siebenbürger, Sohn des Rittergutsbesitzers Herrn Siebenbürger auf Hökenberg, erlag im väterlichen Hause am 23. August 1868, eben als seine Gesundheit sich recht zu kräftigen angefangen hatte, einem heftigen Choleraanfalle, der diesem hoffnungsvollen Leben ein rasches Ziel setzte. Er wäre in dem bevorstehenden Wintersemester der Primus in unserer Prima gewesen. Seine lautere und edle Gesinnung, sein einfach stilles und bescheidenes Wesen, sein für Bildung so empfänglicher Geist und sein gleichmäßig treuer Fleisz werden uns noch oft in die Erinnerung zurückkehren.

An Schulfesten feierten wir den Jahrestag der Schlacht von Königgrätz. Herr Dr. Domke hielt dabei die Festrede. In herkömmlicher Weise feierten die Schüler der oberen Klassen den 15. October, den Geburtstag Sr. Hochseligen Majestät und Stiftungstag des Gymnasiums, durch einen Ball, dem die Lehrer der Anstalt resp. mit ihren Familien, so wie viele der Anstalt befreundete Familien aus der Stadt und aus der Nachbarschaft beiwohnten.

Auszerdem haben die Schüler der verschiedenen Klassen im Sommer kürzere oder längere Ausflüge, namentlich an die Ostsee gemacht.

Herr Professor Riemann erreichte auf einer dieser Wanderungen mit der Obersecunda Swinemünde. Wie in früheren Jahren hatte er Gelegenheit, sich der herzlichsten Gastlichkeit von Seiten der Stadt Cammin, der Herren Rittergutsbesitzer v. Schrader auf Cummin und Knoll auf Rarvin zu erfreuen. Namens der Anstalt spreche ich den eben genannten Freunden der Schule meinen gehorsamsten Dank aus.

Der Director unternahm, freundlichster Einladung folgend, mit der Oberprima ähnliche Ausflüge für je einen Tag nach Königsmühle zu dem Rittergutsbesitzer Herrn Spiller, nach Hökenberg zu dem Rittergutsbesitzer Herrn Siebenbürger und nach Lekow zu dem Rittergutsbesitzer Herrn Cleve. Ich wiederhole auch hier den schon mündlich ausgesprochenen Dank. Auf allen diesen Excursionen haben die betreffenden Schüler durch ihr bescheidenes Wesen und durch ihre zuchtvolle Haltung sich der edlen Gastlichkeit, die ihnen gewährt wurde, werth zu zeigen gestrebt.

Oeffentliche Aufführungen haben nicht stattgefunden; nur hat der Chor im letzten Vierteljahr, mit Unterstützung des Herrn Kreisrichter Heck und des Fräulein Todt, die Heilung des Blindgeborenen von Loewe vorgetragen, auch bei einem für die Armen von Herrn v. Thadden-Triglaff veranstalteten Concert mitgewirkt.

Zu Anfang jedes Semesters empfing das Gymnasium aus der Hand des Herrn Superintendenten Henckel das heilige Abendmahl.

Am 21. August hielt der Herr Provinzial-Schulrat Dr. Wehrmann eine Maturitätsprüfung ab, bei der sämmtliche Geprüfte das Zeugnis der Reife erhielten. Es waren dies

1. Robert Ferdinand Hugo Spiller aus Königsmühle, Sohn des Rittergutsbesitzers Herrn Spiller auf Königsmühle, 18 Jahre alt, 6 $\frac{1}{2}$  Jahre auf dem Gymnasium, 2 Jahre in Prima. Er studirt die Rechte zu Berlin.

2. Hellmuth August Theobald Nemitz aus Greiffenberg, Sohn des Kön. Kreisgerichtsdirectors Herrn Nemitz zu Greiffenberg, 17 Jahre alt, 9 $\frac{1}{2}$  Jahre auf dem Gymnasium, 2 Jahre in Prima. Er studirt die Rechte in Halle.

3. Hermann Friedrich Wilhelm Stahl aus Naugard, Sohn des Ackerbürgers und Stellmacher-Meisters Herrn Stahl zu Naugard, 22 Jahre alt, 2 Jahre auf dem Gymnasium und während dieser Zeit Mitglied der Prima. Er hat sich dem Baufach gewidmet.

4. Christian Friedrich Anton Schimmelpfennig aus Wusterwitz, Sohn des Rittergutsbesitzers Herrn Schimmelpfennig auf Wusterwitz,  $19\frac{3}{4}$  Jahre alt, 2 Jahre auf dem Gymnasium und in Prima. Er studirt in Würzburg Medicin.

5. Karl Lebrecht Eberhard Nemitz aus Greiffenberg, Sohn des Kön. Kreisgerichtsdirectors Herrn Nemitz zu Greiffenberg,  $18\frac{1}{2}$  Jahre alt,  $9\frac{1}{2}$  Jahre auf dem Gymnasium, 2 Jahre in Prima. Er studirt in Halle Medicin.

6. Ludwig Gerhard Karl Cleve aus Lekow, Sohn des Rittergutsbesitzers Herrn Cleve auf Lekow, 18 Jahre alt,  $7\frac{1}{2}$  Jahre auf dem Gymnasium, 2 Jahre in Prima. Er studirt in Heidelberg die Rechte.

Die Abiturienten Spiller und Stahl wurden von der mündlichen Prüfung entbunden.

Die schriftlichen Aufgaben waren:

I. Lateinischer Aufsatz:

De moribus ac rebus gestis P. Scipionis Africani majoris.

II. Deutscher Aufsatz:

Ist die Reformation an Deutschlands späterem politischen Unglück Schuld gewesen?

III. Mathematische Aufgaben:

- a) Es ist ein Kreis gegeben und eine Sehne in demselben; man soll über der Sehne ein Dreieck in den Kreis beschreiben, dessen beide Seiten in einem gegebenen Verhältnis stehen.
- b) Von einem Dreiecke ist die Differenz der durch die Höhe auf die Grundlinie gebildeten Abschnitte gegeben, und die beiden an der Grundlinie anliegenden Winkel: man soll die Seiten und den Flächeninhalt des Dreiecks berechnen.
- c) Drei Zahlen in stetiger geometrischer Proportion zu suchen, deren Summe 42 und deren Product 512 ist.
- d) Es kaufte Jemand 9 Centner Zucker in zwei verschiedenen Sorten, und zahlte für jede Sorte allein 100 Thlr., obgleich ein Centner der besseren Sorte 5 Thlr. mehr kostete: wie viel Centner kaufte er von jeder Sorte und was kostete der Centner?

Die diesmalige Maturitätsprüfung wird am 19. März unter dem Vorsitz des Kön. Prüfungs-Commissarius Herrn Provinzial-Schulrat Dr. Wehrmann stattfinden. Ueber ihr Ergebnis werde ich im nächsten Programm berichten.

Die Aufgaben für die schriftliche Prüfung waren:

I. Inter Romanorum virtutes constantiam primarium quendam locum obtinere.

II. Welche Umstände haben Louis XIV. seine Eroberungen erleichtert?

III. Mathematische Aufgaben:

- a) Ein artesischer Brunnen kostete 1240 Thlr., den ersten Fusz zu bohren zahlte man 26 Sgr., für jeden folgenden 6 Pf. mehr: wie tief ist der Brunnen?
- b) A und B haben zusammen 14000 Thlr. B hat sein Capital um 1 % höher angelegt als A. Nach 4 Jahren erhält A 9440 Thlr., und nach 6 Jahren B 7980 Thlr. an Capital und einfachen Zinsen zurück: welches Capital hat jeder ausgeliehen und zu wie viel Procent?
- c) Ueber der oberen Grundfläche eines geraden Cylinders, dessen Höhe noch einmal so groß ist als der Radius der Grundfläche, ist eine Halbkugel construiert: welches Volumen hat dieselbe, wenn das Volumen des ganzen Körpers 3696 c' beträgt?
- d) Zwischen den Schenkeln eines Winkels ist ein Punkt gegeben: man soll zwischen den Schenkeln dieses Winkels eine Gerade so ziehen, dass der gegebene Punkt der Schwerpunkt des entstehenden Dreiecks wird.

Am 22. März, Vormittags 10 Uhr, wird das Gymnasium den Geburtstag Sr. Ma-

jestät durch eine Feier begehen, bei welcher Herr Dr. Günther die Festrede zu halten übernommen hat. Zu dieser Feier lade ich hiermit die Königl. und städtischen Beamten, die Angehörigen unserer Zöglinge und alle Freunde der Anstalt hierdurch ein.

Am 20. März, Vormittags von 8—12 Uhr, und eben so am 23. März, Vormittags, werden die Klassen in folgenden Gegenständen öffentlich geprüft werden:

Sonnabend, 20. März, von 8 Uhr ab:

Prima:	Sophocles Oedipus, der Director.
Obersecunda:	Cicero, Herr Professor Riemann. Deutsch, Herr Dr. Schmidt.
Untersecunda:	Xenophon, Herr Dr. Günther. Mathematik, Herr Conr. Dietrich.
Obertertia:	Caesar, Herr Fritsch. Xenophon, Herr Dr. Domke.
Untertertia:	Curtius, Herr Subr. Hanow. Xenophon, Herr Panse.

Dienstag, 23. März, Vormittags von 8 Uhr ab:

Quarta:	Phaedrus, Herr Dr. Domke. Geschichte, Herr Dr. Schmidt.
Quinta:	Latein, Herr Panse. Rechnen, Herr Todt.
Sexta:	Geographie, Herr Himburg. Latein, Herr Todt.
Vorbereitungs-Klasse:	Deutsch, Herr Beister.

Am Dienstag wird die Schule mit Bekanntmachung der Versetzungen und Aus-  
teilung der Censuren geschlossen.

Das neue Schuljahr beginnt Dienstag, 6. April, Morgens 8 Uhr.

Zur Prüfung und Aufnahme bin ich am 3. und 5. April Vor- und Nachmittags zu  
sprechen.

**Dr. Campe,**  
Gymnasial-Director.



gestät durch eine Feier b  
übernommen hat. Zu die  
die Angehörigen unserer

Am 20. März, Ve  
werden die Klassen in fö

Sonnabend,

Prima:  
Oberse

Unters

Oberte

Untert

Dienstag, 2

Quarta

Quinte

Sexta:

Vorber

Am Dienstag wi  
teilung der Censuren ges  
Das neue Schulj

Zur Prüfung und  
sprechen.

Verteilung der Lectionen im Winter 18<sup>68</sup>/69.

Lehrer.	Ord.	Prima.	Ober-secunda.	Unter-secunda.	Obertertia.	Untertertia.	Quarta.	Quinta.	Sexta.	Summa.
Prof. Dr. Campe, Director.	I.	Lat. 8 Griechisch 6 Hebräisch 2 Philosoph. 1								17
Prof. Riemann, Prorector.	II a.	Deutsch 2 Geschichte 3	Lat. 10 Geschichte 3	Geschichte 8						21
Dietrich, Conrector.		Math. 4 Physik 2	Math. 4 Physik 1	Math. 4 Physik 1	3 Math. 3					22
Hanow, Subrector.	III b.	Religion 2	Religion 2 Hebräisch 2	Religion 2	2 Religion 2	Religion 2 Latein 8 Deutsch 2				22
Dr. Günther, 1. ord. Lehrer.	II b.			Lat. 10 Deutsch 2 Griechisch 4			Griechisch 6			22
Dr. Schmidt, 2. ord. Lehrer.			Englisch 2 Französisch 2 Deutsch 2		Lat. 2 Geschichte 4	Lat. 2 Geschichte 4	Französisch 2 Geschichte 3	Französisch 3 Geographie 2		22
Dr. Domke, 3. ord. Lehrer.	IV.	Französisch 2 Englisch 2			Griechisch 6					22
Todd, Gymn.-Lehrer.	VI.						Singen.	Rechnen 3 Schreiben 10	Lat. 3 Latein 3	Zeichn. 6 Chor 3 26
Fritsch, 1. Collabor.	III a.		Griechisch 6	Französisch 2 Griechisch 2	2 Deutsch 2 Latein 10					22
Panse, 2. Collabor.	V.			Französisch 3 Griechisch 6	3 Französisch 3 Griechisch 6			Deutsch 2 Latein 10		24
Himburg, Provis. Hilfslehrer.				Geschichte 4		Math. 3 Deutsch 2		Religion 3 Deutsch 3 Geogr. 2 Rechnen 4		24
Beister, Lehrer d. Vorschule.								Nat.-B. 2	Nat.-B. 2	4 V.-Kl. 24

No.	Name	Age	Sex	Profession	Religion	Marital Status	Place of Birth	Parents	Education	Other
1	John Smith	35	M	Teacher	Methodist	Married	New York	John & Mary	High School	
2	Mary Jones	28	F	Homemaker	Catholic	Married	Illinois	James & Elizabeth	Elementary	
3	Robert Brown	42	M	Farmer	Baptist	Married	Ohio	William & Sarah	Common	
4	Elizabeth White	55	F	Widow	Presbyterian	Widowed	Virginia	Thomas & Ann	Common	
5	James Wilson	30	M	Merchant	Quaker	Married	Pennsylvania	George & Rebecca	College	
6	Sarah Davis	25	F	Teacher	Methodist	Single	Massachusetts	Benjamin & Hannah	Normal School	
7	William Miller	40	M	Blacksmith	Catholic	Married	Indiana	Michael & Catherine	Common	
8	Anna Taylor	38	F	Homemaker	Baptist	Married	Georgia	Richard & Susan	Common	
9	Charles Moore	50	M	Physician	Methodist	Married	California	David & Mary	Medical School	
10	Elizabeth Green	22	F	Student	Presbyterian	Single	North Carolina	John & Anne	Common	

Continued on Page 59