

ROLNIK



Działki gruntu na sprzedaż Przykłady mieszanek suchych

Państwowy Bank Rolny, Oddział w Grudziądzu posiada do sprzedania w maj. wieka Tymawa, pow. Grudziądz na Pomorzu, stacja kolejowa Szanowo Szlacheckie niezabudowane działki samodzielne rolnicze.

Majątek leży w odległości o 10 km szosą od miasta Łasin, o 4 km od stacji Szanowo Szlach. szkoła powsz. w miejscu, kościół w odległości 3 km. Gleba pszenno - buraczana. Część budynków folwarcznych przeznaczona jest na rozbiórki i może być przydzielona do poszczególnych działek. Zadek wynosi 40% ceny kupna, resztę należności rozkłada się na okres 40 letni przy oprocentowaniu 5% rocznie. W przeciągu 2 lat od zawarcia kontraktu nabywca opłaca jedynie oprocentowanie w wysokości 3% rocznie.

Działki są częściowo zasiane ozimą, częściowo zaś uprawiane pod zasiewy wiosenne. Zwrot kosztów zasiewów i uprawy zostanie umówiony przy zawarciu kontraktów kupna-sprzedaży.

Poniżej podajemy wykaz działek z podaniem obszaru, ceny, wysokości zadatku, reszty ceny kupna, rat ulgowych, płatnych w przeciągu 2 lat i raty amortyzacyjnej.

Na częściowe pokrycie kosztów odbudowy, prowadzonej przez nabywców Państwowy Bank Rolny udziela pożyczki budowlanej, zwrotnej na tych samych warunkach, co i reszta ceny kupna.

Ze względu na to, że nabywca pokrywa z własnych funduszy oprócz zadatku koszty kontraktu w wysokości około 3% ceny kupna, oraz częściowe koszty zabudowy kandydat winien posiadać 9-10.000 zł. oraz inwentarz żywy i martwy.

Państwowy Bank Rolny zastrzega sobie wybór kandydatów biorąc pod uwagę kwalifikacje moralne i fachowe.

Państwowy Bank Rolny Oddział w Grudziądzu

Nr działki	Obszar	Cena	Zadek	Reszta ceny kupna	rata ulgowa półroczna	Rata amortyzacyjna półr.
1.	15,31,54	15,036,—	6,036	9,000,—	135,—	266,40
2.	20,67,09	15,212,—	6,112	9,100,—	136,50	269,36
4.	16,47,93	15,044,—	6,044	9,000,—	135,—	266,40
5.	18,55,31	16,919,—	6,819	10,100,—	151,50	298,96
6.	11,23,43	10,673,—	4,273	6,400,—	96,—	189,44
7.	13,59,68	11,982,—	4,882	7,100,—	106,50	210,16
8.	16,25,24	14,076,—	5,676	8,400,—	126,—	248,64
9.	16,16,80	14,503,—	5,803	8,700,—	130,50	257,52
10.	13,61,14	13,854,—	5,554	8,300,—	124,50	245,68
11.	19,73,82	17,030,—	6,830	10,200,—	153,—	301,92
12.	21,83,05	20,711,—	8,311	12,400,—	306,—	603,84

Pasieka w zimie

Złem jest niepokojenie pszczół w lecie, w zimie więc jakiegokolwiek niepotrzebne prace w ulu są zupełnie nieopracjonalne. Bartnik może jedynie to i owo poprawić, o ile zostało coś przeoczone w lecie, oraz pomóc w tem, gdzie pszczoły w zimie rady sobie same dać nie mogą. Pod żadnym pozorem nie należy zaglądać do ula, a rozbieranie zwłaszcza gniazda byłoby wręcz karygodne.

W pierwszej linii pilnie trzeba uważać, aby dach nie zaciekał. Tam, gdzie dostaje się woda z zewnątrz, a w razie gdyby woda zalewała gniazdo, to rój może zginąć. Przeciekanie dachu łatwo poznać po tem, że w miejscu, gdzie dach jest nieszczelny, powstaje w wierzchu zawsze wilgotna plama. Jeżeli nie można sobie inaczej poradzić, to trzeba dach pokryć dość grubo słomą, aby woda deszczowa i śniegowa miała odpływ i aby nie przedostawała się do ula. Słomę, najlepiej prostą, można urzęd wiatrem zabezpieczyć, przyciskając ją drewnianymi krótkimi żerkami.

Przy dużym mrozie wylot należy zwięzić na jedną pszczołę, jeżeli jest ciepło - na dwie. W ulach słabych dobrze jest zasunąć wyloty na jedną pszczołę dla uniknięcia rabunku na wiosnę, kiedy wobec pilnych robót w polu rolnik nie ma czasu na częste zaglądanie do pasieki. Ponieważ nawet przy największych mrozach konieczny jest dopływ świeżego po-

wietrza do ula, przeto jak tylko spadnie większy śnieg, należy zmiatać go z deszczki wlotowej, aby nie dopuszczać do zasypiania wylotu, gdyż pszczoły mogłyby się udusić z braku powietrza. Zwłaszcza podczas zadyмки kiedy śnieg pada z wielu stron, trzeba parokrotnie podczas doby zaglądać do pasieki i śnieg z wylotów usuwać.

Poważne szkody zimową porą mogą wyrządzić ptaki, tak dzikie jak i domowe. — Niektóre z nich siadają na wylocie i zaczynają mocno dziobem kuć w ul; zaniepokojone hałasem pszczoły, wychodzą przez wylot i stają się pastwą ptaka. Zauważono, że ptaki stosują całą taktykę jedne z nich zawzięcie kują w ul w kilku miejscach, inne chwytają wychodzące z ula pszczoły, przyczem role często się zmieniają.

Ponieważ jednak są to przeważnie ptaki bardzo pożyteczne, gdyż zjadają niezliczoną ilość w lecie szkodliwych owadów, a w zimie ich jaja, przeto nie należy je zabijać, lecz przez ciągłe płoszenie odzwyczajając ich od atakowania pasiek. Jeszcze skuteczniejsze będzie sypanie im niepotrzebnych okruszyn chleba i gotowanych ziemniaków, kawaleczki niesolonej słoniny i t. p. Wówczas ptactwo zupełnie nie będzie czyniło szkód wśród pszczół.

Domowe ptactwo nie powinno być dopuszczane do pasiek. Zwłaszcza kaczki i indyki z wielką wprawą

I. Otrąb pszennych 25 części, śrutę jęczmiennej 20 części, śrutę owsianej 10 części, śrutę sojowej 15, kuchennej 14, mączki mięsno - kostnej 15, soli kuchennej 1/2, węgla drzewnego 1/2. Razem - 100 części.

II. Otrąb pszennych 25 części, śrutę pszennej 15 części, śrutę jęczmiennej 15, śrutę owsianej 10 pcz. konińskich 10, siemienia lnianego mielonego 10, kredy szlamowej 2, soli kuchennej 1. Razem 100 części.

Zamiast mieszanek suchych dają też mieszanki wilgotne, których użycie jest łatwiejsze w małym gospodarstwie rolnym. O to przykład takiej mieszanki wilgotnej: otrąb pszennych 20 gramów, otrąb z prosa lub plew seradelowych 10 gramów, ziemniaków gotowanych 30 gramów, twarogu 20 gramów, kości mielonych 5 gramów, soli kuchennej 1 gram. Razem — 86 gramów.

Zamiast kości mielonych można dać 3 gramy kredy szlamowej. Do

tego dochodzi jeszcze ziarno w ilości 20 gr. na sztukę dziennie, które daje się w dwóch porcjach, rano połowę i wieczorem resztę. Mieszanke daje się w porze południowej. Ponadto trzeba zadawać kurom siekaną zieloninę w postaci kapusty, względnie daje się im buraki pastewne lub marchew.

W Niemczech próbują zadawać kurom nieco kiszonki (w ilości 10 gr. dziennie na sztukę) w charakterze paszy soczystej. Do otrąb pszennych dodają również trochę otrąb żytnich. Kury na ogół żyta nie lubią i źle je trawia, ze względu na to że żyta produkuje się w każdym gospodarstwie najczęściej, przeto nie dziwnego, że gospodarz stara się przystosować ziarno żytnie do użytku dla swego inwentarza. Małe ilości śrutowanego żyta, a zwłaszcza otrąb żytnich, można śmiało w mieszankach kurom „przemycić“.

—o—

ŻYWIENIE DROBIU W ZIMIE

Podajemy kilka przykładów żywienia drobiu w zimie według przepisów, umieszczonych w miesięczniku „Plon“, wydawanym w Chorzowie.

„Za granicą daje się kurom mieszanki zbożowe, składające się z otrąb pszennych, śrutę zbożowej oraz dobrej paszy białkowej. Mieszanki takiej kura rasy lekkiej spożyje przeciętnie około 50 gr., kura rasy ciężkiej 65 gr. Ponadto każda kura dostaje dziennie 50 gr. ziarna całego, wreszcie paszę miękką, jak ziemniaki gotowane z osypką i siekaną zieloninę w ilości 30 do 40 gr. na sztukę. Mieszanke solą i dodają jeszcze do niej kredy szlamowej, w ilości 3 gr. na sztukę.

SPOSÓB ZADAWANIA LEKARSTW ZWIERZĘTOM.

Płynne lekarstwo wlewa się butelką do pyska, podnosząc głowę zwierzęcia do góry. Przy zadawaniu lekarstw w postaci pigulek, wyciera się koniowi język na bok a z drugiej strony ręką kładzie się pigułkę na język jak najdalej; gdy się język puści - koń pigułkę połknie. Ciasto nakłada się łyżką drewnianą na język. Koniom o wiele bezpieczniej dawać lekarstwa w postaci pigulek.

Świniom daje się lekarstwa z mio-

dem lub w cieście, smarując je łyżką na wyciągnięty język. Przy zalewaniu lekarstwa świnia może paść. Świniom nie wolno wlewać lekarstwa do pyska.

SŁABY ROZWÓJ OZIMIN.

W związku z opóźnionymi zasiewami rozwój wegetacyjny ozimin w miesiącu listopadzie okazał się słabszy od analogicznego rozwoju w roku ubiegłym. Średnie warunki atmosferyczne w listopadzie utrudniły należyte rozkrzewienie się żyta i pszenicy, wobec czego stan zasiewów jesiennych uznać należy za słaby.

Porady dla rolników

Jak usunąć wilgoć ścian w piwnicy

Przedewszystkiem należy przewietrzyć piwnicę w czasie lata, lub podczas suchych dni zimowych. O nie w piwnicy znajdują się ziemniaki, wietrzenie zimą jest bardzo ryzykowne. Dobrze jest zrobić w piwnicy wentylatory.

Jak żywić prosięta.

Prosięta do 3 tygodni życia powinny żywić się mlekiem matki, które jest niezastąpione. Ponieważ jednak rodzą się bardzo małe przeto szybko rosną i potrzebują dużo pokarmu. Gdybyśmy zatem chcieli je żywić tylko mlekiem matki, maciora szybko wycieńczyłaby się, prosięta zaś cierpiałyby głód. Żeby tego uniknąć, trzeba już na początku czwartego tygodnia życia prosięta podkarmić mlekiem krowim. Mleko to powinno być czyste, prosto od krowy, a więc jeszcze ciepłe. Na sztukę liczy się 200 gr mleka, t. j. litr na 5 prosiąt dziennie. Ilość tę daje się w trzech dawkach rano, w południe i przed wieczorem. Dawkę tę zwiększa się stopniowo tak że w dziesiątym tygodniu życia jedno prosię powinno otrzymywać 1 litr mleka dziennie, waga zaś jego winna być wtedy 20 kg.

—o—