

519



DR. L. BYKOWSKI

**MATEMATYCZNE  
PODSTAWY BIOLOGJI**

LWÓW—WARSZAWA  
KSIĄŻNICA POLSKA T. N. S. W.



8

12 436



## BIBLIOTECZKA PRZYRODY I TECHNIKI

REDAKTOR PROF. DR. B. FULIŃSKI, LWÓW, NABIELARA 22, INST. ZOOLOG.

1. *Malarski T.* O radjotelegrafji. Z 49 ryc.
2. *Krzemieniewski S.* Ochrona przyrody oczyszczonej. Z 11 rycinami.
3. *Fuchs Z.* Budowa materji w świetle badań nowoczesnych.
4. *Łōmnicki J.* Z życia mrówek. Z 12 ryc.
5. *Pawłowski S., Jakubski A. i Fischer A.* Z polskiego brzegu. Z 27 ryc. i 4 tabl.
6. *Friedberg W.* Z zagadnień paleontologii. Z 15 rycinami.
7. *Malarski T.* Prądy termoelektronowe. (Lampy katodowe). Z 43 rycinami.
8. *Bykowski L.* Matematyczne podstawy biologji. Z 38 rycinami.
9. *Wiśniewski T.* Metody i zadania współczesnej socjologii roślin.
10. *Dembowski J.* Naśladowanie zjawisk życiowych jako metoda biologiczna. Z 8 ryc.
11. *Demel K.* Ryby Bałtyku polskiego. Z 37 ryc.
12. *Simm K.* Gąbki słodkowodne. Z 19 rycin.

Dla abonentów „Przyrody i Techniki“ 20% opustu przy każdym pojedynczym zeszycie przez administrację czasopisma.  
Dla nieabonentów 15% opustu przy każdorazowym komplecie.

DO NABYCIA W KSIĄŻNICY POLSKIEJ TNSW.  
LWÓW, CZARNIECKIEGO 12.

ZĄDAĆ WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH.

BIBLIOTEKA „PRZYRODY I TECHNIKI“



~~Dz. III. Inw. nr. 1160~~

LUDWIK JAXA BYKOWSKI

~~not/9.~~

# MATEMATYCZNE PODSTAWY BIOLOGJI

(z 38 ilustracjami)

~~Biblioteka  
Kole Przyrodników U. M. K.  
L. 33. w Toruniu 5101~~



KSIĄŻNICA POLSKA  
TOW. NAUCZYCIELI SZKÓŁ ŚREDN. I WYŻSZYCH  
LWÓW—WARSZAWA  
MCMXXIV

~~not/9.~~



Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.



Z Pierwszej Związkowej Drukarni we Lwowie, ul. Lindego 4.



I.

## Zadania i metody biometryki.

„W każdym dziale nauk przyrodniczych jest tylko tyle wiedzy, ile tam tkwi matematyki“. Może przesadnym nieco jest ten pogląd Kanta, ale nie ulega kwestji, że ujęcie pewnych zjawisk przyrodniczych we wzór matematyczny, nadaje większą wartość naszej interpretacji, bo wtedy wprowadziliśmy do niej czynnik obiektywny, niezależny od indywidualnych właściwości badania. Wtedy czujemy się panami jakiegoś zjawiska, jeśli udało się nam przebieg jego ująć w ścisłą formułę, która ogarnia wszystkie pojedyncze ogniwa, która umożliwi ujęcie i określenie szczegółów nieznanych, przepowiedzenie dokładne przyszłych. Wzory matematyczne bez względu na teorie, jakie na nich się opierają, wyrażają prawidłowość pewnych procesów, tem samem są poważnym — choć nie bezwzględny — i obiektywnym, niezależnym od indywidualności badacza, jego braków lub uprzedzeń, probierzem wartości naukowej uogólnień, nadając im powagę prawa przyrody.

Podobnie, jak użycie eksperymentu zaczęło się w naukach przyrodniczych abstrakcyjnych — fizyce, chemji — tak samo wyrażenie wyników przy pomocy formuł matematycznych tu na najsilniejszych, bo i najdawniejszych, stoi podstawach. Ale dziś i biologja z jednej strony z nauki wyłącznie opisowej staje się eksperymentalną, z drugiej dąży do wykrycia i uchwycenia związku zależności, określenia jednego zjawiska jako funkcji zmiennej zależnej, od drugiego, będącego w tym wypadku zmienną niezależną. Liczbowe wyra-



zenie praw przebiegu zjawisk oczywiście idzie ręka w rękę z zastosowaniem eksperymentu, stąd też fizjologia, która pierwsza z nauk biologicznych wprowadziła eksperyment, może od dawna pochlubić się całym szeregiem praw ujętych we wzory matematyczne. Dla przykładu podaję, że z liczbową ścisłością umiemy oznaczyć szybkość przewodzenia nerwów, zależność skurczu mięśni od natężenia prądu, wielkość pracy serca pędzącego krew po ciele, związek częstości pulsu ze wzrostem itd.

Z czasem jednak dążenie do ścisłości drogą wprowadzenia czynnika ilościowego i formuł matematycznych rozszerzyło się na inne działy. Psychofizyka i eksperymentalna psychologia, mechanika rozwojowa, nauka o dziedziczności i zmienności swoje wyniki eksperymentalnych dociekań starają się ile możności wyrazić krzywymi i określającymi je wzorami matematycznymi. Ujmuje się wreszcie w prawa liczbowe liczne spostrzeżenia w dziedzinach, gdzie eksperyment wyjątkowo może znaleźć zastosowanie i jak w astronomji, tak w licznych zestawieniach statystyki biologicznej znajdujemy ogromny materiał, umożliwiający z liczbową ścisłością ustalenie pewnych stałych związków, wykrycie i określenie praw mniej lub więcej doniosłych. Tą drogą udało się wprowadzić z czasem pewien ład i prawidłowość nawet tam, gdzie przed zastosowaniem wyrażeń matematycznych widziało się jedynie ciemny las szczegółów niemożliwie splątanych, i znaleźć drogi a przynajmniej ścieżki w niedostępnej do niedawna puszczy.

Przykład jeden z łatwiejszych rzecz zilustruje.

Dokonano pomiarów abiturjentów lwowskich w szeregu zakładów. Przykładowo podaję wzrost „obywateli gminy im. M. Łomnickiego“ w r. 1920: 1738, 1642, 1801, 1701, 1545, 1620, 1696, 1652, 1661, 1800, 1708, 1708, 1700, 1606, 1610, 1674, 1678, 1715, 1625, 1783, 1604, 1805.

Mamy tu do czynienia z 22 liczbami wymiarowemi, a już jakieś zorjentowanie się w nich nie jest tak proste. Gdy uwzględnimy, że gimnazjów polskich we Lwowie było wtedy

9, „las cyfr“ jeszcze by się spotęgował, a jeśli byśmy chcieli poznać ogół młodzieży i zebrali daty z większej ilości miejscowości choćby przykładowo, trudności wzrosną niepomierne. Oczywiście, jeśli chcemy poznać dokładniej młodzież, nie możemy się zadowolić jedną cechą, choćby niewątpliwie ważną antropologicznie jak wzrost, lecz musimy objąć ich więcej, przynajmniej uwzględnić wymiary czaszki, kształt twarzy, budowę piersi, ciężar, pigmentację. Do tego przyłączy się szereg właściwości umysłowych, które znów można określić liczbowo, więc ostatecznie z tej jednej klasy ilość wzrosłaby do poważnej sumy około 1000, gdyby nawet ograniczyć się do najmniejszej ilości szczegółów niezbędnych dla charakterystyki jednostki, trzeba by jednak dla każdego badanego ustalić przynajmniej 25—30 szczegółów.

Okazuje się tedy konieczność jakiegoś uporządkowania materiału, a następnie dokonania syntezy, związania szczegółów razem w jedną całość.

Więc w omawianym przykładzie musi się przedewszystkiem materiał rozsortować na grupy rasowe, następnie uwzględnić wiek, a w dalszym ciągu jeszcze inne szczegóły np. stanowisko społeczne rodziców, wyniki pracy w szkole itd. Dopiero w tak rozsortowanym materiale próbujemy doszukać się dalszych związków i zależności i oprzeć je na jakichś ogólniejszych zasadach, ujętych w tak zwane prawa.


Czasem związki te okażą się bardzo łatwo i wyraźniej, częściej jednak są one bardziej zawikłane, tak, że dopiero subtelna analiza zdoła je wykryć. W badaniach tych wychodzimy z założenia, że pewne związki są czemś stałym, pewne zjawiska są koniecznym następstwem innych warunkujących je, są tedy, mówiąc językiem matematyków, funkcją zmienną zależną od zmiennych innych, które znów w dalszym łańcuchu zjawisk mogą być zależne. Tabela spostrzeżeń, zawierająca szczegółowe daty, umożliwi przedewszystkiem sporządzenie wykresu jako graficznego obrazu funkcji. Znacznie jeszcze ściślej zależność ta przedstawi się, jeśli uda się wprowadzić



pevien wzór matematyczny. Jeżeli użyjemy przykładu wyżej przytoczonego i rozsortujemy badanych wedle wieku, poczem obliczymy wzrost przeciętny, natenczas można wzrost uważać za funkcję wieku. I tak np. uczniowie chrześcijanie okazywali w gimnazjum VIII następujące wymiary wzrostu i wagi w roku 1917/18 przy uwzględnieniu wieku:

Lata:	11	12	13	14	15	16	17	18	19
wzrost w cm	132.32	135.78	139.68	147.22	150.98	158.01	161.75	167.07	169.66
waga w kg	30.6	31.8	33.9	36.8	45.7	50.2	56.2	59.9	63.5

Jeżeli stosunki te przedstawimy rysunkiem w postaci wykresu, to w odniesieniu do wzrostu wykres przedstawi się jako linja zbliżona do prostej i tylko lekko falisto wygięta, (wykres 1), natomiast wykres ciężaru przedstawi się w części dolnej, a więc dotyczącej młodszych silnie wklęsły, świadcząc o wolniejszym wzroście w początku studjum gimnazjalnego, a następnie bujaniu w latach od 13 roku (wykres 2).



Rys. 1.

Dokładniej przedstawiłyby się te stosunki, gdybyśmy podali formułę matematyczną, charakteryzującą dany wykres jako krzywą. Określi ją styczna w każdym punkcie uwarunkowana wielkością kąta nachylenia wobec osi podstawowej (xx). W wypadku pierwszym uznając ten wykres w przybliżeniu za linię prostą, mielibyśmy stałą miarę jej pochylenia  $tg\alpha = 37 : 8 = 4.6$  równanie więc określające wykres miałoby w przybliżeniu formę  $y = 4.6x$ . Zauważyć należy, że na załączonym rys. (1) stosu-

nek odciętych jest 20 razy większy niż rzędnych, stąd wykres przedstawia się mniej stromy.

Ale istnieją specjalne metody, pozwalające wyrazić znacznie dokładniej stosunki zależności nawet bardzo zawiłe, a nawet zestawić cechy, nie mające charakteru ilościowego. Działy matematyki, jakie przytem wchodzą przedewszystkiem w grę, to kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa oraz statystyka naukowa. Działy zaś biologji, które w znacznej mierze wyniki swe w ten sposób usiłują sformułować, są nader różne, wymieniamy naukę o zmienności biologicznej, dziedziczności z uwzględnieniem praw krzyżowania, korelację, działanie doboru, wpływ bezpośredni warunków i t. d. W dalszych rozdziałach zaznajomimy się z ważniejszymi metodami szczegółowemi i zasadniczymi zdobyczami na tych polach.




II.

### Zagadnienie badania ilościowego w biologji.

Pozornie problem metodyczny może się wydawać zupełnie jasnym, jeśli nie wprost banalnym. A przecież i nad nim warto się gruntowniej zastanowić. Przedewszystkiem rozważmy, co można mierzyć i czem, gdzie możemy użyć „cyrkla, wagi i miary“ i jakie one być muszą, aby spełniły swe zadanie, a wreszcie jak je stosować.

Jak wszędzie tak i tu, obowiązuje zasada, że miara należy do tego samego rodzaju, co przedmiot mierzony, więc długość mierzymy długością, siłę siłą i t. d., dobierając tylko jako jednostki wielkości najbardziej nam odpowiadające, względnie naturalnie wiążące się z podstawowym układem *cgs*.


Niektóre właściwości najlepiej i najłatwiej mierzyć względnie oznaczać wprost np. długość lub wysokość zwierząt lub ich części, wzrost ludzi, albo wymiary czaszek, liści, kwiatów, skorup ślimaczych itp. Przyrządem są podziałki miernicze, np. zwykły metr, klupa lub prosty trójkąt mierniczy (Rys. 2), czasem



Rys. 2.

specjalnie przystosowane np. kranimetr (rys. 3), tj. cyrkiel o łukowatych ramionach, zaopatrzony podziałką i umożliwiający w ten sposób łatwe oznaczanie odległości na powierzchniach


krzywych, stąd mający zastosowanie do pomiarów głowy (rys. 4), gdy wzrost oznacza się podziałką stałą, umocowaną np. przy pionowej ścianie (rys. 6), albo przenośną, gdy przeciwnie do mierzenia obwodów, głowy, piersi, ramienia i t. p. używa się taśmy (rys. 5).



Rys. 3.




Rys. 4.



Rys. 5.


Oczywiście przy wszystkich pomiarach należy być bardzo skrupulatnym, baczyc, aby zmierzony przybrał właściwą postawę, by przyrządy były należycie stosowane.





Rys. 6.

miaru linii krzywych zapomocą kółka mierniczego, używanego do mierzenia odległości na mapach (rys. 7).



Rys. 7.


Trudniejsza rzecz z mierzaniem powierzchni np. liścia, skrzydła owada itp. Użycie papieru kratkowanego może dać wyniki z przybliżeniem wcale dokładnem. Można też użyć w tym celu dokładnej wagi, ważąc wycięty z papieru narys danej powierzchni i porównując ściśle ciężar tej wycinanki

Gdy rozmiary są zbyt drobne tak, że nawet użycie nożysza nie wystarczy, uciekamy się do pomiarów pod mikroskopem, przy pomocy specjalnych okularów, opatrzonych podziałką. Znając wielkość powiększenia danego systemu szkieł, z łatwością możemy oznaczyć wymiary rzeczywiste.

W pewnych wypadkach dokładniej możemy poznać właściwości po przeniesieniu ich na papier zapomocą fotografii lub rysunkiem przy pomocy widni optycznej, gwarantującej ścisłość proporcji. Użycie kratkowanego papieru milimetrowego może być znacznem ułatwieniem. Na reprodukcji często łatwiejsze jest dokonanie po-


z ciężarem  $1\text{ cm}^2$  wyciętego z tego samego papieru. Metoda ta może być użyta przy preparatach mikroskopowych z uwzględnieniem powiększenia.

O wiele łatwiej można oznaczyć wielkość powierzchni przy pomocy inżynierskiego planimetru (rys. 8), wystarczy tu bowiem przeciągnięcie sztyftu wzdłuż obwodu żądanej powierzchni, aby na mierniczym bębnie znaleźć wymiarowe cyfry powierzchni.



Rys. 8.

Właściwości trójwymiarowe wyraża ilościowo objętość. Oznaczyć ją można zapomocą ilości wypartej wody względnie piasku. W tym celu zanurzamy okaz do naczynia kalibrowanego, wypełnionego wodą lub piaskiem i z podniesienia się poziomu oznaczamy objętość wypartego środowiska, a więc i mierzonego ciała.




Rys. 9.

Siłę u człowieka, a także większych zwierząt, n. p. domowych ssaków, mierzymy zapomocą dynamometrów, zwykle używany jest system Collina, (rys. 9) który stanowi owalna sprężyna stalowa, okazująca przy pomocy systemu dźwigni i kół

Ciężar łatwo się oznacza na wadze, czulej wedle potrzeby, z zachowaniem ostrożności, przestrzeganych przy badaniach wagowych przez fizyków i chemików.



zębatych wielkość nacisku lub rozciągnięcia w kilogramach na odpowiedniej podziałce. Dla oznaczenia siły zwierząt mniejszych, poszczególnych narządów np. wypreparowanego mięśnia, albo wielkości ciśnienia krwi, używa się specjalnie skonstruowanych przyrządów, mniej lub więcej skomplikowanych. Podobnie można oznaczyć siły, występujące w organizmach roślinnych np. siłę parcia soków przez korzenie, konstruując prosty przyrząd, podobny do rtęciowego manometru (rys. 10), rozpierającego środowisko kielka i t. p.



Rys. 10.

Znacznie trudniejsze jest ilościowe określenie właściwości barwnych. Wprawdzie fizyka sprowadza różnice barw do długości fal świetlnych, miara ta jednak w biologii nie da się zastosować praktycznie, bo wchodzi tu w grę także nasycenie barw, kombinacje w różnym stopniu z barwą białą i czarną, które choć fizycznie zupełnie odrębne, wrażeniowo przedstawiają się analogicznie do barw prostych.

Więc tworzy się specjalne skale praktyczne, które jakkolwiek czasem opatrzone numerami, nie mają ścisłości liczbowej i podobnie, jak skale termometru, służą nie do właściwego mierzenia, lecz jakościowego oznaczenia barw lub odcieni. W ten sposób ułożono wcale dokładną skalę barw oczu od ciemnych, brunatnych, przez różne odcienie piwnych do niebieskich i siwych w różnych stopniach. Mniej udało jest skale barw włosów, nie obejmuje bowiem wszystkich odcieni, jakie u nas nawet nie rzadko występują.

Również maści konia określone są wcale dokładnie, przyczem mamy nawet z dawna przekazane specjalne nazwy znacznie bogatsze, niż w odniesieniu do ubarwienia włosów ludzkich.

Ustalono też skalę barw skóry (Broca), która zwłaszcza w odniesieniu do ras kolorowych ma szerokie zastosowanie.

W innej dziedzinie mamy np. skalę kolorymetryczną dla oznaczania ilości hemoglobiny we krwi, przedstawiającą szereg odcieni barwy czerwonej (Talquist i i.), natomiast Forel ułożył skalę barwną dla wód jeziornych od błękitu do zieleni, którą uzupełnił Ule, dodając jeszcze odcienie brunatne. Skala ta, która opracowana została dla jezior alpejskich, nie wystarcza dla naszych stosunków, gdzie należałoby, mojem zdaniem, jeszcze dołączyć pewne odcienie popielate.

Temperaturę tak poszczególnych organizmów jak i środowisk oznacza się termometrem rtęciowym, czasem specjalnie przystosowanym do swoistych celów. Zwłaszcza częste ma zastosowanie termometr maksymalny i minimalny.

Za dalekoby nas zaprowadziło wyliczanie rozlicznych przyrządów, dających ilościowe wyniki, zwłaszcza używanych w badaniach fizjologicznych, podane powyżej przykłady dają obraz dziedzin i istoty metod badania.

Inna znów zasada, umożliwiająca uzyskanie liczbowych dat, to eksperyment, w którym możemy zmieniać dowolnie wielkość wprowadzanych czynników, a następnie mierzyć wielkość wywołanych modyfikacyj. Zamiast słownego wyjaśnienia przykładu podaję rysunek, ilustrujący wpływ ciepłoty na szybkość przeobrażenia żab (rys. 11).

Oczywiście zakres tych dziedzin bardzo obszerny i urozmaicony.

\* \* \*

Innego rodzaju badania liczbowe, to badania statystyczne. Dane ilościowe w tej dziedzinie można uzyskać w dowolny sposób.

Po pierwsze badacz może po prostu stwierdzić obecność lub brak jakiejś cechy w serji badanych przedmiotów, obecność lub brak szczegółu określonego w szeregu zjawisk, obecność lub nieobecność określonych form w danych zbiorowiskach, a następnie obrachować i zestawzić bezwzględnie, czy procentowo ilość wypadków dodatnich i ujemnych, zatem obecności



lub braku tej cechy, zjawiska lub przedmiotu. W ten sposób można np. obliczyć ilość jasnoookich i ciemnoookich w jakiejś gminie, ilość zdrowych i chorych w czasie epidemji, ilość pożarów w określonym obszarze zimą i latem itp.

		155°C	13°C	165°C	105°C
MARZ.	11				
	20				
	23				
	25				
	27				
	28				
	31				
KWIEC.	4				
	6				
	10				
MAJ	22				
SIERP.	18				
	28				
PAŹDZ.	31				

Rys. 11.

Powtórę może badacz oznaczać istotną wielkość jakiegoś typu, jakiejś cechy zmiennej badanych przedmiotów, zjawiska zmieniającego się ilościowo w porównaniu do otoczenia. Możemy więc badać np. wzrost młodzieży, albo ilość płatków w kwiecie, ilość jakichś form określonych w danym zbiorniku, powiedzmy rozwielitek wśród planktonicznej fauny danego stawu w ciągu roku.

Podział ten nie jest bezwzględny. Stałość bowiem może być uważana za graniczną wartość zmienności. Obecność lub

brak można uważać za dwie wartości zmiennej, jakie ona jedynie jest w stanie przyjmować, mianowicie 1 i 0. Jeśli mówimy np. o zdrowych i chorych, o silnych i wątłych, jasnoookich i ciemnoookich, to mamy tu przeprowadzoną granicę, która dzieli nam całość na dwie grupy, które w praktyce niekiedy nieznacznie przechodzą jedna w drugą tak, że podział dokonany musi być mniej lub więcej sztuczny, a grupy uzyskane nie przedstawiają się bezwzględnie jednolite. Umożliwia nam jednak takie ujęcie sprawy traktowanie liczbowe cech i stosunków jakościowych, które pozornie wykraczają poza ilościowe pojęcia.



w odniesieniu do innych właściwości przedstawia się znacznie plastyczniej. Dla przykładu podaję analogiczny rysunek i wykres w odniesieniu do siły (Rys. 13), gdzie wygląd mięśni jest znacznie mniej wymowny, a odpowiedni szereg liczb jest następujący :

28, 32, 36, 38, 42, 45, 45, 45, 45, 45, 46, 46, 50, 52, 52, 56.

III.



Metoda szeregów w biologii.

Najprostszym sposobem uporządkowania danych liczbowych jest uszeregowanie ich wedle wielkości, siły lub liczby w porządku malejącym lub rosnącym. W ten sposób uporządkowany szereg nazywa się szeregiem indywidualnym. Można w ten sposób ugrupować spostrzeżenia bardzo różnych kategorii, więc np. ludzi wedle wzrostu, siły, wymiarów głowy, barwy włosów lub oczu, ryby wedle ilości promieni w płetwach albo kwiaty wedle ilości płatków, skorupy ślimaka według siły zabarwienia itp. Dla przykładu podaję cyfrowy szereg wzrostu zeszlórocznych abiturjentów gimnazjum VIII we Lwowie od najniższego do najwyższego :

160, 165, 165, 166, 167, 167, 171, 172, 172, 175, 175, 176, 177, 179, 182, 187. Szereg ten ilustruje rycina (12) wedle fotografii.

Oznaczając wartość pierwszą i ostatnią szeregu otrzymujemy granice zamykające między sobą wszystkie szczegółowe spostrzeżenia, jest to t. zw. szerokość lub amplituda wahań. Ponadto widzimy, jakie wielkości przeważają, dokoła których więc ześrodkowuje się znaczniejsza ilość danych.

Ułatwić orientację może jeszcze wykres. W tym celu na osi poziomej (odciętych) wyznaczamy szereg równoodległych punktów, z których każdy odpowiada jednemu osobnikowi uszeregowanemu, na odpowiednio zaś wykreślonych pionowych (linjach czy kolumnach) oznaczamy wielkości (rzędne), odpowiadające wartościom naszego szeregu. Obraz, który w odniesieniu do wzrostu jest jakby schematem fotografii,



Rys. 12.


W wykresie takim ilość pionów równej wysokości daje nam ilość osobników czyli t. zw. liczebność właściwości tego samego stopnia. Stopnie obfitsze dają tedy górne granice poziome kolumn dłuższe, tam więc wykres jest mniej stromy, gdy zaś pewne właściwości są rzadsze, tam wykres staje się stromy. Zazwyczaj granice wykresu są bardziej strome, środek zaś zbliża się mniej lub więcej do poziomu, świadcząc, że wartości skrajne są bardziej wyjątkowe, a dominuje typ pośredni. Dokładność, ale i przejrzystość obrazu zależy od przyjętej podziałki, gdybyśmy np. pierwszy wykres oparli na odległościach decymetrowych, nie centymetrowych, przed stawilby się on inaczej, jak wskazuje linja kreskowana.

L. J. Bykowski.

~~BIBLIOTEKA~~  
Kole Przyrodniców i ZM. K.  
w Toruniu




Oczywiście takie uporządkowanie umożliwia daleko dokładniejsze rozpatrzenie danej grupy badanych, niż daty bezładne, zapisywane np. w porządku pomiarów, jeszcze jaśniej



Rys. 13.

przedstawiają się stosunki przy wprowadzeniu t. zw. szeregu liczebności, który z jednej strony daje jasny obraz nawet wielkiej ilości badanych, z drugiej umożliwia wzajemne porównanie grup i szeregów.



Rys. 14.

Jeżeli w wypadku pierwszym umieszczamy badanych w jednej linii, jak rząd żołnierzy, przy tworzeniu szeregu liczebności rozmieszczamy ich także wgląd w ten sposób, że

badanych o tych samych właściwościach umieszczamy nie obok siebie, lecz za sobą, obok szeregu więc tworzymy kolumnę. Im tedy ilość osobników wykazujących określoną właściwość czyli tak zwana klasa jest większa, tem kolumna będzie dłuższa. Ilość osobników wchodzących w skład poszczególnej kolumny czyli należących do odpowiedniej klasy nazywa się jej liczebnością.

Ilustrację powyższego zestawienia stanowi dołączony rysunek 14 (według Cleparède'a), przedstawiający zbiór pół tysiąca dzieci dziesięcioletnich uszeregowanych w kolumnach wedle wzrostu w ten sposób, że najniższe, wysokości średniej 108 cm od 107 do 109 cm) umieszczono na skrzydle prawem, następne wysokości 110 (109—111 cm), w kolumnie obok i tak dalej ku skrzydłu lewemu, które zamyka najrośniejszy 152 cm wysoki.

Uporządkowanie tego rodzaju jest zupełnie ściśle i naturalne, jeżeli cecha służąca za podstawę podziału na klasy i ugrupowania szeregu występuje w ilościach ściśle określonych, wyrażonych liczbami całkowitemi bez przejść, jak np. ilość płatków w kwiecie, komór w owocu, promieni w pletwach ryb, sterówek w ogonie ptaka, członów w rożkach owadów itp. W tym wypadku zmienność jest skokowa, zmienna cecha zaś czyli krótko zmienna (warjant) jest przerywana zamknięta (integrated).

Dla przykładu podaję szereg liczebności fląder (*Pleuronectes*), oparty na ilości promieni w pletwie ogonowej, a oparty na zbadanych przez C. G. J. Petersena 703 okazach z okolicy Skagen. W zestawieniu tem wiersz górny podaje ilość promieni, drugi w odpowiednich miejscach bezwzględną ilość osobników wykazujących tę liczbę, trzeci wreszcie liczby procentowe w odniesieniu do ogółu :

Ilość promieni														
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
Ilość okazów														
5	2	13	23	58	95	134	127	111	74	37	16	4	2	1
Procent														
0.71	0.28	1.85	2.60	8.25	14.30	19.06	18.11	15.79	10.52	5.26	2.28	0.57	0.28	0.14



Przykład drugi oparty na badaniach Zdz. Chmielewskiego podaje obraz zmienności znamion u naszego maku polnego (*Papaver Rhoeas* L.), który zbadał 2323 makówek, pochodzących z różnych okolic:

Ilość znamion												
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Liczebność bezwzględna												
3	45	204	441	560	467	344	167	62	23	4	1	2
Procent												
0.13	1.94	8.78	18.98	24.11	20.10	14.81	7.19	2.67	0.99	0.17	0.04	0.09

W innych wypadkach jednak właściwość nie daje się wyrazić liczbami całkowitemi, albowiem zmienność jest ciągła, a cechy okazują przejścia stopniowe, są więc płynne. Z tym wypadkiem mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie przedmiotem badań są wymiary przestrzenne, siły, skład chemiczny, albo też wykładniki stosunków lub określenia procentowe. Przykładem może być cytowany wyżej szereg wzrostu abiturjentów.

W tym szeregu widzimy stopniowe przejścia. Tu więc wprowadzamy pewien układ sztuczny, tworzymy klasy w ten sposób, że łączymy razem jednostki znajdujące się w obrębie granic, tworzymy tedy wartości przybliżone, pomijając np. ułamki centymetrów. Jak w każdym przybliżeniu, tak i tu możemy dokładność dowolnie zmieniać, zależnie od okoliczności. Jeżeli tworzymy klasy o różnicy 1 *cm*, natenczas do kategorii osobników wysokich na 162 *cm*, zaliczy się nietylko jednostki ściśle wykazujące ten wzrost, ale ogół wzrostu od 161.51 do 162.50, które to liczby stanowią granicę klasy. Liczba charakteryzująca klasę, w naszym przekładzie 162 zwie się wielkością klasy, odległość obu granic przedziałem klasowym (intervall), liczba zaś osobników zaliczona do danej klasy jest liczebnością (frequency). Oczywiście możemy dowolnie ustalać przedziały klasowe, przyczem jednak zmienia się dokładność. Zwiększenie przedziału skraca szereg, wskutek czego dostaje się zwłaszcza przy mniejszej ilości badanych większą


przejrzystość w zgrupowaniu, ale równocześnie zmniejsza się dokładność w szczegółach.

Oczywiście znów stosunki te możemy przedstawić graficznie przy pomocy wykresu.

W tym celu używa się dwu sposobów metody prostokątów lub trapezów. W wypadku pierwszym na osi poziomej odcinamy szereg równych odcinków, z których każdy odpowiada kolejno jednej klasie szeregu. Na końcu każdego odcinka wykreślamy pionowe odpowiadające liczebnościom bezwzględnym lub procentowym danych klas. Po połączeniu tych punktów zapomocą poziomych i wyciągając silniejszą granicę otrzymujemy wraz z osią podstawową wielobok liczebności. Załączona rycina (15) daje wykres procentowy znamion maku wedle metody powyższej.

Przy metodzie trapezów oznaczamy w równych odległościach szereg punktów, z których każdy odpowiada kolejnej klasie nowego szeregu. W każdym punkcie wykreślamy pionowe odcinki, których długość w dowolnych jednostkach odpowiada liczebnościom odpowiednich klas. Łącząc ich wierzchołki otrzymamy znów wielobok liczebności. Przykładem jest rycina (16), na której linja ciągła odpowiada rycinie 15, zaś przerywana daje obraz zmienności ilości promieni fłader.

Wieloboki takie nie są niczem innym, jak narysem w pomniejszeniu zbioru badanych osobników, odpowiednio rozmie-




Rys. 15.





szczonych na płaszczyźnie, jak to widać z ryciny 14. Granice tego wieloboku przedstawiają się poza podstawą będącą linią prostą, jako linia łamana, która, im większa jest liczba badanych, tem bardziej zbliża się do linii krzywej, stąd też zwykle mówi się wprost o krzywych, które są idealnymi granicami nieskończenie wielkiej ilości spostrzeżeń przy cechach o charakterze ciągłym.

Oczywiście wykresy takie sprowadzone do jednakiej skali i sporządzone wedle tych samych zasad umożliwiają wzajemne porównanie, przyczem można analizować, albo jedną cechę wśród różnych grup (Rys. 17), albo zestawiać dwie grupy nawet pod względem znaczniejszej ilości cech. Jeśli w ten sposób zestawimy szeregi liczebności wzrostu uczniów rozmaitych narodowości, zajmiemy się porównaniem jednej cechy w różnych grupach (rys. 16), gdy znowu narysujemy wykresy różnych właściwości tej samej grupy, możemy porównać rozmaite szczegóły kilku cech (rys. 18). Wyżej oznaczona rys. 16 pozwala nam śledzić zmienność w dwu różnych grupach w obrębie dwu różnych cech. Widać z nich, że zmienność promieni fląder waha się w nieco szerszych granicach niż znamion maku, ponadto najliczniej reprezentowana ilość czyli t. zw. moda lub zagęszczenie w pierwszym wypadku godzi się z wartością średnią, wskutek czego krzywa jest prawie symetryczna, u maku przesuwają się na lewo do ilości 9 zamiast 11 znamion, wobec czego gałąź po stronie lewej jest bardziej stroma niż po prawej, krzywa jest niesymetryczna.



Rys. 16.




Rys. 17.

Wzrost a wiek.

Linia ciągła oznacza przeciętną dla gimnazjum VIII przed wojną, kropkowana gminę im. Śniadeckiego, kropkowana warszawską szkołę Konopczyńskiego, kreskowana przeplatana jedną kropką gimnazjum radomskie, równa żydów wileńskich. E oznacza Anglików z Oxfordu, kółko jasne Belgów, krzyżyk Prusaków, krzyż potrójny Rosjan, kółko czarne Wiedeńczyków.





Rys. 18.

Rozwój fizyczny a wiek w gminie im. Śniadeckiego.


Gruba linja u dołu oznaczona 0 przedstawia dla wzrostu wysokość rzędnych 1540 mm, dla obwodu piersi 730, dla wskaźnika piers. 4±0, odżywiania 27·0, budowy 15·0. Dla ułatwienia umieszczono z lewej strony blisko początku odpowiedniej krzywej liczbę wskazującą wysokość. Jednostka na rysunku odpowiada 1 cm.

oznacza wzrost  
obwód piersi  
wskaźnik piersiowy  
wskaźnik odżywienia  
wskaźnik budowy

Krzywe A odnoszą się do roczników, B uwzględniają ściśle wiek w dniu pomiaru.

18 19 20 21 22 17 18 19 20 21 22

Przedziały klasowe i skalę wykresów możemy dowolnie dobierać. Jednak nie wszystkie odpowiadają wymaganiom. Oto (rys. 19) dwa wykresy odnoszące się do tego samego materiału, mianowicie do wzrostu abiturjentów „obywateli gminy szkolnej im. M. Łomnickiego w gimn. VIII“ we Lwowie w roku 1920. Pierwszy, przerywany, zrobiony w przedziałach dwu, drugi, ciągły pięciu centymetrów. Pierwszy gubi się w szczegółach, jest zbyt rozproszkowany, z drugiego wyraźnie widać, że poważna większość badanych skupia się około wzrostu 165 cm (między 155 a 170), a prócz tego jest poważniejsza grupa rośniejszych, powodująca wyniosłość („ząbek“) między 175 a 180. Wybór więc właściwej skali, właściwego przedziału klasowego jest nader ważny, od tego bowiem zależy przejrzystość szeregu i łatwość interpretacji. Jeśli wykres rozciąga się zbyt szeroko, jeśli wykazuje dużo drobnych ząbków, zygzaków i przerw, analiza nic wtedy nie daje, koniecznym jest „wygładzenie“ („polisage“), gdy przeciwnie, skala jest zbyt obszerna, mielibyśmy znów ledwie kilka słupków rzędnych, z których również nic wyczytać nie można, bo zatrać się zupełnie szczegóły. Koniecznym tedy jest ustosunkowanie skali do ilości spostrzeżeń. Jest zasadą, że im więcej spostrzeżeń, tem więcej można wprowadzić przedziałów co raz drobniejszych, przez co obraz staje się dokładniejszy. Wzrost tedy badań pozostaje w prostym stosunku do ilości spostrzeżeń.



Rys. 19.

Oczywiście wykresy można ze sobą porównywać tylko o ile sporządzone są wedle tej samej zasady. Podobnie analiza liczbowa szeregów pozwala nam poznać ich właściwości i do-



kładnie scharakteryzować. Do tego jednak potrzeba ustalenia pewnych stałych wartości zasadniczych.

Pierwsza z nich to tak zwana średnia arytmetyczna czyli przeciętna. Określić ją bardzo łatwo, dodając wartości poszczególnych liczb i dzieląc przez ilość składników. Wyraża ją zatem wzór:

$$A_x = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{k=n} X_k$$

w którym  $n$  oznacza ilość składników,  $\sum_{k=1}^{k=n}$  wyraża sumę składników  $X_k$ , dodanych od pierwszego ( $k=1$ ) do ostatniego czyli  $n$ -tego włącznie ( $k=n$ ). Dla znamion maku wynosi średnia ilość 9·476, dla promieni fłader 53·67.

Mając dany szereg liczebności obliczamy jego średnią z bardzo dokładnym przybliżeniem, mnożąc ( $K_k$ ) wielkości klas przez ich liczebności ( $F_k$ ), a otrzymaną sumę uzyskanych w ten sposób iloczynów dzieląc przez ilość osobników ( $n$ ). Wzór wtedy przedstawia się następująco:

$$A_x = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{k=n} K_k F_k$$

Wedle tych zasad obliczona średnia wysokość gminy im. Łomnickiego w roku 1918 wynosiła przy przedziale klasowym dwucentymetrowym 165·06 *cm*, przy pięciocentymetrowym 165·14, gdy wartość ta obliczona z całą dokładnością wedle wzoru pierwszego z uwzględnieniem milimetrów wynosi 165·11 *cm*, różnice zatem dotyczą dopiero drugiego miejsca dziesiątego.

Drugą charakterystyczną wartością jest tak zwana wielkość szczytowa czyli moda ( $M$ ). Jest to wartość, jaka wykazuje największą ilość osobników w danym szeregu, która zatem okazuje największą liczebność. W naszych przykładach w szeregu promieni pletw fłader wartością tą jest 53, wykazująca liczebność 134 osobników czyli 19·06% ogółu, w odniesieniu do znamion maku jest nią 9, pod którą podpada

560 okazów czyli 24·11%, w odniesieniu do wzrostu z r. 1918 wartość szczytowa przy przedziale pięciocentymetrowym wypada na 165 wynosząc 11 osób czyli 31·57%.

Trzecią wreszcie charakterystyczną wartością jest wielkość dzieląca ogół osobników na pół czyli t. zw. średnia topologiczna albo wielkość środkowa (mediana). Dzieli ona wielokąt liczebności na dwie części równej wielkości, a ogół badanych na dwie równe grupy, z których jedna obejmuje większe, druga zaś mniejsze wielkości. W odniesieniu do gminy im. Łomnickiego wartość ta przedstawia, wobec tego, że liczyła ona wówczas 35 obywateli, 18-ty z porządku osobnik w szeregu, liczący w tym wypadku 165·1 *cm* wzrostu. Chcąc wartość tę oznaczyć w odniesieniu np. do znamion maku przeprowadzamy następujące rozumowanie, opierając się przytem na wykresie metodą prostokątów. Wobec tego, że ilość zbadanych jednostek wynosi 2323 osobników, żądaną wartość reprezentuje osobnik stojący w pośrodku tj. 1162-gi. Jego wartość oznaczmy dodając liczebności poszczególnych klas póki nie otrzymamy dwu wartości, między którymi żądany osobnik się znajduje. Dodawszy cztery pierwsze klasy tj. liczebność osobników mających 5, 6, 7 i 8 znamion, dostajemy  $3+45+240+441=693$ , dodawszy nadto liczebność klasy następnej (9-tej) 560 dostajemy 1256. Średnia topologiczna leży więc w prostokącie reprezentującym klasę 9, której granice stanowią 8·5 i 9·5, a wobec tego, że 1162 jest bliższa wartości 1256 niż 693, przesuwamy się na prawo w kierunku wartości większych. Dokładnie możemy określić jej położenie w następujący sposób: na lewo od prostokąta ( $b$ ), przez który przechodzi średnia topologiczna znajduje się  $a=693$  osobników, na prawo  $c=2323-1256=1067$  osobników. Chodzi o to, jak podzielić podstawę pośredniego prostokąta liczącego  $b=560$  osobników, aby pion przez ten punkt przeprowadzony przepołowił cały wielokąt, obejmujący ogół badanych, tj.  $a+b+c=n$ . Oznaczając przez  $x$  odległość tego punktu od granicy lewej prostokąta czyli wartości  $l_1=8$  i pamiętając, że podział klasowy  $\lambda$  wynosi 1, otrzymamy — wobec tego, że podstawy obu



części prostokąta (czyli  $x$  i  $\lambda - x$ ) mają być proporcjonalne do ilości osobników w obu tych częściach — następującą proporcję:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2}n - a\right) : \left(\frac{1}{2}n - c\right) &= x : (\lambda - x). \text{ Z proporcji tej wynika} \\ \text{dalej } x \left(\frac{1}{2}n - c\right) &= (\lambda - x) \left(\frac{1}{2}n - a\right) = \lambda \left(\frac{1}{2}n - a\right) - x \left(\frac{1}{2}n - a\right) \\ x \left(\frac{1}{2}n - c\right) + x \left(\frac{1}{2}n - a\right) &= \lambda \left(\frac{1}{2}n - a\right) \\ x \left(\frac{1}{2}n - c + \frac{1}{2}n - a\right) &= \lambda \left(\frac{1}{2}n - a\right), \text{ a że} \\ \frac{1}{2}n - c + \frac{1}{2}n - a &= n - (a + c) = b, \text{ przeto} \\ x &= \frac{\lambda}{b} \left(\frac{1}{2}n - a\right) \end{aligned}$$

Z czego średnia topologiczna  $Z = l_1 + x = l_1 + \frac{\lambda}{b} \left(\frac{1}{2}n - a\right)$ .

Podstawivszy wartości szczegółowe dostajemy:

$$Z = 8.5 + \frac{1}{560} (1161.5 - 693) = 8.5 + \frac{468.5}{560} = 9.337.$$

W szeregach symetrycznych, w których w części pierwszej aż do wartości szczytowej w takim stopniu wielkości rosną, jak w drugim maleją, wszystkie te wielkości są identyczne, w szeregach niesymetrycznych wartości są różne, w jednoszczytowych średnia topologiczna znajduje się między średnią arytmetyczną, a wartością szczytową. Wielkości te nie są niezależne, Pearson podaje wzór przybliżony wzajemnego ich związku  $A - M = 3(A - Z)$ . Z wzoru tego łatwo obliczyć teoretyczną wartość modalną dokładniej niż z obserwacji i niezależnie od przedziałów wybranych, co jest ważne przy szeregach ciągłych. Mianowicie

$$M = A - 3(A - Z)$$

W naszym przykładzie ze znamionami maku  $A = 9.476$ ,  $Z = 9.337$ , a wówczas  $M = 9.059$ .

Dla charakterystyki liczbowej szeregu wartości te, z których średnia arytmetyczna jest najczęściej stosowana, jednak nie wystarcza. Chodzi jeszcze o charakterystykę rozmieszczenia poszczególnych wartości, które obrazuje nam graficznie wielokąt liczebności. Typową niewątpliwie jest wielkość pod-

stawy, tj. granica wahań w szeregu. Nie jest to jednak cecha charakterystyczna. Jeden osobnik np. chorobliwie niedorozwinięty może przesunąć granicę dolną daleko, czasem o jedną trzecią pozostałego obszaru. Więc nie odchylenia krańcowe od średniej, lecz odchylenia, które obejmą ogół, będą charakterystyczne.

Wskaźników kilka jest w użyciu, z nich najcharakterystyczniejszy i obecnie najczęściej używany jest wskaźnik zwany odchyleniem średnim albo znamieniem (standard deviation), opierający się na drugiej potędze poszczególnych odchyień. Yule temi słowy uzasadnia tę pozorną nienaturalność wprowadzenia potęgi drugiej: „byłoby bezcelowem przyjąć poprostu sumę odchyień, gdyż wartość jej jest zero, jeśli liczymy od średniej... koniecznem jest stworzyć przeciętną dla odchyień w ten sposób, aby wszystkie odchylenia były uważane za posiadające ten sam znak. Podniesienie do kwadratu jest najprostszym sposobem wyeliminowania znaków, przyczem daje dogodne algebraiczne wyniki“.

Wartość ta, którą powszechnie oznacza się literą  $\sigma$ , oblicza się z wzoru:  $\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^k x_k^2$ .

gdzie  $n$  oznacza ilość osobników szeregu,  $x_k$  odchylenie poszczególnych jednostek  $k$  od średniej,  $\Sigma$  jest konwencjonalnym znakiem sumy.

Uwzględniając cały szereg ugrupowany w klasy o liczebności  $f$  otrzymamy wzór:  $\sigma^2 = \frac{1}{n} \Sigma x^2 \cdot f$ , w którym  $x$  oznacza odchylenie każdej klasy od średniej arytmetycznej. Oczywiście  $\sigma = \pm \sqrt{\frac{1}{n} \Sigma x^2 \cdot f}$  \*)

\*) Jeśli średnia jest wartością ułamkową, odchylenia klas przedstawiają się również ułamkowo, a działania takimi liczbami są bardzo żmudne. Dla ułatwienia przeprowadza się obliczenia nie od dokładnej średniej ( $A$ ), lecz całkowitej wartości przybliżonej ( $A'$ ), a w wyniku uwzględniamy dokładną poprawkę  $a = A - A'$ . W tym wypadku wzór wygląda  $\sigma = \pm \sqrt{\frac{1}{n} \Sigma x'^2 \cdot f - a^2}$ , przyczem  $x'$  jest odchyleniem od wyjściowej  $A'$ .



W wielokrotnie cytowanym przez nas przykładzie zmienności znamion maku wartość odchylenia znamiennego, obliczona przez Chmielewskiego  $\sigma=1.7449$ , zaś dla szeregu promieni fląder  $\sigma=\pm 2.134$ . Jeżeli zaś chodzi o omawianą gminę im. Łomnickiego, to tam przy średniej  $165.11\text{ cm}$  odchylenie znamienne  $\sigma=7.345\text{ cm}$ .

Wartości te związane są miarą użytą przy badaniach i zależą od bezwzględnych wartości danych cech, a więc nie pozwalają na wzajemne porównanie, gdy chodzi o szeregi zwłaszcza ciągłe. Wobec tego tworzy się wielkość niezależną i niemianowaną jako wykładnik procentowego stosunku odchylenia znamiennego do średniej, którą nazywamy wskaźnikiem zmienności ( $v$ ).

$$v = \frac{100 \cdot \sigma}{A}$$

Wskaźnik ten daje się z powodzeniem stosować jako ścisła liczbowa miara stałości, względnie zmienności cech. Im  $v$  jest większe, tem większym wahaniom podlega dana cecha w grupie. Obliczone w ten sposób wskaźniki wynoszą dla promieni pletw fląder  $v=3.97$ , dla znamion maku  $18.415$ , dla uczniów  $v=4.525$ . Dla porównania zaznaczam, że według badań Pearsona charakterystyczne wskaźniki odnoszące się do wzrostu dorosłych Anglików były:  $A=172.8\text{ cm}$ ,  $\sigma=7.04\text{ cm}$ ,  $v=4.07$ , dla Bawarów  $A=165.9\text{ cm}$ ,  $\sigma=6.68\text{ cm}$ ,  $v=4.02$ , Francuzów  $A=166.8\text{ cm}$ ,  $\sigma=6.47\text{ cm}$ ,  $v=3.88$ , wreszcie studentów angielskich z Uniw. w Cambridge, mierzonych w calach:  $A=68.86''$ ,  $\sigma=2.52''$ ,  $v=3.66$ .

~~Biblioteka  
Koła Przyrodników U. M. K.  
w Toruniu~~

#### IV.

### Wykresy obserwacji biologicznych.

Wykres każdy jest graficznym przedstawieniem jakiegoś objawu. Może ilustrować np. przebieg jakiegoś zjawiska, albo być wyrazem jakich stałych stosunków między przedmiotami, które się w odpowiedni sposób uporządkowało i zestawilo. Jest on więc wyrazem pewnych związków funkcyjnych, które można też wyrazić określonymi formułami matematycznymi, co w wielu wypadkach rzeczywiście się udało, wykazując ścisłą prawidłowość mimo zawilosci nierządno bardzo wielkiej. Wykres taki często ułatwia zrozumienie i wyjaśnienie rozpatrywanego zagadnienia, bo subtelną jego analizę pozwala sięgnąć nieraz w głąb bardzo daleko.



Rys. 20.

Jeżeli przez wypreparowany mięsień żabi zawieszony na myografie, przepuścimy dostatecznie silny prąd elektryczny, mięsień na chwilę skurczy się, a pisak zaznaczy ten skurcz na wykresie wyniosłością śladu, poczem w dalszym ciągu kreśli linię prostą, co świadczy, że mięsień mimo przepływającego prądu nie zmienia objętości, a skurczy się znów w chwili przerwania




prądu albo jego wzmocnienia, o czym znów świadczy ruch pisaka. Stąd wynika prawo du Bois Reymonda, że nie sam prąd, lecz zmiana jego natężenia pobudza mięsień. W tem doświadczeniu „krzywa mięśniowa“ (a) wykazuje ramię wstępujące, odpowiadające okresowi kurczenia się i ramię zstępujące, wyobrażające rozkurcz. Oba ramiona są mniej więcej symetryczne, a zatem okresy oba równe. Ponieważ wykres przedstawia się jako linja krzywa, a nie łamana, nie mamy nigdzie ani linji prostej, ani ostrego zagięcia widać, że skurcz początkowo wzmagający się z czasem słabnie, a potem bezpośrednio przechodzi w rozkurcz.

Rzecz zmieni się, gdy na mięsień działać będzie szereg podniet elektrycznych. Wynik zależy od czasu, w jakim podniety po sobie następują. Gdy podniet nowa działa, gdy skurcz poprzedni się skończył, gra zaczyna się na nowo i otrzymamy szereg jednakich krzywych. Gdy natomiast podniet zbliżymy tak, że zacznie działać nim nastąpi rozkurcz, wystąpi tak zw. nakładanie się skurczów, mianowicie druga podniet wywoła skurcz nowy prawie taki, jakby długość, jaką mięsień posiada w chwili, gdy ona zaczyna działać, była normalną (b). Oczywiście wynik będzie największy, gdy początek nowej podniety wypadnie na szczyt działania poprzedniej, co przy mięśniach żaby, wobec tego, że okres całego zjawiska wynosi średnio 0.10 sek., wynosi mniej więcej 0.05 sek. Jeżeli na mięsień skierujemy cały szereg podniet rytmicznych np. uderzeń prądu indukcyjnego, nastąpi przy dość szybkim następstwie sumowanie się działań, a mięsień przejdzie w stadium jakby drżenia, które ujawni się w postaci ząbków na krzywej (c), które w miarę szybkości rytmu podniet stają się coraz szybsze, a wreszcie znikną zupełnie, a krzywa z lekko falistej przejdzie znów w gładką (d). Wtedy mówimy o tężcu zupełnym mięśnia.

A teraz przykład ruchów dowolnych. Zaczerpniemy z badań B. Błażka nad znaczeniem pracy ręcznej jako czynnika wychowawczego.

W doświadczeniach tych badany przy pomocy stosownego ergografu podnosił ciężar zginając kończynę górną w stawie łokciowym, połączony z ergografem przyrząd piszący znaczył wielkość każdego ruchu, wykonywanego wedle taktu metronomu. Równocześnie specjalny myograf znaczył zapomocą osobnego pisaka zmiany w wymiarach mięśni ramienia w czasie pracy. W ten sposób każdy ruch zaznaczył krzywą elementarną ergografu, przedstawiającą się jako ostry ząbek, zwrócony szczytem do góry i odpowiadają krzywą myograficzną. Wszystkie krzywe elementarne składały się na krzywą pracy.



Rys. 21.

Porównując krzywe pracy widzimy różnice w dwu wymiarach. Jeden wymiar to różne zmienne wysokości krzywych elementarnych (ząbków) zależna od pracy mięśnia dwugłowego, wymiar drugi tworzy rozległość całego wykresu zależna od ilości krzywych elementarnych, więc i czasu trwania pracy.


Prawidłowo rozpoczyna się od przyrostu wysokości krzywych elementarnych wskutek działania wprawy, następuje okres pracy pełnej, o określonym rozpędzie i krzywych m. w. jednakich, wreszcie przychodzi znużenie w takim stopniu, że tylko wola może mu się przeciwstawić, wskutek czego występują znów zmiany w wyglądzie krzywych. (Rys. 21).

Te trzy fazy nie wszędzie przedstawiają się jednakowo, często nawet niektóre rozrastają się kosztem innych, co pozwala wnikać w podłoże psychiczne badanego.



Oto w krzywej powyższej po krótkim okresie rozpedowym, obejmującym ledwie trzy takty, następuje okres ciągłej intensywnej pracy od *A* do *C*. Przy *B* występuje znużenie, zaznaczone niższymi ząbkami myogramu (u dołu), siła woli jednak utrzymuje wynik na poziomie, dopiero od *C* znużenie bierze górę. Autor charakteryzuje badanego następująco: „wykazuje pod każdym względem kształtującą się systematyczność i wytrzymałość, objawiającą się patrzeniem na dalszą metę. Na pozór flegmatyk lubi zastanawiać się nad widzianymi i słyszanymi rzeczami i mieć ład we własnych zapatrywaniach“.

Nie potrzeba zdaje się wyjaśniać, że krzywa następna (rys. 22) pochodzi od typowego nerwowca, zapalającego się do pracy, ale szybko przy małym natężeniu ulegającego zniechęceniu i opuszczającego skrzydła.



Rys. 22.


Tu ten obraz graficzny pozwala wnikać w głąb umysłu badanego i określić właściwości eksperymentalnie z dziedziny objawów woli ze ścisłością, którą potwierdza dłuższa i skrupulatna obserwacja.

Przykład inny. Pokarmy wprowadzone do żołądka powodują wydzielanie się soku żołądkowego, przyczem okazuje się, że wydzielanie to nie jest równomierne i stałe, lecz zmienia się z biegiem czasu, a nadto jak wykazały badania Pawłowa

i jego szkoły, zależy też od rodzaju wprowadzanego pokarmu. Znow jasny obraz dadzą nam „krzywe“. (Rys. 23).

Wreszcie przykład z innej dziedziny, który znalazł zastosowanie w tak potężnym i zawilem zjawisku społecznym, jak wielka wojna światowa.

Zjawiska przemiany materji lub energii przebiegają nader prawidłowo tak, że cały proces można wyrazić zapomocą równania wykładniczego, któremu odpowiada właściwa krzywa. Wyrażają one prawo, że szybkość reakcji jest proporcjonalna do masy ciała reagującego. Wyjaśnimy rzecz na przykładzie szczegółowym. Prędkość inwersji cukru trzcinowego jest proporcjonalna do ilości cukru jeszcze niezinwertowanego.



Rys. 23.

Ilość soku żołądkowego, wydzielanego w czasie karmienia (wed. Pawłowa)  
— mięsem ..... chlebem ---- mlekiem

Oznaczając przez *a* stężenie początkowe, *x* miarę stężenia cukru uległego inwersji w czasie *t*, otrzymamy związek wyrażony równaniem

$$\frac{dx}{dt} = k(a-x),$$

gdzie *k* jest stałym współczynnikiem i w naszym wypadku wynosi 0.0015. Całkując równanie otrzymujemy

$$x = a - a \cdot e^{-kt},$$

w którym zmienna *x* wyrażona jest jako funkcja czasu, jako zmiennej niezależnej. Zależność tę można oczywiście przedstawić w postaci wykresu funkcji wykładniczej.

Otóż prof. S. Dąbrowski badając proces wyczerpywania się sił ludzkich w czasie wielkiej wojny, spostrzegł „analogję między wojną światową a jakąś potworną reakcją che-



miczną, która odbywa się w europejskim tyglu dziejowym, kiedy w rozmiarach dotychczas nieznanych i nieprzewidzianych z krwi i żelaza powstaje nowy porządek rzeczy<sup>4</sup>.

Jak w poprzednim przykładzie następuje przemiana jednej odmiany cukru w drugą, w czasie wojny następuje przemiana ludności męskiej z cywilnej na wojskową. I jak tam, tak tu proces ten odbywa się prawidłowo, zależąc od zmiennej niezależnej: czasu. Chodziłoby o wyznaczenie tylko tego stałego współczynnika  $k$ .

Ogólna ilość mężczyzn, która w Austro-Węgrzech była do roku 1918 do dyspozycji wojska wynosiła 11,4 milionów. Po odliczeniu armji odrazu zmobilizowanej 3,7 milj. otrzymujemy ten rezerwuar cywilny  $a$ , który stopniowo przemienia się na materiał wojskowy drogą przeglądów. Gdy po czasie  $t$  uznano  $x$  mężczyzn za zdatnych do wojska, gdy więc z rezerwuaru cywilnego tyłuż ubyło, zapas przedstawi się jako  $a-x$ . Wedle hipotezy Dąbrowskiego, analogicznie do poprzednich przemian chemicznych, szybkość powołań jest wielkością, która zmienia się proporcjonalnie do każdorazowego stanu rezerw, a więc proces przedstawi się wedle równań powyżej podanych.

Jeśli rozumowanie to jest słuszne, współczynnik  $k$  nazywany „współczynnikiem rekrutacji“ powinien być stały. Obliczyć go łatwo z równania drugiego.


$$k = \frac{1}{t} \text{Lg} \frac{a}{a-x}$$

Wedle spostrzeżeń prof. Czekanowskiego dopływ zdatnych t. j.  $x$  wynosił w r. 1915 —3,6 milj., w r. 1916 —1,8 milj., w 1917 —1.1 milj. Wobec tego, że po pierwszej mobilizacji w styczniu 1915 roku rezerwuar mężczyzn  $a$  wynosił 7,7 milj. podstawiając odpowiednie wartości w nasz wzór, możemy obliczyć  $k$ . Wartości te zestawia tabela:

Data	Ilość miesięcy	Ilość cywilnych	Ilość zmobilizowanych	Współczynnik rekrutacji
styczeń	$t$	$a-x$	$x$	$k$
1916	12	4,1	3,6	0.0526
1917	24	2,3	5,4	0.0504
1918	36	1,2	6,5	0.0515

Okazuje się niezwykła stałość współczynnika, którego średnia wynosi 0.0515, co dowodzi słuszności hipotezy: szybkość zamiany cywilnych na wojskowych przebiega wedle prawa wykładniczego, jakiemu podlega wiele zjawisk przyrodniczych. (Rys. 24).

Rozpatrując dalsze szczegóły, okaże się, że równie prawidłowo odbywa się niszczenie zdatnych w szeregach, którzy ustępują, jako zabici, ciężko ranni, obłożnie chorzy i więzi do niewoli nieprzyjacielskiej. Dokładna analiza statystyczna na podstawie dostępnych źródeł wykazała walor tego prawa, przyczem stały współczynnik  $k$  — autor nazywa go współczynnikiem zużycia — wynosi 0.0246. Z kombinacji obu tych praw, mianowicie z różnicy przybywania zdatnych do szeregów, a ubytku bezpowrotnego zdatnych znajdujemy szybkość gromadzenia się zdatnych pod broń, możemy obliczyć punkt krytyczny („ma-




Rys. 24.

$y$  — krzywa szybkości gromadzenia zdatnych pod broń. Jej szczyt to pierwsza faza krytyczna, gdy przyrost pobranych zrównał się ze stratami; załamanie (październik 1917) oznacza drugą fazę krytyczną.  $y_1$  oznacza ilość zdatnych wchodzących w danej chwili w skład armji.  $y_2$  oznacza mężczyzn pozostałych przy życiu z armji zmobilizowanej w r. 1914.



ximum krzywej“), kiedy skupienie zdalnych w wojsku osiąga szczyt, od którego zaczyna się deficyt rezerw, który ostatecznie doprowadził do skruszenia frontu i katastrofy. Profesor Dąbrowski już na przełomie roku 1915/16 wyliczył tę chwilę na lato 1916 roku dla Austrii, a na jesień dla Niemiec. Wyliczył w czasie, gdy mocarstwa centralne stały u szczytu potęgi, gdy o początku kryzysu wiedzieli tylko wtajemniczeni politycy na szczytach i dlatego zabiegali o odrębny pokój z Rosją, a gdy to się nie udało, ogłosili akt 5 listopada, chcąc znaleźć sukurs w żołnierzu polskim. (Rys. 25).



Rys. 25.  
Straty stanowcze Austro-Węgier.

Świadczy to, że i najzawilsze sprawy polityczne i społeczne podlegają prawom przyrody, choć niewątpliwie obok nich działają inne, specjalnie ludzkie, na podłożu psychicznym i etycznym oparte. Passywizm tak gorącego zazwyczaj Królestwa po akcie listopadowym, żelazna konsekwencja Anglososów, a wreszcie brak moralnej siły nowej Rosji, która po upadku caratu doszła do rozkładu bolszewickiego i przekreśliła front wschodni, przedłużając o rok całą wojnę, to wszystko czynniki odmienne, a przeciw pierwszorzędного znaczenia. Lecz i one nie są czemś nieuchwytnym i one podlegają pewnym prawom równie ścisłym, choć nie łatwo dostępnym.



V.

### Zasady systematyki krzywych liczebności.

Chcąc uporządkować spostrzeżenia występujących realnie w przyrodzie stosunków, musimy stworzyć jakieś zasadnicze typy, które służą za miarę porównawczą dla poszczególnych wypadków. W mineralogji tworzy się pewne idealne postaci krystalograficzne, pod które podporządkowujemy okazy spotykane w przyrodzie, z którymi też zestawiamy różnice.

Podobnie w odniesieniu do szeregów liczebności i wyrażających je wieloboków, które charakteryzują „krzywe“, tworzymy też pewne typy zasadnicze. Już samo „wygładzenie“ wykresu, które naturalnie dokonywa się drogą zwiększania ilości spostrzeżeń i zmniejszenia przedziałów klasowych, zbliża odpowiadającą spostrzeżeniu linię łamaną do „krzywej“, rozumianej jako idealna granica przy nieskończeniu licznych spostrzeżeniach, a minimalnych przedziałach.

Krzywe w ten sposób uzyskane wykazywać mogą wielką różnorodność. Typ stanowi t.zw. krzywa Galtona, będąca wyrazem szeregu binomialnego czyli dwumianowego.

Z zasadą tą spotykamy się, gdy mamy do czynienia z dwoma możliwościami, wzajemnie się wyłączającymi. Gdy myśliwy upolował zwierzynę, może to być albo samiec albo samica, znaleziony ślimak może być albo w prawo albo w lewo skręcony, uczeń w danej klasie albo jest rok pierwszy albo repetuje, roślina okrytonasienna może być jednoliścieniowa lub dwuliścieniowa, osoba jest małoletnia lub pełnoletnia i t. d. Najprostszym będzie stosunek taki, gdy przypadki z jednakim prawdopodobieństwem mogą się zrealizować. W przyrodzie spotykamy się z takim wypadkiem np. gdy zbieramy okazy gatunków, u których stosunek płci jest równy, wtedy możliwość znalezienia samca i samicy jest jednakowo prawdopodobna, gdy preparujemy szkielet kręgowca prawdopodobieństwo wydobywania z maceracyjnego kotła kości strony prawej i lewej jest równe, takie też prawdopodobieństwo wystąpi



przy skrzyżowaniu „mendlującego“ mieszańca z pierwszego pokolenia ( $F_1$ ) z czystą rasą recesywną w odniesieniu do fenotypu. Ten sam stosunek zachodzi przy rzucaniu jakiejś monety w odniesieniu do wyrzucania „orła“ lub „reszki“. Prawdopodobieństwo w tych wypadkach tj. stosunek pomyślnych wypadków do ogółu wynosi  $\frac{1}{2}$ .

Przy dwu rzutach występują cztery możliwości, mianowicie 1. Orzeł i orzeł (O i O), 2. Orzeł i reszka (O i R), 3. Reszka i orzeł (R i O), 4. Reszka i reszka (R i R).

Zupełnie to samo będziemy mieli przy mendlowaniu w warunkach wyżej wskazanych. Krzyżując groch biały czystej linii z mieszańcem pierwszego pokolenia potomnego ( $F_1$ ), przy jednym okazie dalszego pokolenia ( $F_2$ ) mielibyśmy możliwość formy białej (B) lub kolorowej (K) przy prawdopodobieństwie takim samym  $p = \frac{1}{2}$ . Przy dwu okazach drugiego pokolenia możliwości są następujące: 1. BB, 2. BK, 3. KB, 4. KK.

Przy trzech rzutach względnie trzech osobnikach, wyrosłych ze skrzyżowanych jak poprzednio nasion, otrzymamy wyniki, gdy do poprzednich dodamy bądź O(B), bądź R(K). Otrzymamy możliwości 8 czyli  $2^3$ , mianowicie: 1. OOO, 2. OOR, 3. ORO, 4. ORR, 5. ROO, 6. ROR, 7. RRO, 8. RRR. Stosunki tego rodzaju zobaczymy przy bardzo wielu rzutach, albo przy obfitym zasiewie nasion i plenności zbioru.

Widzimy tu jednak, że, pomijając porządek, pewne kombinacje powtarzają się częściej, inne rzadziej. I tak najrzadsze są kombinacje jednolite, bo występują w tych ewentualnościach raz: przy dwu rzutach OO i RR, przy trzech OOO i RRR. Natomiast mieszane wystąpią częściej 2 względnie po 3 razy.

Przy czterech rzutach dostaniemy  $16 = 2^4$  możliwości, przyczem znów częstość kombinacji rozdzieli się w myśl powyższej zasady nie równo w stosunku 1 : 4 : 6 : 4 : 1.

Prawidłowość tę możemy uogólnić. Ilość możliwości przy  $n$  rzutach przedstawi wartość  $2^n$ , zatem przy pięciu  $2^5 = 32$ , przy dziesięciu  $2^{10} = 1024$ , przy dwudziestu  $2^{20} = 1,048,576$ . Natomiast ilość występujących kombinacji wyznacza nam, jak widać trójkąt Pascala, podający współczynniki rozwiniętej potęgi dwumianu, które, jak wiadomo, łatwo obliczyć z t. zw.

dwumianu Newtona\*), a dla niższych potęg przedstawiają się następująco:

$n=1$		1	1												
$n=2$			1	2	1										
$n=3$				1	3	3	1								
$n=4$					1	4	6	4	1						
$n=5$						1	5	10	10	5	1				
$n=6$							1	6	15	20	15	6	1		
$n=7$								1	7	21	35	35	21	7	1

\*) Uogólnijmy teraz nasze wywody.

Prawdopodobieństwo równoczesnego wystąpienia dwu zdarzeń, których prawdopodobieństwa są  $p_1$  i  $p_2$ , jest, jak wiadomo z zasad rachunku tego  $P_{12} = p_1 \cdot p_2$ . Jeśli zjawisko jakieś o prawdopodobieństwie  $P_1$  ma się powtórzyć  $a_1$  razy, natenczas wedle poprzedniego prawdopodobieństwa powtórzenia się  $P_{a_1} = p_1^{a_1}$ . Jeżeli dalej ma orzeł wypaść  $a_1$  razy, a reszka  $a_2$  przy ilości rzutów  $n = a_1 + a_2$ , natenczas prawdopodobieństwo przy określonym porządku  $P = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2}$ . Ponieważ w naszym wypadku  $p_1 = p_2 = \frac{1}{2}$ , przeto  $P = (\frac{1}{2})^{a_1 + a_2} = (\frac{1}{2})^n$ . Jeżeli znów rezygnuję z następstwa, to prawdopodobieństwo wzrośnie i to tyle razy, ile jest możliwych przemian czyli permutacyj. Ilość ich, gdy mamy  $m$  przedmiotów (elementów) wynosi  $m! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m$ . Jeżeli jednak wśród nich pewien element powtarza się  $\alpha$  razy, natenczas nie dają one nowych przedstawień, przeto ogólna ilość będzie  $\alpha!$  razy mniej. Gdy nadto inny element powtarza się  $\beta$  razy ilość ich znów zmniejszy się  $\beta!$  razy. Ogólnie więc ilość przemian  $m$  elementów, z których jeden powtarza się  $\alpha$ , drugi  $\beta$ , trzeci  $\gamma$  itd.  $M_m^{\alpha, \beta, \gamma} = \frac{m!}{\alpha! \beta! \gamma! \dots}$ .

Gdy więc ma się w  $n$  rzutach orzeł powtórzyć  $a_1$  razy, a reszka  $a_2$ , natenczas ilość wszystkich możliwości jest  $\frac{n!}{a_1! a_2!}$ . Ogólnie więc prawdopodobieństwo, że w dowolnym porządku zdarzenie Z, o prawdopodobieństwie  $p_1$  wystąpi  $a_1$  razy, wynosi

$$P_{(z_1 a_1 z_2 a_2)} = \frac{n!}{a_1! a_2!} p_1^{a_1} p_2^{a_2}. \text{ A to znów jest ogólny wyraz rozwiniętej potęgi dwumianu } (p_1 + p_2)^n =$$


$$= p_1^n + \frac{n!}{1!(n-1)!} p_1^{n-1} p_2 + \dots + \frac{n!}{a_2! a_1!} p_1^{a_1} p_2^{a_2} + \dots + p_2^n.$$

Gdy  $p_1 = p_2 = \frac{1}{2}$  drugi czynnik wszędzie przybiera wartość  $(\frac{1}{2})^n$ .



Otóż już Quetelet spostrzegł, że w wielu wypadkach liczebności poszczególnych klas dają się wyrazić przez spółczynniki rozwiniętego dwumianu. W tym wypadku mamy zjawisko podobne do wyżej rozważanych, gdzie mamy równe prawdopodobieństwo obu ewentualności, gdzie też ujawnia się t. zw. „ślepy traf“.

Dla ilustracji objawów tego rodzaju Galton skonstruował specjalny aparat, zbudowany na zasadzie zabawki zwanej „deską szczęścia“ (rys. 26). Składa się on z gładkiej, obramowanej deski, w którą wbito pionowo kilkanaście poziomych szeregów gwoździ w ten sposób, aby one były międzyległe. W górze umieszcza się rodzaj lejka z kartonu lub blachy, otwierającego się w samym środku przyrządu między dwoma gwoździami, u dołu znajdują się przegrody rozdzielające zbiorniki. Dla doświadczeń ustawia się aparat lekko pochyły z lejkiem ku górze. Gdy teraz do lejka sypać drobny śrót, okrągłe ziarenka tocząc się w dół obijają się o gwoździe, a wyminawszy wszystkie szeregi gromadzą się w zbiornikach, tworząc typową symetryczną „krzywą schodkową“, której szczyt i oś symetrii wypadają na środek. (Rys. 26). Poszczególne zbiorniki godzą się z spółczynnikiem dwumianu, a w miarę zwiększenia prób, czyli zwiększania wykładnika  $n$  schodki zbliżają się coraz bardziej do krzywej ciągłej, zwanej krzywą normalną (rys. 27), czyli Gaussa.




Rys. 26.

Równanie tej krzywej ma postać  $y = \frac{h}{\sqrt{\pi}} \cdot e^{-h^2 x^2}$ . Wobec tego, że wartość  $\pi$  ( $= 3.14159$ ) i  $e$  ( $= 2.71828$ ) są stałe i określone, równanie, a więc i wygląd krzywej zależą jedynie od jednego parametru  $h$ . Im wartość jego jest większa, tem krzywa jest wyższa, im mniejsza, tem bardziej płaska o szerokiej pod-

stawie. W wypadku pierwszym oczywiście zasięg zmienności jest mniejszy, ogół skupia się około wartości średniej, a zbacza nieznacznie i w nieobficie, przeciwnie w drugim wypadku mamy zbieżenie od średniej obfite i znaczne. A zatem  $h$  można nazwać miarą stałości, a  $\frac{1}{h}$  miarą zmienności.

Wielkość parametru  $h$  zależy oczywiście od szerokości podstawy czyli wartości  $n$ , przyczem wzajemny związek określa

wzór  $h = \sqrt{\frac{2}{n}}$ . Dołączony rysunek (27) przedstawia dwie krzywe



Rys. 27.

o różnym  $h$ ; w I-szej  $h = \frac{1}{2}$ , w II-jej  $h = \frac{1}{4}$ . Gdy uwzględnimy wreszcie wartości charakterystyczne dla szeregów, mianowicie ilość osobników badanych  $N$  i zbieżenie znamienne  $\sigma$ , wzór nasz przybiera formę:

$$y = \frac{N}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

Tylko jednak pewna ilość szeregów daje się interpretować krzywą normalną. Wiele bardzo szeregów wykazuje inne rozmieszczenie. Przedewszystkiem nader częste są krzywe nie-




symetryczne, skośne. Oto n. p. ilość płatków u pospolitej pszonki (*Ficaria ranunculoides*) (Rys. 28) tworzy szereg.

Ilość płatków	7	8	9	10	11	12	13	14
Liczebność	56	665	431	334	303	195	105	103


Podobne ugrupowania dają liczby skonów na dyfterję w odniesieniu do wieku. Oto szereg podany przez Yule'a, oparty na statystyce angielskiej za okres dziesięcioletni 1891 do 1900.

wiek	1	2	3	4	5	10	15	20	25	35	45	55	65
liczebność	4.186	10.491	11.218	12.390	11.194	4.670	818	225	117	79	51	32	26

Tu liczebności rosną gwałtownie do maximum, które obejmuje dzieci między 3 a 4 rokiem życia, poczem spadają tak wolno, że spotykamy liczebności zasługujące na uwzględnienie jeszcze między 60 a 70 rokiem. (Rys. 29)



Rys. 28.



Rys. 29.

Chcąc analitycznie przedstawić krzywe tego rodzaju, Fechner proponował podzielenie ich w punkcie szczytowym i oznaczenie dla każdej gałęzi osobnego równania wykładni-

czego. Pearson znowu wywodzi je z rozwiniętych potęg dwumianu  $(p_1 + p_2)^n$ , w którym jednak  $p_1$  i  $p_2$  nie są równe.

Skośność ujawnia się w tem, że wielkość szczytowa (modalna) ( $M$ ) średnia arytmetyczna ( $A$ ) i topologiczna ( $Z$ ) nie są identyczne. Miarą skośności jest stosunek różnicy przeciętnej (średniej arytmetycznej) i wielkości szczytowej do zboczenia

$$\alpha = \frac{A - M}{\sigma}$$

W przybliżeniu niezbyt dokładnem uwzględniając wzór Pearsona, wiążący trzy charakterystyczne wartości  $M = A - 3(A - Z)$  można tę wartość oznaczyć  $\alpha' = 3 \frac{A - Z}{\sigma}$ .

Skośność jest dodatnia, jeśli średnia arytmetyczna jest większa od topologicznej ( $A > Z$ ), w przeciwnym jest ujemna.

Przy poprzednich rozważaniach, gdy mieliśmy do czynienia z szeregiem mniej więcej symetrycznym, przypuszczamy, że przyczyny wywołujące zboczenie od typu, od wartości normalne są od siebie zupełnie niezależne tak, jak przy owem rzucaniu monetą lub zdobywaniu okazów różnej płci jednako obficie reprezentowanych w danem zbiorowisku, gdzie zatem  $p_1 = p_2$ . Formowanie się krzywych niesymetrycznych Kaptelyn stara się wyjaśnić w następujący sposób.

Jeśli w przyrodzie napotykamy zjawiska, które na różnej wielkości osobniki w rozmaitym stopniu działają, to one nie mogą być od siebie niezależne. Np. spadły w ciągu dnia deszcz spowodował zmianę nasion grochu w różnym stopniu, powodując pęcznienie tak, że wielkość ich jest różna. A w takim razie w następnym dniu i działanie promieni słońca będzie różne na różne wielkości, więc zależne od poprzedniego czynnika. Ale wszelkie czynniki działają na różne wielkości w rozmaity sposób. Przypuśćmy, że nasienie pęcznieje tak, że powierzchnia wzrasta jednostajnie w określonym stosunku, stosunek jednak w takim wypadku do objętości ulegnie zmianie, bo ta rośnie proporcjonalnie do sześciastu promienia, a więc szybciej niż powierzchnia powiększająca

Biblioteka  
Kole Przyrodników U. M. K.  
w Toruniu




się w stosunku kwadratu. Stąd w przyrodzie krzywe niesymetryczne są regułą, choć często zboczenie od normy jest bardzo małe.


Dla ilustracji tej zasady skonstruował przyrządy, które zamiast gwoździ, jak w Galtonowskim, posiadają przeszkody określonego kształtu jako wielokąty. Od ich kształtu i ugrupowania zależy kształt krzywych, co ilustrują wyraźnie dołączone rysunki. (Rys. 30).

Skrajny przykład asymetrii stanowią t. zw. krzywe typu *J*. (Rys. 31) W tym wypadku liczebności rosną do maksimum, które znajduje się w jednym z końców ugrupowania. Typ idealny przedstawiłby się jako krzywa hyperboliczna, wyrażona równaniem  $y = \frac{a}{x}$ .

Przykład szeregów tego rodzaju podaje de Vries w odniesieniu do ilości płatków jaskra bulwiastego (*Ranunculus*



Rys. 30.



Rys. 31.

*bulbosus*). Oto daty a powyżej histogramy (Rys. 31) odnoszące się do trzech seryj spostrzeżeń:

Liczba płatków	5	6	7	8	9	10	11	Razem
Serja A	312	17	4	2	2	.	.	337
Liczebność „ B	345	24	7	.	2	.	2	380
„ C	133	55	23	7	2	2	.	222


Ugrupowanie tego rodzaju można uważać za krańcową formę krzywych niesymetrycznych, od których czasem trudno je odróżnić, zwłaszcza, gdy zebrany materiał nie jest dość subtelnie rozsortowany. Gdybyśmy np. w poprzednim przykładzie skonów na dyfterję wprowadzili przedziały pięcioletnie od początku, kolejne liczby przedstawiałyby się 49.479, 23.348, 4.092 itd. dając obraz typowego szeregu *J*, ze szczytem przy najmłodszych, gdy dokładniejsze rozpatrzenie wykazuje go na wiek 3-4 lat.

Inny znów typ przedstawiają krzywe wieloszczytowe, gdy okazują kilka wielkości modalnych, występujących nad otoczenie. Fałszywe wieloszczytowości mogą powstać przy zbyt małej ilości badań, albo za drobnych przedziałach klasowych, czyli zbyt obfitych klasach. Natomiast są one normą, gdy ma się do czynienia z materiałem niezwartym. Niekiedy nawet wskazuje ten fakt na dwie odmiany (lub więcej), które tworzą między sobą przejścia. Wtedy występują faktycznie dwa szeregi, tworzące osobne maxima. Takie stosunki spotykamy zazwyczaj przy badaniu inteligencji młodzieży w szkołach: obok młodzieży normalnej spotykamy tam pewien procent spóźnionych, uczniów słabych i repetentów, którzy powodują istnienie drugiej, mniej licznej oczywiście wielkości modalnej. Zresztą mogą one występować w rozmaitym stopniu i wyglądzie od prawie jednoszczytowych, a tylko lekko niesymetrycznych, gdy wielkości modalne są bardzo blisko aż do dwu niemal krzywych, zrastających się u podstawy (Rys. 32).

Wskaźnikiem rozbieżności przy dwuszczytowej krzywej jest odległość wielkości modalnych, wyrażona w stosunku




do zboczenia znamiennego ( $\sigma$ ). Wskaźnik odosobnienia czyli izolacji dwu zbiorów zmiennych, grupujących się około swych wartości szczytowych określa stosunek liczebności zniżki do niższej wielkości modalnej.




Rys. 32.

Znów jako pewien objaw graniczny, to szeregi dające krzywe



Rys. 33.

liczebności kształtu U (Rys. 33), gdzie maxima znajdują się na krańcach, a środek przedstawia minimum. Typ ten jest



Rys. 34.

bardzo rzadki, wykazują go n. p. stosunki zachmurzenia nieba we Wrocławiu, badane w latach 1876—1885. Okazuje się, że najczęstsze było niebo całkowicie lub prawie całkowicie zakryte, następnie zupełnie jasne, gdy częściowe zachmurzenie było radsze. Oto tabela i odpowiedni histogram. (Rys. 34).

topień zachm.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Razem
Ilość dni	751	179	107	69	46	9	21	71	194	117	2089	3653

Podobne stosunki dają się też zauważyć przy badaniach dziedziczności jednostronnej u dzieci w stosunku do rodziców.

Dla przykładu tabela procentu głuchoniemych wśród dzieci małżeństw, w których przynajmniej jedno z małżonków było głuchonieme, na podstawie statystyki biura Volta w Waszyngtonie.

% głuchoniemych	0	— 20	— 40	— 60	— 80	— 100	Razem
Ilość rodzin	220	20·5	12·—	5·5	15·—		273



VI.

**Transformizm w oświetleniu matematycznym.**

*Liczbowe prawa dziedziczności.*

Przy studjowaniu dziedziczności i zmienności istota zagadnienia polega na określeniu, o ile ze znajomości określonych cech danej formy np. wielkości, ciężaru, ilości wielokrotnych narządów, jakości i nasycenia barwy możemy wnioskować o tych właściwościach u potomstwa. Zagadnienie pozornie tak proste, okaże się jednak zawilszem, gdy uwzględnimy, iż o właściwościach decyduje nie tylko postać, nie tylko komórki płciowe czyli gamety, lecz wpływ czynników zewnętrznych, otoczenie. Nie tylko różne nasiona wydadzą odmienne rośliny, mimo, że będą rzucone w ten sam grunt, ale i odwrotnie to samo nasienie inaczej rozwinie się na gruncie żyznym, inaczej na jałowym, inaczej w roku słotnym, inaczej w czasie posuchy itd. Tu znowu badania statystyczne, jako masowe, niwelują przypadkowe wahania przygodne i nadają większej ścisłości uogólnieniom. Pierwsze próby ścisłego badania dziedziczności zawdzięczamy Franciszkowi Galtonowi. Doświadczenia dotyczyły rozmiarów nasion groszku wonnego (*Lathyrus odoratus*), dwu pokoleń. Oznaczając wielkości poszczególnych klas jako procentowe wartości wielkości średniej otrzymał szeregi następujące:

Wielkość nasion pokol. rodzic.	(P)	88	89	94	100	106	111	117
średnia " " " potomnego (F <sub>1</sub> )		94	96	98	100	102	104	106

Gdy uwzględnimy zboczenia wielkości poszczególnych klas od średniej, okaże się, że zboczenia szeregu potomnego są znacznie mniejsze, wynoszą mniej więcej  $\frac{1}{3}$  (0.35). Wynika


z tego wyraźnie dążenie do wyrównania ekscesów,  $\frac{1}{3}$  tylko zboczeń rodzicielskich przechodzi na następne pokolenie,  $\frac{2}{3}$  znikają bez śladu.

Podobne wyniki dały badania nad statystyką ludzi w odniesieniu do wzrostu, barwy oczu itd., jakkolwiek wskaźniki trwałości dziedziczenia nowych cech i oddźwięku wstecznego (atawizm) bywają odmienne.

Wynika stąd zasada, że formy, które od normy wyraźnie zbaczą, mają zazwyczaj rodziców, którzy mniej zbacza, a również zazwyczaj wydają potomstwo, które także mniej zbacza. Innymi słowy, w naturze zaznacza się dążność do usunięcia ekstremów, a ustalenia typu przeciętnego.

Otóż teraz nasuwa się pytanie, jak zjawisko to objawi się, gdy działa dobór.


Chodzi o to, czy w tym wypadku nastąpi przesunięcie odpowiedniej krzywej. Gdy np. z generacji I, którą reprezentuje krzywa I (Rys. 35), wybieram do rozplodu formy nie środkowej wartości, lecz skrajne np. duże z punktu  $x$ , natenczas w dalszych generacjach mogą pojawić się następujące 3 ewentualności. Jeżeli działanie doboru jest twórcze bezwzględnie, musi nastąpić przesunięcie i powstanie szereg, który ilustruje krzywa II z rzędną  $x'$  jako środkiem i takim samym zasięgiem podstawy. Gdy zmienności gatunku niema, gdy dobór nie działa, szereg się nie zmienia tak, że reprezentuje go ta sama krzywa I. Jeżeli wreszcie działanie jest częściowe wedle zasady Galtona, powstałby szereg nowy o wartości średniej mniejszej  $x'' = \frac{2}{3}x'$  i mniejszym zasięgu, jak to widać na krzywej III.



Rys. 35.



Jakżeż przedstawiają się te stosunki w rzeczywistości? Zwyczajne doświadczenie hodowlane, na których Darwin oparł swą teorię, przemawiają na korzyść pierwszej ewentualności. Tymczasem dokładne badania wykazały co innego. Oto przede wszystkim Jennings badając zmienność wielkości pod



Rys. 36.

wplywem doboru wymoczka kęsusia (*Paramecium*) stwierdził przede wszystkim, że zmienność nie jest nieograniczona, że tak powyżej maksimum określonego, jak niżej minimum w normalnych warunkach form wyhodować nie można. Dalsze zaś badania wykazały, że wśród całej masy badanych osobni-

ków można wyróżnić 8 grup, o szeregach ścisłych i niezmiennych. I gdy przy hodowli ogólnej można się spotkać z przesunięciem krzywych, to przy ograniczeniu się ściśłem do określonej grupy, czyli przy hodowli t. zw. czystej linii otrzymujemy bezwzględnie identyczne szeregi, których krzywe są stałe. Ilustruje tę zasadę dołączony rysunek (36). Wszystkie figury przedstawiają wszelkie możliwe wymiary od 370 do 45  $\mu$  czyli t. zw. pełną populację. Otóż, gdy osobniki skrajne dają tylko jeden szereg, największe szereg górny, najmniejsze dolny, to formy pośrednie mogą dawać szeregi rozmaite (II—VII), dając złudzenie przesuwania się krzywych. Faktycznie jednak, gdy ustalimy przynależność jakiegoś osobnika do określonej grupy, czyli gdy uzyskamy czystą linię, wtenczas bez względu na to, jakie osobniki wybieramy, dostajemy stereotypowo ten sam szereg. Jeśli np. wybierzemy do hodowli szósty z kolei osobnik z grupy oznaczonej na rysunku literą A1, natenczas choć osobniki tej samej wielkości znajdują się w innych grupach (np. w G1 siódmy, w D drugi), to przecież potomstwo jego odtworzy tylko szereg rodzicielski, więc A1, nie wytworzy ani form większych, jakie występują w grupie a i A1, ani osobnika małego z końca grupy D. Gdyby zaś osobnik wybrany tej samej wielkości pochodził z szeregu D, natenczas w pokoleniach dalszych tworzyłby szereg D, o jednej tylko formie większej, ale nie wykazujący czterech form znaczniejszych, które występowały w poprzednim wypadku.

W rzezonym wypadku pionowa kreska x—x oznacza zatem średnią wartość populacji, czyli całego zbiorowiska, krzyżyki zaś oznaczają średnie wartości poszczególnych czystych linii. Gdy zatem z całej populacji wybierzemy jakiś skrajnie wielki okaz i badamy jego potomstwo, otrzymamy pozorne skrócenie się krzywej tak, jak domaga się tego zasada Galtona. Faktycznie zaś nie mamy tu wcale objawu działania doboru, lecz jedynie izolację osobnika linii największej, który daje oczywiście szereg najwyższy (a), sięgający na prawo tylko do 105, a więc nie mający tak małych osobników, jak cała populacja, obejmująca i dolne szeregi.



Doświadczenia te, które szeroko przeprowadzał na roślinach W. Johannsen, wykazały, że zmienność wskutek samego doboru bez towarzyszących zmian warunków, występuje tylko w ścisłych granicach, a przesunięcia szeregów mają miejsce, gdy badany materiał nie jest jednolity i obejmuje więcej grup, gdy zatem przedstawia nie czystą linię, lecz populację złożoną. Wszelkie więc przykłady Darwina zmienności selekcyjnej, jako też zasady Galtona opierają się na obserwacjach, dokonywanych w obrębie populacji. W czystych liniach dobór nie działa.

Opierając się na tych spostrzeżeniach, wyróżnia Johannsen formy, które mimo jednakiego wyglądu należą do odmiennych grup, dają odmienne szeregi rozwojowe w następujących generacjach z powodu odmiennego podkładu materialnego, odmiennego złożenia elementów rozrodczych czyli gamet, które to zasadnicze składniki zwie on krótko genami. Takie formy zewnętrznie jednakie, rodowo jednak różne, zwie on fenotypami<sup>1)</sup> i przeciwstawia im genotypy, które mimo pozornych różnic, wykazują te same geny i dlatego dają szeregi identyczne, stanowią czyste linie.


Dobór zatem nie tworzy, on tylko usuwa pewne formy. Nowe formy mogą powstać drogą odmiany w kombinacji genów, co występuje przy krzyżowaniu, albo drogą zmian samych genów przy mutacji lub pod wpływem działania czynników zewnętrznych.

A zatem powstają nowe typy jako t. zw. mutacje wskutek czynników bliżej nam nieznanych, oraz pod wpływem czynników zewnętrznych w sensie przypuszczeń Lamarecka i Geoffroy St. Hilaire'a, przyczem, jak wykazują badania Towera, nie jest obojętnym stadjum rozwojowe, podczas którego czynniki mają działać, aby nowa cecha ustaliła się jako dziedziczna. Niekiedy mogą wystąpić wreszcie nowe właściwości nie jako wynik nowych genów lub ich zmian — o ile to wogóle

<sup>1)</sup> od *φαινοται* — wydają się.

jest możliwe — lecz wskutek nowej ich kombinacji, co dzieje się przy skrzyżowaniu i tworzeniu mieszańców. Jest wielkopomną zasługą ks. Grzegorza Mendla zapoczątkowanie badań w tym kierunku i wykrycie liczbowych praw, rządzących temi objawami. Wychodzi poza ramy pracy naszej rozpatrywanie dokładniejsze wszystkich badań i zdobyczy naukowych z tej dziedziny, ograniczymy się do podstawowych pojęć, które dają się matematycznie sformułować.

Jeżeli np. skrzyżuje się dwie odmiany rośliny dziwaczka jalappa cz. nocnej ozdoby (*Mirabilis Jalappa*), jedną kwitnącą czerwono, drugą białą, uzyskane przez to mieszańce ( $F_1$ ) okażą właściwości pośrednie, zakwitną różowo. Przypuszczamy, że następuje to wskutek kombinacji genów w obu odmianach, więc genu warunkującego czerwien z genem bieli. Lecz gdy nastąpi teraz samozapylenie, to powstałe w ten sposób drugie pokolenie potomne ( $F_2$ ) okaże różnorodność wyglądu:  $\frac{1}{4}$  czyli 25% form kwitnie czerwono,  $\frac{1}{4}$  białą, a  $\frac{2}{4}$  czyli 50% różowo. Przy zachowaniu czystości linii, więc wykluczeniu dalszego skrzyżowania, a stosowaniu tylko samozapylenia, okaże się, że formy czerwone i białe są ustalone, wydają potomstwo stale takiej samej barwy, gdy formy różowe dają potomstwo trojaki, czerwone, białe i różowe i to ściśle wedle podanego wyżej stosunku liczbowego. Ilustruje te stosunki załączony (rysunek 37A), w którym kółka oznaczają geny, a prostokąty wygląd zewnętrzny (fenotyp), pola czarne oznaczają czerwien, punktowane barwę różową, białe białą.



Rys. 37.

Atoli już Mendel stwierdził w swych doświadczeniach, że u pewnych gatunków przy skrzyżowaniu nie występują formy pośrednie, ale pierwsze zaraz pokolenie ma wygląd je-



dnego z rodziców, którego cechy przeważają, czyli są dominujące, gdy przeciwnie cecha, która pozornie i czasowo znika zwie się recesywną. I tak przy skrzyżowaniu grochu barwnego z białym cechą dominującą okazuje się barwność, a więc te formy, które u dziwaczka są pośrednie, różowe, tu mają typ barwny. Wskutek tego i stosunki liczbowe przedstawiają się nieco inaczej, mianowicie w pokoleniu II potomnem ( $F_2$ ) 75% okaże cechy dominujące, 25% recesywne. Z tych form o cechach dominujących  $\frac{1}{3}$  (czyli  $\frac{1}{4}$  ogółu) wydaje dalsze pokolenie wyłącznie barwne, świadcząc o linii czystej, pozostałe znów dają potomstwo mieszane, czyli „mendlują“ wedle tych samych stosunków liczbowych. Oczywiście formy białe tworzą linię czystą. Załączony schemat ilustruje te stosunki.

Zasady te stwierdził Mendel na 12 cechach, a późniejsze badania potwierdziły ściśle liczbowe stosunki na licznych próbach wśród zwierząt i roślin.

Taka sama prawidłowość wystąpi, gdy krzyżujemy rasę czystą z mieszańcem. Gdy np. mieszańca pierwszego pokolenia (o genach obu typów) skrzyżujemy z czystą rasą typu recesywnego, dostaniemy, jak łatwo przekonać się na zasadach kombinatoryki, że już wśród potomstwa w pierwszym pokoleniu ( $F_1$ ) wystąpi 50% osobników o typie recesywnym, a 50% typu mieszanego, więc z cechami dominującymi. Rysunek 37B znów wyjaśnia <sup>1)</sup>.

Nieco zawilej przedstawiają się stosunki przy większej ilości cech, które mogą się kombinować zupełnie niezależnie.

<sup>1)</sup> Stosunki te przedstawić można jako kombinacje liter. Oznaczając geny cechy dominującej literą  $D$ , a recesywnej  $r$ , otrzymamy następujące kombinacje, przyczem jeśli w kombinacji wystąpi  $D$ , wygląd zewn. odpowiada typowi dominującemu

	1) przy skrzyż. ras czystych	2) mieszańca z cechą reces.	3) mieszańca z cechą domin.
$P$	$DD \times rr$	$Dr \times rr$	$DD \times Dr$
$F_1$	$\frac{Dr \times rD}{}$	$\frac{Dr \ Dr \ rr \ rr}{}$	$\frac{DD \ DD \ DD \ Dr}{}$
$F_2$	$\frac{DD \ Dr \ rD \ rr}{3 \ D \ : \ 1 \ r}$	$1 \ D \ : \ 1 \ r$	$4 \ D \ : \ 0 \ r$

Correns badał dwie odmiany kukurydzy, z których jedna ma ziarna ciemne (sine) i pomarszczone, druga żółte i gładkie. Cechy ciemna barwa i gładkość okazują się dominującymi, w pierwszym więc pokoleniu potomnem ( $F_1$ ) ziarna są ciemne i gładkie. Jeśli te dalej hodować bez krzyżowania, dostanie się w pokoleniu następnem ( $F_2$ ) kombinacje w następnym stosunku: 9/16 ciemnych gładkich, 3/16 ciemnych pomarszczonych, 3/16 żółtych gładkich i 1/16 żółtych pomarszczonych. Każda więc cecha mendluje niezależnie. Stosunek barw wyraża się liczbą 3 : 1, tak samo stosunki wyglądu powierzchni. Wobec tego, że każda z możliwości jednej cechy może się kombinować z możliwościami drugiej cechy, dostajemy stosunek liczb 9 : 3 : 3 : 1.

Przy  $n$  parach cech możliwości tych jest  $2^{2n}$ . Przy przewadze jednej z cech w każdej parze otrzymuje się liczby, które wychodzą z rozwinięcia dwumianu  $(\frac{3}{4} + \frac{1}{4})^n$ , przyczem współczynniki podają, ile razy powtarza się odpowiednia liczba. Dla  $n = 3$  mamy np.

	27.	9.9.9	3.3.3	1	
	1	3	3	1	
a dla $n = 4$	81.	27.27.27.27	9.9.9.9.9.9	3.3.3.3	1
	1	4	6	4	1

Widzimy więc, że dostaje się liczne nowe kombinacje genów, jakich nie było w formach rodzicielskich. Przy 10 cechach dostajemy np. 1024 kombinacji. Z tych zaś mogą się zachować jako czyste trwałe linie te, które z każdej pary cech wykazują jednakie geny (homozygoty).

Gdy znowu cechy nie wykazują przewagi, lecz występują wszędzie formy pośrednie, natenczas formułę liczbową otrzymuje się, rozwijając wielomian  $(\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{1}{4})$ .



VII.

Współzależność.

O dwu lub więcej zjawiskach mówimy, że są od siebie zależne, jeśli wykazują pewne prawidłowości we współistnieniu lub w swych zmianach. Zagadnienie to ma pierwszorzędne znaczenie w nauce i w praktyce. Chodzi o to, czy w organizmie biologicznym, lub społecznym rozmaite właściwości są związane ze sobą, czy niezależne, innymi słowy czy z charakteru jednej cechy można wnioskować o charakterze innej.

Pierwszym, który naukowo głosił zasadę zależności narządów, był Stefan Geoffroy de Saint Hilaire, głosząc w roku 1807 swą naukę o „wahaniu organicznem“ (balancement organique). Dziś używa się nazwy „korrelacji“ dla określenia wzajemnej zależności i to tak w znaczeniu ogólniejszem, gdy mówi się o normalnem występowaniu jednego zjawiska, cechy itd. z drugim (Dallas), jak i w ciaśniejszem, gdy mowa o wzajemnej zależności i oddziaływaniu części w organizmie (Goebel). Ta wzajemna zależność może być zresztą bardzo rozmaita, może ujawniać się w budowie, czynnościach, przebiegu zjawisk itd. W pewnych wypadkach przedstawia się nam zupełnie zrozumiale np. ćwiczenie i rozwój mięśni, nawet barwa oczu i włosów, czasem zupełnie zagadkowo i tajemniczo np. głuchota białych kotów z niebieskimi oczyma.

Rozpocniemy rozpatrywanie liczbowego wyrażenia tych zjawisk od wypadku najprostszego, gdy mamy do czynienia z jedną parą zjawisk, przy których chodzi o poznanie zależności w samem ich występowaniu. W tym celu rozpatrzemy przykład, oparty na badaniu nałogów w gminie szkolnej im. Jędrzeja Śniadeckiego. Zbadamy, czy istnieje jakiś związek między wstrzemięźliwością, względnie rozpusztą z jednej, a niepaleniem względnie nikotynizmem z drugiej strony. Statystyka wykazała, że wśród 12 palących był 1 abstynent, natomiast wśród niepalących czterech oddawało się rozpuście a 12 było bezwzględnie wstrzemięźliwych. Zestawiamy tę statystykę w tabliczce szczegółowej, a obok podajemy tablicę ogólną o dowolnych cechach czy zjawiskach  $x$  i  $y$ , których zależność badamy.

		nikotynizm		$\Sigma x$
		palący	nie	
rozpusztą wstrzem.	nie	11	4	15
		1	12	13
$\Sigma y$		12	16	28

		cecha $x$		$\Sigma x$
		+	-	
cecha $y$	+	$a$	$b$	$a+b$
	-	$c$	$d$	$c+d$
$\Sigma y$		$a+c$	$b+d$	$n$

Gdyby nie było jakichś specjalnych przyczyn, powodujących odmienne ugrupowanie elementów wartości  $a, b, c, d$ , byłyby sobie równe, w naszym więc szczegółowym przykładzie każda z 4 krutek środkowych zawierałaby liczbę 7. Skoro jest inaczej, muszą działać jakieś specjalne czynniki, powodujące silniejszy związek pewnych elementów ze sobą. Jakże liczbowo wyrazić tę zależność i jej siłę. Kratki  $a$  i  $d$  zawierają ilość wypadków zgodnych,  $b$  i  $c$  przeciwnych. Ilość tedy wypadków zgodnych zmniejszona o ilość przeciwnych w stosunku do ogółu ( $a+b+c+d=n$ ) będzie najprostszą miarą tej zależności.

Wzór tedy przedstawi się: 
$$r = \frac{(a+d) - (b+c)}{a+b+c+d}$$

Gdy w jakimś wypadku szczegółowym  $b$  i  $c$  są równe 0, natenczas oczywiście zachodzi zupełna zgodność, a wartość  $r=1$ , gdy przeciwnie  $a$  i  $d$  spadną do zera, zachodzi zupełne przeciwieństwo czyli t. zw. korrelacja odwrotna, a wtedy  $r=-1$ , gdy  $a=d=b=c$ , brak wszelkiej zależności, a  $r=0$ , w wypadkach pośrednich  $r$  przybiera wartości ułamkowe między  $+1$  i  $-1$ .

Jest to najprostszy, ale i najmniej dokładny sposób wyznaczania współczynnika korrelacji, wzór ścisły natomiast przybiera formę (Bravais'a)

$$r = \frac{ad-bc}{\sqrt{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}}$$



W naszym szczegółowym przykładzie  $r$  obliczone według pierwszej metody wynosi 0.64, gdy właściwa jego wartość według wzoru poprawnego wynosi 0.681. Zgodność tedy dość znaczna. Ale również można zależność taką stwierdzić nietylko wtedy, gdy właściwości badane przedstawiają się jako dwie różne, wyłączające się jakości, lecz gdy tworzą szeregi wieloczlownowe. W tym celu układa się szereg liczebności wedle cechy zasadniczej  $x$  (subject character) i szereg cechy zależnej cz. względną  $y$  (relative char.) i oznaczywszy ich wskaźniki zбочenia  $\frac{x}{\sigma}$ , tworzymy stosunek wskaźnika cechy zależnej do zasadniczej, otrzymując w ten sposób współczynnik korelacji. Oczywiście o zależności nie można wnioskować na podstawie jednego przypadku, wyniki są tem dokładniejsze im obfitszy mamy materiał statystyczny.

Dla zorientowania się rozpatrzmy przykład podany przez Johannsena, oznaczający związek ciężaru ziarna owsa z procentową zawartością tłuszczu.


Oto tabela podająca ilość egzemplarzy, spełniających warunek, przyczem przedział klasowy w odniesieniu do ciężaru wynosi 5 mg, w odniesieniu do tłuszczu 0.5%.

Ciężar ziarn	Procent tłuszczu									Razem	śred. % tłuszczu
	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5		
30	.	.	.	.	8	2	1	.	.	11	6.93
35	.	1	6	22	33	10	2	1	.	75	6.62
40	1	2	10	48	37	8	1	.	.	107	6.43
45	.	1	12	11	2	.	.	.	.	26	6.02
50	.	2	1	1	.	.	.	.	.	4	5.63
55	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	(5.75)
60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Razem	1	6	30	82	80	20	4	1	.	224	6.46
śr. ciężar	(42.5)	45.8	44.3	41.9	40.1	39.0	37.5	(37.5)	.	41.12	.

Tabela ta odrazu wskazuje, że średni procent tłuszczu maleje przy wzroście ciężaru i odwrotnie. Tu mówimy więc o korelacji ujemnej albo odwrotnej. Tabela ta wyraźnie rozmieszczeniem swych wartości wykazuje zależność, nie zawsze

jednak stosunki są tak wybitne. Istnieją jednak metody umożliwiające wykrycie nawet śladów zależności i dokładne oznaczenie jej stopnia.

Prostą jest metoda graficzna. Na osi poziomej oznaczamy w równych odstępach klasy jednej właściwości, a na odpowiednich rzędnych oznaczamy odpowiadające średnie wartości drugiej. Kąt pochylenia prostej wyrównującej linje, przeprowadzone przez wierzchołki rzędnych, stanowi miarę korelacji. Gdy kąt jest ostry, tj. gdy prosta wznosi się ku prawej, korelacja jest dodatnia, gdy kąt jest rozwarty, korelacja jest ujemna. Załączona rycina 38 jest ilustracją poprzedniej tabeli cyfrowej.



Rys. 38.

Stopień zależności określić też można liczbowo zapomocą t. zw. współczynnika korelacji. Sformułował go Bravais w roku 1846, określając jako  $r = \frac{\sum a_x \cdot a_y}{n \cdot \sigma_y \cdot \sigma_x}$ . Wartość podobnie, jak przy zależności rozjemczej waha w granicach od +1 do -1.

W celu obliczenia oznacza się średnie wartości obu zmiennych i te oznacza jako  $O$ , inne zaś przedstawia jako dodatnie lub ujemne zбочenia. Tabela rozdzieli się na cztery ćwiartki i przybierze w takim razie wygląd następujący:

$a_x = \downarrow$	$A'_y = 6.25$								Suma
	$a_y = -3$	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	
-2	.	.	.	.	8	2	1	.	11
-1	.	1	6	22	33	10	2	1	75
$A'_x = 42.5$	0	1	2	10	48	37	8	1	107
+1	.	1	12	11	2	.	.	.	26
+2	.	2	1	1	.	.	.	.	4
+3	.	.	1	.	.	.	.	.	1
Suma	1	6	30	82	80	20	4	1	224

Szereg X

Szereg Y



Otóż chcąc obliczyć licznik formuły tworzy się sumę iloczynów wartości zboczeń, pomnożonych przez ilość osobników danej kategorii, a następnie sumę tę dzieli się przez iloczyn zboczeń znamionnych obu zmiennych i ilości ogółu zbodanych. Więc np. w tablicy powyższej obliczamy wartości w ćwiartce lewej górnej  $(-2) \cdot (-1) \cdot 1 = -2$ ,  $(-1) \cdot (-1) \cdot 6 = 6$ ; w dolnej  $(-2) \cdot (+1) \cdot 1 = -2$ ,  $(-1) \cdot (+1) \cdot 12 = -12$ ,  $(-2) \cdot (+2) \cdot 2 = -8$ , . . itd. Oczywiście iloczyny cyfr umieszczone na środkowym krzyżu mają wartość 0. Suma wszystkich wartości dodatnich wynosi +10, ujemnych -120. Zatem cała suma iloczynów  $\Sigma(a_x \times a_y) = -110$ .

Zboczenia znamienne obliczamy w sposób zwykły, wynoszą one  $\sigma = 0.829$ ,  $\sigma_y = 1.031$ .

Uwzględniając poprawki w liczniku, wobec tego, że przyjęliśmy za wyjściowe wartości nie średnie ( $A$ ), lecz przybliżone ( $A'$ ) otrzymujemy:

$$r = \frac{-110 - [224 \cdot (-0.268) \cdot 0.406]}{224 \cdot 0.829 \cdot 1.031} = -0.447, \text{ co świadczy}$$

o znacznej korelacji odwrotnej, ilość tłuszczu mianowicie spada ze wzrostem ciężaru.

Interesującym jeszcze jest oznaczenie stosunku, w jakim zmiana jednej właściwości (zmiennnej niezależnej) wpływa na zmianę drugiej (zmn. zależnej). Wyraża go t.zw. współczynnik regresji, którego wzór  $R = r \frac{\sigma_y}{\sigma_x}$ . W omawianym wyżej przykładzie  $R = -0.556$ , t. zn. że przy wzroście ciężaru ziarna o jednostkę ilość tłuszczu maleje o 0.556 jednostki.

Współzależność możemy stwierdzić także w odniesieniu do cech niewymierzalnych. W tym celu albo grupujemy osobniki wedle obecności i braku danej cechy, a więc zagadnienie sprowadzamy do współzależności rozjemczej, albo też szeregujemy badane osobniki w klasy wedle oznaczonego porządku i zestawiamy liczby porządkowe klas. Jeżeli 2 lub więcej osobników okazuje daną właściwość w tym samym stopniu, natenczas otrzymują one tę samą rangę jako średnią wszystkich odno-

śnych osobników. Zależność tę Schultze zowie koordynacją, a jej współczynnik ( $\rho$ ) oblicza się wedle następującego wzoru:

$$\rho = 1 - \frac{6 \Sigma(x-y)^2}{n(n^2-1)}$$

przyczem  $x$  i  $y$  oznaczają liczbę porządkową (rangę) osobnika w odniesieniu do cechy  $X$  i  $Y$ ,  $n$  jest, jak zwykle, ilością osobników. Wzór ten jest mniej dokładnym. Chcąc nadać większą ścisłość, sprowadzamy współczynnik  $\rho$  do  $r$  wedle formuły:

$$r = 2 \sin\left(\frac{\pi}{6} \cdot \rho\right).$$

Przykład wyjaśni rzecz szczegółowo. Zestawiono wyniki klasyfikacyjne w klasie ( $y$ ) i stopień zdolności ( $x$ ) w gminie im. Łomnickiego we Lwowie w r. 1920. Porządek okazał się następujący:

$x =$	19	20	13.5	18	6	7.5	9.5	5	15	2	1	16	7.5	17	13.5	15.5	11.5	4	3	9.5
$y =$	18	18	13.5	3	9	10.5	12	6	6	18	15.5	6	3	15.5	3	10.5	13.5	20	1	8
$x-y$	1	2	0	15	-3	-3	-2.5	-1	9	-16	-14.5	10	4.5	1.5	10.5	1	-2	16	2	0.5
	$\rho = 0.029$										$r = 0.030$ .									

Badania powyższe mają pierwszorzędne znaczenie teoretyczne, jako wprowadzające czynnik ścisłości w pozornie chaotyczny materiał. Mają znaczenie też i praktyczne, może korzystać z nich racjonalny hodowca, ważne są dla pedagoga. Może są mniej sensacyjne niż rozmaite fantastyczne teorie i domysły, ale dla nauki niewątpliwie trwałej wartości, wprowadzając do biologji prawa równie ściśle, jak przy zjawiskach świata nieożywionego.

Biblioteka  
Muzeum Przyrodniczego U. M. K.  
w Toruniu





N  
826107

Wydział BiNoZ UMK



309000368643

## Spis rzeczy

	str.
I. Zadania i metody biometryki . . . . .	3
II. Zagadnienie badania ilościowego w biologji . . . . .	8
III. Metoda szeregów w biologji . . . . .	16
IV. Wykresy obserwacji biologicznych . . . . .	31
V. Zasady systematyki krzywych liczebności . . . . .	39
VI. Transformizm w oświeceniu matematycznym . . . . .	50
VII. Współzależność . . . . .	58

# PRZYRODA I TECHNIKA

CZASOPISMO, POŚWIĘCONE  
ZAGADNIENIOM PRZYROD-  
NICZYM I ICH ZASTOSOWA-  
NIU. — WYDAWANE PRZEZ  
POLSKIE TOWARZYSTWO  
PRZYRODNIKÓW IMIENIA M.  
KOPERNIKA (BYDGOSZCZ,  
KRAKÓW, LWÓW, POZNAŃ,  
WARSZAWA, WILNO) POD  
REDAKCJĄ PROF. DRA B.  
FULIŃSKIEGO. — WYCHODZI  
OD PAŹDZIERNIKA 1923 R.  
W DZIESIĘCIU ZESZYTACH  
ROZCZNE. — PRENUMERATA  
ROZCZNA 8·40 ZŁOTYCH, DLA  
CZŁONKÓW POL. TOWARZY-  
STWA PRZYRODNIKÓW IM.  
M. KOPERNIKA 6·30 ZŁOTYCH

ADRES REDAKCJI: LWÓW, NABIELAKA 22, INSTYTUT ZOOLOGICZNY.  
ADRES ADMINISTR.: KSIĄŻNICA POLSKA, LWÓW, CZARNIECKIEGO 12.



Biblioteka Główna UMK Toruń

5570

BIOTORU



309000368643



3