



# Jahresbericht über das Königliche Katholische Gymnasium in C o n i t z in dem Schuljahre 1846—1847, mit welchem zu der öffentlichen Prüfung am 23. August und zu den Schlußfeierlichkeiten am 24. August c. ergebenß einladet der Director des Gymnasiums **Dr. F. Prüggemann.**

Inest: Album plantarum, quae circa Conicium sponte crescunt, planerogamarum.  
Praemittitur familiarum dispositio naturalium. Scriptit **P. F. Haub.**

---

◆◆◆

**C o n i t z.**

Gedruckt in der Buchdruckerei bei F. F. Harich.

**1847.**



1900

1900

WYDANIE WYDANIA WYDANIA

1900

WYDANIE WYDANIA WYDANIA

WYDANIE WYDANIA


WYDANIE WYDANIA WYDANIA

1900

WYDANIE WYDANIA WYDANIA

WYDANIE WYDANIA

WYDANIE WYDANIA



AB 4469

# ALBUM

Plantarum, quae circa Conicum sponte  
crescunt, phanerogamarum.

---

Praemittitur

familiarum dispositio naturalium.

---

Scripsit

P. F. Hauß.

---

CONICIL.

TYPIS F. F. HARICHI.  
MDCCCXLVII.

# LIBRI

Plautinius, duce optioe Consilium spouse

classum, puerologiamur.

Imperio

Imperium quicquid usurpatione

Imperio

Imperio W. A. A.

Imperial

Imperialis et Imperialis  
adversarii

— — —  
etiam aliud operis circumspectum diuque dum scilicet officinam operariasse pudi-  
cere. Sed etiam quod omnia inveniuntur in multis modis mea  
potest esse deinde ea quae in multis locis inveniuntur. Ita multitudinem au-  
tem quae in multis locis inveniuntur secundum communem. Ita multitudinem au-  
tem quae in multis locis inveniuntur secundum communem. Ita multitudinem au-  
tem quae in multis locis inveniuntur secundum communem. Ita multitudinem au-  
tem quae in multis locis inveniuntur secundum communem. Ita multitudinem au-  
tem quae in multis locis inveniuntur secundum communem.

— — —  
autem quae in multis locis inveniuntur secundum communem. Ita multitudinem au-  
tem quae in multis locis inveniuntur secundum communem. Ita multitudinem au-

**Q**uae fuerint causae, quibus commotus hoc opusculum composuerim, si qui  
quaerant, duas potissimum afferam, quarum altera angustiorem, altera latiorem spectat  
campum. Cum enim discipulis meis plantas indagantibus atque internoscentibus du-  
cem esse volui hunc libellum, tum campos Conicienses cum patriae nostrae botano-  
philis peragrare ac perlustrare constitui, quo et Florae nostrae vivida expressaque  
imago animo eorum obversaretur et ipsi concitarentur, ut suorum quisque agrorum  
plantas anquireret ac foras daret. Illos igitur, qui his rebus gaudeant, etiam atque  
etiam rogatos velim, ut summam eorum, quae ex investigatis examinatisque regionis  
suae herbis percepent, cum iis communicent, qui iisdem studiis oblectentur, ut tan-  
dem aliquando Flora Borussica, quam dicunt, perfecta atque omnibus numeris et  
partibus expleta comparari possit. — At sunt nonnulla, quae, priusquam ad rem  
ipsam transeamus, praefari liceat. —

Abhinc annos quinque librum scripsi, qui in perdiscendis rebus naturalibus dis-  
cipulis ad manum esset. Quo in libro quum, ut ex fronte perspicitur, perpaucæ  
modo plantarum nostrarum enumerari possent, diu mecum cogitavi, quomodo vitium  
illud emendarem, necessitate natum. Quam ob rem haud injucundum mihi erat ne-  
gotium indicendi publica hujus scholæ solemnia. Scribendi enim argumentum non

erat, quod dubius circumspicerem, quippe quod sponte offerrent observationes planitarum longinquae: quo argumento inveniri mihi nullum poterat neque ad studia mea utilius, neque aut ad tempus aut ad voluntatem accommodatus. In multorum annorum studiis hoc album nititur. Quotannis enim, quum ver esse cooperat atque muneris officiis vacabam, curis domesticis me expediens campos pervagabar atque in plantis et inveniendis et distinguendis aut cum discipulis, qui amabilis disciplinae suavitate ac dulcedine allicerentur, aut solus, multum consumsi temporis.

Hac autem ad edocendos juvenes ratione ingressus sum, ut eorum animum imprimis incitarem ad herbas indigenas cognoscendas, viamque monstrarem, qua ad illarum cognitionem facilissime pervenire possent. Quae ratio et via naturae convenient atque sola efficit, ut juventus animo libentissimo majoreque impetu in hanc disciplinam incumbat. Illi sine dubio longe aberrabunt a proposito, qui discipulos in cognoscendis aut omnibus aut per paucis modo plantis erudire velint. Satis cognitae demum accurateque per pensae patrii soli plantae aditum patesciant ad ceteras. Quo facto expressam disciplinam imaginem juvenes tenebunt, quam late pateat, intelligent, naturae immensae nullisque finibus circumscripiae pulchritudinem admirabuntur atque divino ejus instinctu concitati acerrimi cultores evadent non solum rerum naturalium, verum etiam omnium, quae honesta, bona, vera. — Huc mihi videntur omnia esse referenda his, qui in investigandis rebus a natura involutis omnis vitae consilium posuerunt. —

Conicci pridie Pentecosten a. MDCCCLXVII. —  
P. F. Hanb. —

## Familiarum dispositio naturalium.

---

### I. ACOTYLEDONES.

---

### II. MONOCOTYLEDONES.

**C**aulis sine cortice, ligno et medulla; folia parallelinervosa, vaginantia; corolla nulla; embryo monocotyledoneus.

A. Stamina hypogyna. Stamina florum fundo inserta.

a. Flores nudi, glumis inclusi.

Fam. 1. *Gramineae*. Culmus teres; gluma bivalvis; antherae basi apiceque fissae; vagina antice fissa; Caryopsis. — Genera: *Digitaria*, *Panicum*, *Echinochloa*, *Setaria*, *Phalaris*, *Hierochloa*, *Anthoxanthum*, *Alopecurus*, *Phleum*, *Agrostis*, *Anemagrostis*, *Calamagrostis*, *Amphiphila*, *Milium*, *Phragmites*, *Koeleria*, *Aira*, *Corynephorus*, *Holcus*, *Avena*, *Triodia*, *Melica*, *Briza*, *Poa*, *Glyceria*, *Molinia*, *Dactylis*, *Cynosurus*, *Festuca*, *Brachypodium*, *Bromus*, *Triticum*, *Agropyrum*, *Secale*, *Elymus*, *Hordeum*, *Lolium* et *Nardus*.

Fam. 2. *Cyperaceae*. Calamus angulatus; gluma univalvis; antherae apice integrae; flores hermaphroditi vel diclini; vagina non fissa; nux. — Genera: *Cyperus*, *Scirpus*, *Eriophorum* et *Carex*.

b. Flores spadici impositi, spathacei.

Fam. 3. *Aroideae*. Flores unisexuales et nudi, vel hermaphroditi et perigonio instructi. — Genera: *Acorus* et *Calla*.

c. *Flores spadici impositi, spatha nulla.*

Fam. 4. *Typhaceae.* Flores diclini in spadicem densissime congesti, superiores masculi, inferiores seminei. — Genera: *Typha* et *Sparganium*.

d. *Flores spathacei; spadix nullus.*

Fam. 5. *Lemnaceae.* Flores duo nudi, alter masculus, alter feminineus. — Genus: *Lemna*.

e. *Flores perigonio inclusi.*

Fam. 6. *Fluviales.* Flores hermaphroditii vel diclini; perigonum di- aut tetraphyllum, raro nullum. — Genus: *Potamogeton*.

Fam. 7. *Juncagineae.* Flores hermaphroditii; perigonum hexaphyllum, subcorollinum vel herbaceum; stamina 6; fructus siccus. — Genera: *Triglochin* et *Scheuchzeria*.

Fam. 8. *Alismaceae.* Flores hermaphroditii; perigonum hexaphyllum; phylla tria interiora petaloidea. — Genera: *Alisma* et *Sagittaria*.

Fam. 9. *Butomeac.* Flores hermaphroditii, umbellati; perigonum hexaphyllum; phylla tria interiora petaloidea. — Genus: *Butomus*.

B. *Stamina perigyna.* Stamina calyci inserta.

Fam. 10. *Junceac.* Perigonium sexpartitum; stamina sex, rarius tria, perigonii lacinias opposita. — Genera: *Juncus* et *Luzula*.

Fam. 11. *Asphodelac.* Perigonium corollinum, sexpartitum; stamina sex, quorum tria phyllis exterioribus opposita, diversiformia aut nulla. — Genera: *Asparagus*, *Allium*, *Anthericum* et *Ornithogalum*.

Fam. 12. *Smilacinae.* Perigonium corollinum, sexpartitum, vel quadri-octopartitum; stamina sex. — Genera: *Paris*, *Convallaria*, *Polygonatum* et *Majanthemum*.

Fam. 13. *Amaryllideae.* Perigonium corollinum, sexpartitum; stamina sex, antheris introrsis. — Genus: *Galanthus*.

Fam. 14. *Iridae.* Perigonium corollinum, sexpartitum; stamina tria; antherae ex-trorsum dehiscentes. — Genera: *Iris* et *Gladiolus*.

C. *Stamina epigyna.* Stamina germini imposita.

Fam. 15. *Orchideae.* Perigonium corollinum, irregulare; filamenta cum stylo arte concreta (gynandra); germen inferum. — Genera: *Orchis*, *Gymnadenia*, *Platanthera*, *Epipactis*, *Listera*, *Neottia*, *Goodyera*, *Liparis* et *Cypripedium*.

Fam. 16. *Hydrocharideae*. Flores dioici; calyx trisepalus; corolla tripetala; germen inferum. — Genera: *Stratiotes* et *Hydrocharis*.

### III. DICOTYLEDONES.

Caulis ramosus cum medulla, ligno et cortice; folia reticulato-venosa; embryo dicotyledoneus.

#### A. Apetalae. Corolla nulla.

##### a. Amentaceae.

###### α. Folia acerosa.

Fam. 17. *Coniferae*. Flores amentacei, nudi, monoici vel dioici; strobilus vel galbulus. — Genera: *Pinus* et *Juniperus*.

###### β. Folia non acerosa.

Fam. 18. *Cupuliferae*. Flores amentacei, plerumque monoici; perigonium ovario adnatum; nux involucro (cúpula) cineta. — Genera: *Fagus*, *Quercus*, *Corylus* et *Carpinus*.

Fam. 19. *Betulineae*. Flores amentacei, monoici; nux. — Genera: *Betula* et *Alnus*.

Fam. 20. *Salicinae*. Flores amentacei, dioici; capsula bivalvis. — Genera: *Saxix* et *Populus*.

##### b. Perigonatae.

Fam. 21. *Ulmaceae*. Flores hermaphroditi; perigonium quadri-octopartitum; stamina quatuor-octo; Samara. — Genus: *Ulmus*.

Fam. 22. *Urticaceae*. Flores diclini; perigonium quadri-quinquepartitum; acheneum. — Genera: *Urtica*, *Cannabis* et *Humulus*.

Fam. 23. *Euphorbiaceae*. Flores diclini; perigonium multipartitum, plerumque glandulosis appendiculis instructum; carpella tricocca, saepe di- vel polycocca. — Genera: *Euphorbia* et *Mercurialis*.

Fam. 24. *Aristolochiae*. Flores hermaphroditi; perigonium monophyllum superum; stamina sex-duodecim, epigyna; ovarium tri-sexloculare. — Genera: *Aristolochia* et *Asarum*.

Fam. 25. *Thymelaeae*. Perigonium corollinum inferum; stamina octo, perigonii tubo inserta, perigyna; fructus baccatus. — Genus: *Daphne*.

Fam. 26. *Polygonaceae*. Perigonium inferum, quadri-sexpartitum; stamina quatuor-novem, perigyna; fructus nucamentaceus vel carnosus; folia vaginantia. — Genera: *Polygonum* et *Rumex*.

Fam. 27. *Chenopodeae.* Perigonum quinquepartitum vel pentaphyllum; stamina perigonii fundo inserta, perigyna; fructus siccus vel bacca spuria e calyce carnoso orta. — Genera: *Chenopodium* et *Atriplex*.

B. Monopetalae. Corolla monopetala.

1. *Corolla hypogyna.* Corolla calycis fundo inserta.

a. Corolla irregularis.

Fam. 28. *Lentibulariae.* Calyx persistens; corolla ringens, calcarata, bilabiata; stamina duo; capsula unilocularis. — Genera: *Pinguicula* et *Utricularia*.

Fam. 29. *Verbenaceae.* Calyx persistens; corolla tubulosa, limbo inaequaliter partito; stamina plerumque quatuor, didynama. — Genus: *Verbena*.

Fam. 30. *Labiatae.* Calyx tubulosus, persistens; corolla bilabiata; stamina quatuor, didynama, rarius duo; caryopsides nucamentaceae. — Genera: *Mentha*, *Lycopus*, *Pulegium*, *Salvia*, *Origanum*, *Thymus*, *Clinopodium*, *Nepeta*, *Glechoma*, *Lamium*, *Galeobdolon*, *Galeopsis*, *Stachys*, *Betonica*, *Marrubium*, *Ballota*, *Leonurus*, *Scutellaria*, *Prunella* et *Ajuga*.

Fam. 31. *Scrophularinae.* Calyx partitus, persistens; corolla inaequaliter partita; stamina quatuor, plerumque didynama. — Genera: *Verbascum*, *Scrophularia*, *Gratiola*, *Antirrhinum*, *Linaria*, *Veronica*, *Limosella*, *Melampyrum*, *Pedicularis*, *Alectorolophus*, *Euphrasia* et *Odontites*.

Fam. 32. *Orobanchae.* Calyx persistens; corolla ringens, persistens; stamina didynama; folia ad squamas reducta, nunquam viridia; plantae parasiticae. — Genera: *Orobanche* et *Lathraea*.

b. Corolla regularis.

Fam. 33. *Plantagineae.* Flores tetrameri; stamina quatuor; capsula polysperma. — Genus: *Plantago*.

Fam. 34. *Plumbagineae.* Calyx persistens; corolla quinquepartita; stamina quinque, fundo floris adnata. — Genus: *Armeria*.

Fam. 35. *Primulaceae.* Calyx persistens, quinque-, rarius quadripartitus; corolla quinque-, rarius quadripartita; capsula polysperma. — Genera: *Trientalis*, *Lysimachia*, *Anagallis*, *Centunculus*, *Primula* et *Hottonia*.

Fam. 36. *Solanaceae.* Flores pentameri; corolla quinqueplicata, decidua; fructus bi- aut subquadrilocularis; capsula aut bacca. — Genera: *Solanum*, *Hyoscyamus* et *Datura*.

- Fam. 37. *Boragineae.* Flores pentameri; corollae faux forniciis clausa; carpella quatuor vel duo, bilocularia. — Genera: *Asperugo*, *Echinospermum*, *Cynoglossum*, *Borago*, *Anchusa*, *Lycopsis*, *Sympytum*, *Echium*, *Pulmonaria*, *Lithospermum* et *Myosotis*.
- Fam. 38. *Convolvulaceae.* Flores plerumque pentameri; corolla plicato-contorta; capsula 1—4locularis, 2—4valvis, dissepimentis marginalibus. — Genera: *Convolvulus* et *Cuscuta*.
- Fam. 39. *Asclepiadaceae.* Flores pentameri; filamenta saepe concreta; massae pollinis cereaceae, affixae stigmatis corpusculis; folliculi duo. — Genus: *Cynanchum*.
- Fam. 40. *Ericaceae.* Corolla quadri- vel quinquepartita, rarius septempartita; discus aut squamae nectariferae; stamina tot, quot laciniae vel petala, aut dupla; antherae bilocularis; fructus capsularis vel baccatus. — Genera: *Arctostaphylus*, *Andromeda*, *Calluna*, *Ledum*, *Pyrola*, *Chimaphila* et *Monotropa*.
- Fam. 41. *Gentianaceae.* Corolla quinquepartita, rarius quadri—decempartita; stamina tot, quot petalorum laciniae; antherae bilocularis; capsula uni- vel bilocularis, polysperma. — Genera: *Menyanthes*, *Gentiana* et *Erythraea*.
- Fam. 42. *Oleaceae.* Calyx dentatus vel divisus; corolla quadrifida, rarius tetrapetala; stamina duo, rarius quatuor; germen 2—3loculare; capsula, bacca vel drupa. — Genus: *Fraxinus*.
2. *Corolla perigyna.* Corolla monopetala calycis limbo supero inserita.
- Fam. 43. *Vaccinaceae.* Calyx quadridendatus; corolla quadri- vel quinquesida; stamina tot, quot petalorum laciniae; antherae bicornes; bacca. — Genera: *Vaccinium* et *Oxycoccus*.
- Fam. 44. *Campanulaceae.* Calyx quinquedivisus; corolla plerumque quinquefida; stamina petalorum numero aequalia; capsula calyce coronata. — Genera: *Jasione*, *Phyteuma* et *Campanula*.
- Fam. 45. *Cucurbitaceae.* Flores diclini; calyx pentasepalus, reticulato-venosus; stamina quinque, triadelphia, rarius monadelphia vel libera; pepo. — Genus: *Bryonia*.
3. *Corolla epigyna.* Corolla monopetala germini imposita.  
a. Flores clinanthio dense impositi.
- Fam. 46. *Synanthereae.* Flores in calathidium dense congesti, periclinio cincti;

stamina quinque; antherae in cylindrum concretae; flores aut omnes hermaphroditæ, aut hermaphroditæ semineis neutrivæ mixti, polygamæ, aut polygamo-subdioici; achenium.

Trib. 1. *Eupatoriaceæ*. Crura stylî flor. hermaphroditorum longa subteretia vel clavata, superne puberulo-papillosa; florū masc. stylî crura clavata. — Genera: *Eupatorium*, *Tussilago* et *Petasites*.

Trib. 2. *Asteroidæ*. Crura stylî flor. hermaphroditorum linearia, extus subplana et superne aequaliter minuteque puberula. — Genera: *Bellis*, *Erigeron*, *Solidago* et *Inula*.

Trib. 3. *Seneciomideæ*. Crura stylî flor. hermaphroditorum linearia apice penicillata et truncata. — Genera: *Bidens*, *Gnaphalium*, *Artemisia*, *Tanacetum*, *Achillea*, *Anthemis*, *Matricaria*, *Chrysanthemum*, *Pyrethrum*, *Cineraria* et *Senecio*.

Trib. 4. *Cynareæ*. Stylus flor. hermaphroditorum apice nodoso-incrassatus saepe ad nodum hirto-pubescentia. — Genera: *Cirsium*, *Carduus*, *Onopordum*, *Arctium*, *Carlina*, *Serratula* et *Centaurea*.

Trib. 5. *Cichoriaceæ*. Flores omnes ligulati et hermaphroditæ. Crura stylî filiformia, revoluta, breviter pubescentia. — Genera: *Lampsana*, *Arno-seris*, *Cichorium*, *Apargia*, *Picris*, *Tragopogon*, *Scorzonera*, *Hypochaeris*, *Taraxacum*, *Chondrilla*, *Lactuca*, *Sonchus*, *Crepis*, *Hieracium* et *Xanthium*.

Fam. 47. *Dipsaceæ*. Flores aggregati in clinanthium, periclinio polyphyllo cincti; antherae liberae. — Genera: *Dipsacus* et *Scabiosa*.

b. Flores non clinanthio impositi.

Fam. 48. *Valerianeæ*. Corolla quinquesida, rarius tri- et quadrifida; saepe irregularis et calcarata; achaena. — Genera: *Valeriana* et *Valerianella*.

Fam. 49. *Rubiaceæ*. Corolla quadri- vel quinquepartita, rarius tri-, sex- vel octopartita, plerumque regularis; achaenæ duae nucamentaceæ. — Genera: *Asperula* et *Galium*.

Fam. 50. *Caprifoliaceæ*. Corolla quinque-, rarius quadrifida, interdum irregularis; fructus baccatus, calycis margine coronatus. — Genera: *Adoxa*, *Sambucus*, *Viburnum*, *Lonicera* et *Linnaea*.

C. Polypetalae. Corolla polypetala.

1. *Stamina epigyna.* Stamina germini inserta.

Fam. 51. *Loranthaceae.* Petala quatuor—octo; stamina tot, quot petala, iisque opposita; stylus nullus; bacca monosperma; frutex parasiticus. — Genus: *Viscum*.

Fam. 52. *Cornaceae.* Petala quatuor; stamina quatuor, cum petalis alternantia; stylus unicus; germen inferum; fructus drupaceus. — Genus: *Cornus*.

Fam. 53. *Umbelliferae.* Flores umbellati; petala quinque; stamina quinque, cum petalis alternantia; styli duo; germen inferum; carpella duo concreta; folia basi vaginantia.

a. *Orthospermae.* — Genera: *Hydrocotyle*, *Sanicula*, *Eryngium*, *Cicuta*, *Aegopodium*, *Carum*, *Pimpinella*, *Sium*, *Bupleurum*, *Oenanthe*, *Aethusa*, *Seseli*, *Selinum*, *Angelica*, *Archangelica*, *Peucedanum*, *Pastinaca*, *Heracleum*.

b. *Campylospermae.* — Genera: *Torilis*, *Anthriscus*, *Chaerophyllum* et *Conium*.

Fam. 54. *Araliaceae.* Petala quinque ad decem; stamina numero petalorum aequalia cumque iis alternantia; bacca multilocularis. — Genus: *Hedera*.

2. *Stamina hypogyna.* Stamina infra germen inserta.

a. *Calyx disepalus.*

Fam. 55. *Papaveraceae.* Petala quatuor, regularia; stamina numerosa; capsula. — Genera: *Papaver* et *Chelidonium*.

Fam. 56. *Fumariaceae.* Corolla irregularis, quadripetala; stamina sex, in phalanges duas concreta. — Genera: *Fumaria* et *Corydalis*.

b. *Calyx tetrasepalus.*

Fam. 57. *Cruciferae.* Corolla tetrapetala, cruciata; stamina sex, tetradynta; siliqua vel silicula.

a. *Siliculosae.* — Genera: *Berteroa*, *Draba*, *Coronopus*, *Armoracia*, *Camelina*, *Thlaspi*, *Teesdalia*, *Lepidium*, *Capsella* et *Neslia*.

b. *Siliquosae.* — Genera: *Raphanistrum*, *Nasturtium*, *Barbarea*, *Turritis*, *Arabis*, *Cardamine*, *Sisymbrium*, *Sinapis* et *Cheirinia*.

c. Calyx plerumque quinquepartitus aut pentasepalus.

aa. Stamina plerumque quinque.

α. Calyx plerumque quinquepartitus.

Fam. 58. *Acerineae*. Petala tot, quot calycis laciniae; stamina plerumque octo, disco hypogyno inserta; Samarae duae. — Genus: *Acer*.

Fam. 59. *Hippocastanaceae*. Corolla irregularis, quinquepetala, rarius quadripetala; stamina septem aut octo, disco inserta; capsula echinata, 2—4 sperma. — Genus: *Aesculus*.

Fam. 60. *Geraniaceae*. Calyx interdum calcaratus; petala quinque, unguiculata; stamina basi plerumque monadelpha, numero petalorum dupla, rarius tripla; carpella quinque rostrata. — Genera: *Geranium* et *Erodium*.

Fam. 61. *Oxalidaceae*. Petala quinque unguiculata; stamina decem, plus minusve basi monadelpha; capsula quinquangularis, quinquelocularis. — Genus: *Oxalis*.

β. Calyx plerumque pentasepalus.

Fam. 62. *Berberideae*. Petala tria, quatuor vel sex, sepalis opposita; stamina tot, quot petala, iisque opposita; bacca. — Genus: *Berberis*.

Fam. 63. *Empetreae*. Petala tria, sepalis alterna; stamina tria, sepalis opposita; bacca stigmate coronata. — Genus: *Empetrum*.

Fam. 64. *Balsamineae*. Corolla tetrapetala, rarius pentapetala; stamina quinque; capsula quinquevalvis, elastice desiliens. — Genus: *Impatiens*.

Fam. 65. *Violaceae*. Corolla irregularis, pentapetala; stamina quinque, disco hypogyno inserta; capsula unilocularis, trivalvis. — Genus: *Viola*.

Fam. 66. *Droseraceae*. Calyx pentasepalus; corolla pentapetala; stamina quinque, rarius plura, libera; styli tres vel quinque; capsula unilocularis, tri- vel quinquevalvis. — Genera: *Drosera* et *Parnassia*.

Fam. 67. *Polygalaceae*. Sepala duo interiora majora, petaloidea; corolla pentapetala, irregularis; stamina octo, rarius pauciora, diadelpha; capsula bilocularis. — Genus: *Polygala*.

Fam. 68. *Caryophylleae*. Petala quinque, unguiculata; stamina petalorum numero dupla, interdum quinque aut pauciora; capsula bi- vel quinquevalvis, rarius bacca.

*Sileneae*. Calyx tubulosus; petala longe unguiculata. — Genera: *Gypsophila*, *Dianthus*, *Saponaria*, *Cucubalus*, *Silene*, *Lychnis* et *Agrostemma*.

*Alsineae.* Calyx profunde quinquepartitus (pentasepalus); petala minute unguiculata. — Genera: *Sagina*, *Spergula*, *Holosteum*, *Arenaria*, *Stellaria* et *Cerastium*.

Fam. 69. *Linoideae.* Petala tot, quot sepala; stamina fertilia quinque, cum totidem sterilibus alternantia; capsula globosa. — Genera: *Linum* et *Radiola*.

bb. *Stamina numerosa.*

Fam. 70. *Ranunculaceae.* Petala quinque, rarius tria ad decem; carpella aut nucamentacea, monosperma, aut follicularia, polysperma.

Trib. 1. *Anemoneae.* Fovea nectarifera destituta; carpella monosperma. — Genera: *Thalictrum*, *Hepatica*, *Anemone* et *Pulsatilla*.

Trib. 2. *Ranunculaceae.* Petala basi fovea nectarifera instructa; carpella monosperma. — Genera: *Myosurus*, *Ranunculus* et *Ficaria*.

Trib. 3. *Helleboreae.* Carpella follicularia, introrsum dehiscentia, polysperma. — Genera: *Caltha*, *Trollius*, *Aquilegia*, *Delphinium* et *Aconitum*.

Trib. 4. *Ranunculaceae spuriae.* Carpellum unicum, baccatum. — Genus: *Actaea*.

Fam. 71. *Nymphaeaceae.* Petala toro extra pluriseriatim inserta, sensim in stamna abeuntia; stamna numerosa, toro supra petala multiserialiter affixa; capsula carnosa. — Genera: *Nymphaea* et *Nuphar*.

Fam. 72. *Hypericaceae.* Sepala laciniiis inaequalibus; petala quatuor vel quinque; stamna in tres vel quinque fasciculos coalita; styli 3—5; capsula polysperma. — Genus: *Hypericum*.

Fam. 73. *Malvaceae.* Corolla pentapetala; stamna in tubum concreta; carpella 1—2 sperma, in columna peripherice collocata. — Genus: *Malva*.

Fam. 74. *Tiliaceae.* Sepala quinque; petala totidem, cumque iis alternantia; stylus unus; fructus ex carpellis formatus, capsularis. — Genus: *Tilia*.

Fam. 75. *Cistineae.* Flores pentameri; fructus capsularis, multilocularis. — Genus: *Helianthemum*.

3. *Stamina perigyna.* Stamina calyci inserta.

a. Calyx cum germine non coalitus.

Fam. 76. *Paronychiae.* Calyx quinquepartitus; petala quinque vel nulla; stamna quinque, rarius plura aut pauciora; fructus siccus. — Genera: *Herniaria* et *Scleranthus*.

Fam. 77. *Crassulaceae*. Sepala quinque, interdum plura vel pauciora, basi coacta; petala totidem; stamina tot, quot petala, aut dupla; carpella leguminosa. — Genera: *Sedum* et *Sempervivum*.

Fam. 78. *Haloragaceae*. Calycis limbis superus, aut nullus; petala quatuor, aut nulla; germen 1—4 loculare; fructus exsuccus, non dehiscens. — Genera: *Callitricha*, *Hippuris* et *Myriophyllum*.

Fam. 79. *Ceratophylleae*. Flores monoici; calyx multifidus; corolla nulla; nux stylo apiculata. — Genus: *Ceratophyllum*.

Fam. 80. *Leguminosae*. Calyx quinquedentatus vel bilabiatus; corolla pentapetala, plerumque papilionacea; stamina decem, monadelpha, vel diadelpha et novem concreta, decimum liberum; legumen, rarius lomentum.

Trib. 1. *Loteae*. — Genera: *Spartium*, *Genista*, *Ononis*, *Anthyllis*, *Mediticago*, *Melilotus*, *Trifolium*, *Lotus* et *Astragalus*.

Trib. 2. *Hedysareae*. — Genus: *Coronilla*.

Trib. 3. *Vicieae*. — Genera: *Vicia*, *Pisum*, *Lathyrus* et *Orobus*.

Fam. 81. *Lythrarieae*. Calyx monosepalus, dentatus; petala plerumque sex; stamina infra petala calycis tubo affixa; capsula membranacea. — Genus: *Lythrum*.

Fam. 82. *Sanguisorbeae*. Calycis tubus apice contractus, 3—5 fidus; petala nulla; nux in calyce saepe indurato inclusa. — Genera: *Alchemilla* et *Sanguisorba*.

Fam. 83. *Rosaceae*. Calyx quinque-, rarius quadrifidus, liber; petala quinque, rarius quatuor; stamina plura; carpella plurima. —

Trib. 1. *Spiraeaceae*. Carpella introrsum dehiscentia. — Genus: *Spiraea*.

Trib. 2. *Dryadeae*. Carpella nucamentacea vel drupacea. — Genera: *Geum*, *Rubus*, *Fragaria*, *Comarum*, *Potentilla*, *T tormentilla* et *Agrimonnia*.

Trib. 3. *Roseae*. — Genus: *Rosa*.

Fam. 84. *Amygdaleae*. Calyx quinquedentatus, liber; petala quinque; stamina circiter viginti; drupa. — Genus: *Prunus*.

b. Calyx cum germine coalitus.

Fam. 85. *Pomaceae*. Calycis limbus quinquedentatus, vel quinquesfidus; petala

quinque, unguiculata; stamina numerosa; pomum. — Genera: *Mespilus*, *Pirus* et *Sorbus*.

Fam. 86. *Philadelphiae*. Calycis tubus turbinatus, limbus 4—10 partitus; petala laciniis calycis numero aequalia et iis alterna; stamina plura; capsula. — Genus: *Philadelphus*.

Fam. 87. *Grossularieae*. Calycis limbus superus, campanulatus vel tubulosus, quinquefidus; petala quinque totidemque stamina; fructus baccatus. — Genus: *Ribes*.

Fam. 88. *Onagrariae*. Calycis limbus superus, quadripartitus, rarius bipartitus; petala tot, quot calycis lacinia; stamina totidem, vel petalorum numero dupla; stylus unus; fructus baccatus vel capsularis. — Genera: *Epilobium*, *Oenothera* et *Circaeae*.

c. Calyx plus minusve germini adhaerens.

Fam. 89. *Saxifrageae*. Calyx quadri- aut quinquepartitus, aut -fidus, germini adhaerens vel liber; petala quatuor vel quinque, laciniis alterna; stamina petalorum numero aequalia vel dupla; capsula. — Genera: *Saxifraga* et *Chrysosplenium*.

Fam. 90. *Rhamneae*. Calyx 4—5 fidus; petala 4—5, cum calycis laciniis alternantia; stamina tot, quot petala, iisque opposita; fructus carnosus vel exsuccus. — Genus: *Rhamnus*.

Fam. 91. *Celastrineae*. Calyx 4—5 fidus, vel 4—5 partitus; petala 4—5; stamina totidem, disci margini vel ipsi disco affixa; capsula 2—3 locularis, vel drupa exsucca, mono—dipyrena. — Genus: *Evonymus*.

---

## Systematis sexualis dispositio Linneani.

### PHANEROGAMAE.

Organa generationis unicuique conspicua.

#### I. MONOCLINICAE.

Flores omnes hermaphroditi, nempe stamina cum pistillis in eodem flore.

##### A. Stamina omnia libera.

1. Stamina nullam determinatam proportionem inter se servant.

Classis 1. *Monandria*. Stamen unus.

- 2. *Diandria*. Stamina duo.
- 3. *Triandria*. Stamina tria.
- 4. *Tetrandria*. Stamina quatuor.
- 5. *Pentandria*. Stamina quinque.
- 6. *Hexandria*. Stamina sex.
- 7. *Heptandria*. Stamina septem.
- 8. *Octandria*. Stamina octo.
- 9. *Enneandria*. Stamina novem.
- 10. *Decandria*. Stamina decem.
- 11. *Dodecandra*. Stamina duodecim, vel sedecim, vel duodeviginti.
- 12. *Icosandra*. Stamina viginti et plura, calyci inserta.
- 13. *Polyandria*. Stamina viginti et plura, germinis affixa.

2. Stamina determinatam proportionem inter se servant.

Classis 14. *Didynamia*. Stamina quatuor, duo aequaliter longiora et duo aequaliter breviora et remotiora.

- 15. *Tetradynamia*. Stamina sex, duo reliquis aequaliter breviora et remotiora.

##### B. Stamina inter se aliqua sua cohaerent parte.

###### 1. Filamenta secum coalita.

Classis 16. *Monadelphia*. Filamenta omnia inter se concreta.

- Classis 17. *Diadelphia.* Filamenta in phalanges duas aequales concreta, vel novem  
concreta et decimum liberum.  
- 18. *Polyadelphia.* Filamenta in phalanges tres pluresve concreta.  
    2. Antherae concretae.  
- 19. *Syngenesia.* Antherae in cylindrum concretae in floribus involuero com-  
muni cinctis, floremque compositum formantibus.  
    C. Stamina cum pistillo coalita.  
- 20. *Gynandria.* Stamina pistillo adnata.

## II. DICLINICAE.

Flores sexu distincti, stamina enim cum pistillis non in eodem flore.

- 21. *Monoecia.* Flores unisexuales, masculi et feminei in eadem planta.  
- 22. *Dioecia.* Flores unisexuales, masculi in una et feminei in altera planta  
ejusdem speciei.  
- 23. *Polygamia.* Flores unisexuales hermaphroditis mixti.

## CRYPTOGAMAE.

Organa fructificationis oculis nudis vix conspicua.

- 24. *Cryptogamia.* Stamina nulla.

Ordines Classium a prima ad tertiam decimam e pistillorum numero, hisque  
autem deficientibus, e stylorum vel stigmatum numero construuntur. Ordines Classis  
quartae decimae et quintae decimae secundum fructus naturam; Ordines Classium a  
sexta decima ad duodecimam secundum staminum numerum componuntur. Ordines  
Classis undevicesimae e sexu florum in idem calathidium congestorum dispon-  
nuntur. Ordines Classium a vicesima ad alteram et vicesimam secundum numerum  
et conglutinationem staminum, et Ordines Classis tertiae et vicesimae secundum flores  
heterogamos aut in eandem aut in diversas plantas congregatos constituantur.

### Cl. I. *Monandria.*

Ord. I. Monogynia.

- I. *Hippuris* L. (Haloragae Rob. Brown.) Perigonii limbus integer, minimus.  
I. *H. vulgaris* L. Gemeiner Zannenwedel. Folia verticillata. 24. 7—8. In a-  
quis stagnantibus prope villam Hülfse.

Ord. II. Digynia.

2. *Callitricha* L. (Halorageae R. Br.) Perigomii phylla duo, inflata.  
2. *C. verna* L. Frühlings-Wasserstern. Folia trinervia, linearia - obovata. ♂. 5  
— 9. In stagno Negenfuhl frequens.

Cl. II. *Dianandra.*

Ord. I. Monogynia.

A. Flores completi, superi.

3. *Circaeа* L. (Onagrariae Juss.) Calyx bipartitus, deciduus. Corolla dipetala.  
3. *C. lutetiana* L. Gemeines Hexenfraut. Caulis pubescens. Folia ovata, denti-  
culata, opaca. Flores racemosi. 2f. 7 — 8. In locis humidis umbrosis ad  
Buschmühle.  
4. *C. alpina* L. Alpen-H. Caulis diffusus. Folia ovata, acuta, subpellucida. 2f.  
7 — 8. Ad truncos alnorum prope praedia Dunkershagen, Rotzollen.  
B. Flores completi, inferi, irregulares.  
4. *Veronica* L. (Scrophularinae Rob. Br.) Calyx 4 — 5 partitus. Corolla 4 loba,  
rotata, rarius tubulosa.

Sect. 1. Racemi terminales.

5. *V. longifolia* L. Langblättriger Ehrenpreis. Folia opposita ternaque, ovato-  
lanceolata, serrata. 2f. 7 — 8. In pratis humidis apud Buschmühle.  
6. *V. spicata* L. Nehrentragender E. Caulis adscendens. Folia opposita, inferiora  
obovata aut oblonga, crenata; superiora lanceolata, serrulata. 2f. 7 — 8.  
In locis apricis ad Schützenhaus, Freiheit.  
7. *V. serpyllifolia* L. Quendelblättriger E. Caulis adscendens. Folia opposita,  
ovalia. 2f. 5 — 6. Ad margine pratorum, apud pagum Müskendorf.

Sect. 2. Racemi axillares.

8. *V. officinalis* L. Echter E. Heil alter Welt. Caulis decumbens, hirtus. Folia  
breviter petiolata, ovato-oblonga, crenata, hirta. 2f. 6 — 7. In silvis siccis,  
ericetis: Schönfelder, Zandersdorfer Wäldchen.  
9. *V. Beccabunga* L. Quellen-E. Caulis adscendens, subtetragonus. Folia ova-  
lia aut oblonga, obtusa, glabra. 2f. 6 — 7. Frequens in rivulo suburbano  
prope viam, qua itur in villam Schützenhaus.  
10. *V. Anagallis* L. Wasser-E. Caulis demum erectus, tetragonus. Folia sessi-  
lia, lanceolata, acuta, serrata, glabra. 2f. 5 — 6. Ad lacum Lockmann, ad  
ripas Brahe fluvii prope Rittel.

11. *V. scutellata* L. Echilb-E. Caulis debilis, demum erectus. Folia sessilia, linearia. 2. 7—8. In pratis humidis prope Buschmühle, ad praedium Zandersdorf.
12. *V. prostrata* L. Niedersiegender E. Caulis prostratus, canescens. Folia sessilia, oblonga et lanceolata, crenato-serrata. 2. 5—6. In collibus apricis siccis ad silvam Freiheit.
13. *V. latifolia* L. Breitblättriger E. Caulis villosus. Folia sessilia, ovalia et oblonga, grosse crenata. 2. 5—6. In fruticetis, hortis frequens.
14. *V. Chamaedrys* L. Gamander-E. Caulis bifarium pilosus. Folia omnia ovalia, grosse crenata, rugosa. 2. 5—6. In omnibus pratis, silvis et fruticetis frequens.
15. *V. montana* L. Berg-E. Caulis debilis, repente adscendens. Folia ovata, acute crenata. 2. 6. In silva prope Regnitz Mühle, ad pagum Woltersdorf.  
Sect. 3. Pedunculi axillares, uniflori.
16. *V. praecox* Allioni. Früher E. Caulis diffusus. Folia inferiora ovata, inciso-serrata, superiora lanceolata. ①. 5—6. In agris et cultis urbis nostrae non raro hanc plantam invenies.
17. *V. arvensis* L. Feld-E. Caulis adscendens. Folia inferiora petiolata, ovata, crenato-serrata, superiora sessilia, lanceolata, subintegerrima. ①. 5—8. Frequens in agris nostris.
18. *V. agrestis* L. Acker-E. Caulis procumbens. Folia petiolata, ovata, crenato-serrata. ①. 5—9. In agris frequens.
19. *V. hederaefolia* L. Epheublättriger E. Caulis procumbens. Folia subrotunda, 3—5loba. ①. 6—7. In hortis et silvis prope Wilhelminenthal et alibi.
20. *V. triphyllus* L. Dreiblättriger E. Caulis adscendens. Folia infima subrotunda, crenata, superiora digitato-partita. ①. 5. In agris prope pagum Müskendorf et Walkmühle.
21. *V. verna* L. Frühlings-E. Folia infima ovata, crenata, superiora pinnatifida et tripartita, summa linearia. ①. 5. Ad marginem silvae prope praedinum Jesiorke.
5. *Gratiola* L. (Scrophulariae Rob. Br.) Calyx 5partitus; corolla 4loba, sublabiata.
22. *G. officinalis* L. Gemeines Gnadengräsch. Folia lanceolata, serrulata, subtrinervia. 2. 7—8. Ad ripas Brahe fluvii prope praedia Gemel et Platzig.
6. *Pinguicula* L. (Lentibulariae Rich.) Calyx bilabiatus; labium  $\frac{3}{2}$  partitum. Corolla ringens, calcarata.

23. *P. vulgaris* L. Gemeines Fettkraut. Folia oblonga, margine involuta. 24. 5.  
In pratis prope Schlochau.
7. *Utriculária* L. (Lentibulariae Rich.) Calyx bipartitus. Corolla personata, calcarata.
24. *U. vulgaris* L. Gemeiner Wasserschlauch. Folia multifida; laciniae ultimae filiformes, spinuloso - ciliatae. 24. 7—8. In palude prope Buschmühle.
25. *U. intermedia* Hayne. Mittlerer W. Folia multifida; laciniae ultimae filiformes, spinuloso - serratulae. Labium superius integrum, palato duplo longius. 24. 7—8. In paludibus prope praedium Heinrichsthal.
8. *Lycopus* L. (Labiateae Juss.) Calyx subtubulosus, 5 dentatus. Corolla tubulosa. subaequalis, 4loba.
26. *L. europaeus* L. Gemeiner Wolfssüß. Caulis tetragonus. Folia oblonga et lanceolata, sinuato - serrata. Flores verticillati, albi. 24. 7. In locis humidis, ad fossas urbis nostrae.
9. *Salvia* L. (Labiateae Juss.) Calyx bilabiatus; labium superius integrum aut tridentatum, inferius bifidum. Corolla bilabiata.
27. *S. pratensis* L. Wiesen-Salbei. Folia oblonga, cordata, inciso - crenata, rugosa, subtus villosa. 24. 5. In pratis prope Schlochau et Friedland.

Ord. II. Digynia.

10. *Anthoxanthum* L. (Gramineae Juss.) Panicula spiciformis. Gluma bivalvis.
28. *A. odoratum* L. Gemeines Ruchgras. Culmus non stolonifer. Folia margine vix scabra. 24. 5. In pratis et nemoribus. In via, qua itur in villam Schützenhaus praeter sepulcretum Judaeorum, ambulantes hujus graminis odorem totis naribus trahunt.

Cl. III. *Triandria.*

Ord. I. Monogynia.

A. Flores completi, superi.

11. *Valeriana* L. (Valerianeae DC.) Calyx involutus, germen coronans, post anthesis in pappum plumosum abiens. Corolla 5loba, basi gibba.
29. *V. officinalis* L. Gemeiner Valdrian. Folia pinnata. Panicula corymbosa. Radix praemorsa. 24. 6. Ad ripas rivuli prope Buschmühle.
30. *V. dioica* L. Kleiner V. Folia radicalia integra, ovalia, caulina lyrato - pinnata. 24. 5—6. In paludibus apud Buschmühle.

12. *Valerianella* Moench. (Valerianeae DC.) Calyx dentatus. Corolla infundibuliformis, limbo 5 lobo.
31. *V. olitoria* Moench. Gemeiner Feldsalat. Folia lanceolata, ciliata. ♂. 5—6. Non raro in hortis graminosis.  
B. Flores incompleti; perigonium corollinum.
13. *Gladolus* Tourn. (Irideae Juss.) Perigonium basi tubulosum, limbo irregulari subringente.
32. *G. communis* L. Gemeine Siegwurz. Folia ensiformia. Spica secunda, multiflora. 2. 6. In pratis prope Jacobsdorf et in silva prope Gemel.
14. *Iris* L. (Irideae Juss.) Perigonium basi tubulosum; limbus 6 partitus, Iaciniis inaequalibus, 3 reflexis, 3 erectis. Stigmata petaloidea, stamina tegentia.
33. *I. Pseud-Acorus* L. Sumpf-Iris. 2. 6. In palude Mönch-See.  
C. Flores incompleti, glumacei.
15. *Cypérus* L. (Cyperaceae DC.) Spicula disticha. Gluma bivalvis, valvae extiores distichae, interiores rhachi adnatae.
34. *C. fuscus* L. Braunes Cypergras. ♂. 8. In pratis apud praedium Zandersdorf.
16. *Scirpus* L. (Cyperaceae DC.) Spiculae undique imbricatae. Glumarum valvae sensim decrescentes. Setae hypogynae.  
Sect. 1. Heleocharis Rob. Br. Spicula terminalis solitaria; stylus basi bulbosus; setae hypogynae.  
35. *Sc. palustris* L. Sumpf-Bins. 2. 6. In palude apud Hülse.  
36. *Sc. acicularis* L. Nadel-B. 2. 6. Ad marginem paludis prope Regnitz-Mühle.  
Sect. 2. Scirpus Rob. Br. Spiculae terminales aggregatae; setae hypogynae.  
37. *Sc. lacustris* L. Teich-B. 2. 6. In lacu Lockmann.  
38. *Sc. sylvaticus* L. Wald-B. 2. 6. In silva, quae Freiheit vocatur.  
Sect. 3. Isólepis Rob. Br. Spiculae laterales, agggregatae.  
39. *Sc. setaceus* L. Borsten-B. 2. 6—7. In locis humidis prope Dunkershagen.
17. *Erióphorum* L. (Cyperaceae DC.) Spiculae undique imbricatae. Glumarum valvae sensim decrescentes. Setae hypogynae, valvis multo longiores, cum ipsis persistentes.  
Sect. 1. Spicula una, terminans.
40. *E. vaginatum* L. Scheiden-Wollgras. 2. 4—5. In silva prope Hohenkamp.

Sect. 2. Spiculae terminales.

41. *E. triquetrum* Hoppe. Dreieckiges W. 4. 5. In palude nemoris haud procul a praedio Zandersdorf.
42. *E. angustifolium* Roth. Schmalblättriges W. 4. 5. In palude prope Buschmühle.
43. *E. latifolium* Hoppe. Breitblättriges W. 4. 4—5. Prope Rotzollen.
18. *Nardus* L. (Gramineae Juss.) Spiculae solitariae, uniflorae. Gluma nulla. Glumella bivalvis.
44. *N. stricta* L. Steifes Borstengras. 4. 6. In pascuis uliginosis prope Buschmühle.

Ord. II. Digynia.

Flores glumacei. Gramina.

I. *Spicatae. Spica terminalis.*

A. Spicula solitaria in quoque rhacheos dente.

19. *Lolium* L. (Gramineae Juss.) Spiculae multiflorae. Gluma bivalvis in spicula terminali, valvae laterales saepe nullae.
45. *L. temulentum* L. Taumel-Gras. ♂. 6. Inter segetes ad Zandersdorf.
46. *L. perenne* L. Ausdauernder L. Englischs Raygras. 4. 6—8. In pratis prope Sandkrug.
47. *L. arvense* Willd. Acker-L. ♂. 6—7. In agris inter Linum prope Buschmühle.
20. *Triticum* L. (Gramineae Juss.)
48. *T. vulgare* Weizen. Colitur. Variat
  - α. *Spica aristata* T. aestivum. Sommerweizen.
  - β. *Spica submutica* T. hybernatum. Winterweizen.
21. *Agropyrum* Gaertn. (Gramineae Juss.) Spiculae multiflorae, flosculis sursum crescentibus, omnibus fertilibus.
49. *A. repens* Beauv. *Triticum repens* L. Quecke. 4. 5—9. Inter segetes frequens.
50. *A. caninum* Beauv. Hundeweizen. 4. 6—7. In nemoribus umbrosis ad Buschmühle.
22. *Secale* L. (Gramineae Juss.) Colitur.
51. *S. cereale* L. Roggen.
23. *Brachypodium* Beauv. (Gramineae Juss.) Spicula rhachi exciso-articulata, multiflora.

52. *B. pinnatum* Beauv. *Bromus pinnatus* L. Gefiederte Zwecke. 24. 6. In collibus apricis ad praedium Schönfeld.  
B. Spiculae duae pluresve in quoque rhacheos dente.
24. *Élymus* L. (Gramineae Juss.) Spiculae binae — quaternae, multiflorae aut biflorae; flos summus saepe tabescens.
53. *E. arenarius* L. Sandhafer. 24. 6. In colle haud procul a Wilhelminenthal.
25. *Hordeum* L. (Gramineae Juss.) Coluntur:
54. *H. vulgare* L. Gemeine Gerste;
55. *H. hexastichum* L. Sechseilige Gerste;
56. *H. distichum* L. Zweizeilige Gerste.
- II. *Spicigerae. Spicae laterales vel terminales plurimae.*
26. *Panicum* Beauv. (Gramineae Juss.)
57. *P. miliaceum* L. Hirse. Colitur.
27. *Echinochloa* Beauv. (Gramineae Juss.) Spiculae paniculatae, secundae, biflorae. Valva exterior mucronata, interior flosculo hermaphrodito aequalis, mucronata vel aristata.
58. *E. crus galli* Beauv. *Panicum crus galli* L. Gemeines Stachelgras. ④. 7—8. In agro prope Walkmühle.
28. *Digitaria* Scop. (Gramineae Juss.) Spicae subfasciculatae. Spiculae binae, altera longius pedicellata. Flosculi hermaphroditi valvulae aequales, subcoriaceae.
59. *D. glabra* Roem. Sch. Glattes Fingerkraut. ④. 7—8. In locis arenosis prope Niesewanz.
60. *D. sanguinalis* Scop. Blut-F. Valvula flosculi neutrius purpurascens. ④. 7—8. Ad agrorum margines prope Müskendorf.
29. *Setaria* Beauv. (Gramineae Juss.) Panicula spiciformis. Involucrum e setis aristatis compositum, includens spiculas duas. Flosculus masculus aut neuter uni—bivalvis; flosculorum hermaphroditorum valvulae aequales, coriaceae.
61. *S. glauca* Beauv. *Panicum glaucum* L. Rostfarbenes Borstengras. ④. 8. In agris haud procul a Jesiorken.
62. *S. viridis* Beauv. *Panicum viride* L. Grünes B. ④. 8. In iisdem locis.
- III. *Paniculatae uniflorae. Panicula; spiculae uniflorae.*  
A. Panicula spiciformis.
30. *Phleum* L. (Gramineae Juss.) Panicula cylindrica. Valvae carinatae, subaequales, valvulas duas, muticas superantes.

63. *P. pratense* L. Wiesen-Fleischgras. Timotheus-Gras. 24. 6—7. In pratis  
haud procul a praedio Zandersdorf.
64. *P. nodosum* L. Knotiges L. 24. 6—7. In agris siccis prope Richnau.
65. *P. Boehmeri* Schrad. Böhmer's L. 24. 6—7. In pratis arenosis ad Wol-  
tersdorf.
31. *Alopecurus* L. (Gramineae Juss.) Valvae subaequales, carinato - compressae, basi  
saepe concretae.
66. *A. pratensis* L. Wiesen-Zuchschwanz. 24. 6—7. In pratis et pascuis frequens.
67. *A. geniculatus* L. Gefreiter F. 24. 6—7. In pratis humidis ad Dunkershagen.
68. *A. fulvus* Smith. Röthlicher F. 24. 6—8. In eodem loco.  
B. Panicula diffusa.
32. *Agrrostis* Trin. (Gramineae Juss.) Panicula laxa. Valvae duae subaequales,  
acutae. Valvulae valvis minores.
69. *A. vulgaris* Smith. Gemeines Zartgras. 24. 6—7. In pratis, nemoribus ad  
Hohenkamp.
70. *A. alba* Schrad. Weißes Z. 24. 6—7. In pratis humidis prope Jacobsdorf.
71. *A. canina* L. Trichodium caninum Schrad. Hundes-Z. 24. 6—7. In pratis  
et pascuis ad villam Hülse.
33. *Anemagröstis* Trin. (Gramineae Juss.) Valva exterior minor, interior glumella  
paulo longior. Pedicellus, rudimentum flosculi alterius.
72. *A. spica venti* Trin. Windhalm. ♂. 7—8. Inter segetes prope Zandersdorf.
34. *Milium* L. (Gramineae Juss.) Valvae subaequales, glumellam subaequantes.  
Valvulae aequales, laevissimae, cartilagineae.
73. *M. effusum* L. Ausgebreitetes Hirsengras. 24. 6. In silvis umbrosis ad  
Hohenkamp.
35. *Calamagröstis* Roth. (Gramineae Juss.) Valvae subaequales, glumellam su-  
perantes, convexae. Valvulae basi pilis stipatae.
74. *C. epigeos* Roth. Arundo epigeos L. Land-Rohrgras. 24. 7—8. In campis  
arenosis ad Wilhelmenthal.
75. *C. lanceolata* Roth. Arundo Calamagrostis L. Lanzettförmiges R. 24. 7—8.  
In pratis humidis et silvis prope Hülse.
76. *C. silvatica* Beauv. Wald-R. 24. 7—8. In silvis prope Pollnitz.
77. *C. stricta* Beauv. Grädes R. 24. 7—8. In pratis humidis haud procul ab  
urbe Schlochau.
36. *Ammophila* Host. (Gramineae Juss.) Valvae inaequales, carinatae, glumellam  
superantes. Pili ad basin glumellae. Valvula exterior sub apice aristata.

78. *A. arenaria* Host. Gemeines Sandgras. 2f. 7—8. Post villam Schützenhaus.

**IV. Paniculatae subtriflorae.** *Panicula; spiculae uniflorae cum rudimento secundi tertique floris inferioris.*

37. *Phalaris* L. (Gramineae Juss.) Valvae a latere carinato-compressae, valvulis longiores.

79. *Ph. arundinacea* L. Rohrartiges Glanzgras. 2f. 6. Ad ripas fluviorum Brahe et Schwarzwasser prope Rittel et post Czersk.

A d. n. In hortis varietas foliis albido-vittatis nomine Bandgras colitur.

38. *Holcus* L. (Gramineae Juss.) Spiculae biflorae, deciduae. Flos inferior hermaphroditus, muticus; superior masculus, aristatus.

80. *H. lanatus* L. Wolliges Honiggras. 2f. 6—8. In pratis et pascuis hujus regionis frequens.

81. *H. mollis* L. Weiches H. 2f. 6—7. In silvis prope Buschmühle, Hülse.

39. *Hierochloa* Gmel. (Gramineae Juss.) Spiculae triflorae. Flores duo inferiores masculi, triandri; superior hermaphroditus, diander.

82. *H. borealis* Roem. Sch. Nördliches Darrgras. 2f. 6. In pratis humidis haud procul ab urbe Schlochau.

**V. Paniculatae multiflorae.** *Panicula; spiculae bi—multiflorae.*

40. *Koeleria* Pers. (Gramineae Juss.) Panicula arrecta, spiciformis. Spiculae compressae. Valvae carinatae, flores includentes. Valvula exterior mutica aut apice mucronata, aut apice aristata.

83. *K. cristata* Pers. Kammförmiges Schmielengras. 2f. 6—7. In campis arenosis haud procul a Pollnitz.

41. *Aira* L. (Gramineae Juss.) Spiculae biflorae. Valvula exterior in basi vel in dorso aristata. Pedicellus longe comosus.

84. *A. caespitosa* L. Deschampsia caespitosa Trin. Rasenschmiele. 2f. 6. In pratis et nemoribus ad Zandersdorf et Schönfeld.

42. *Corynophorus* Beauv. (Gramineae Juss.) Valvae valvulis longiores. Valvula exterior arista clavata, geniculata.

85. *C. canescens* Beauv. Graues Reulengras. 2f. 7—8. In campis arenosis ad Richnau.

43. *Avena* L. (Gramineae Juss.) Gluma nimis magna. Valvula exterior arista dorsali, geniculata, basi torta.

- Sect. 1. Avenae genuinae. Valvae 5—9 nerviae. Spiculae defloratae pendulae.  
Germen apice comosum.
86. *A. sativa* L. Hafer. ♂. 8. Colitur.
87. *A. orientalis* Schreb. Fähnen-H. Panicula secunda, contracta. ♂. 8. Cum antecedenti mixta.
88. *A. strigosa* Schreb. Sand-H. Panicula subsecunda. ♂. 8. Inter Avenam sativam.
89. *A. fatua* L. Flug-H. Panicula effusa. ♂. 8. Inter segetes.
- Sect. 2. Avenastrum. Valvae 1—3 nerviae. Spiculae non pendulae.  
Germen apice pilosum.
90. *A. pubescens* L. Wiesen-H. 4. 6. In pratis ad Jacobsdorf.
91. *A. flavescens* L. Gelber H. Folia supra pubescentia. 4. 6. In pratis et pascuis apud praedium Platzig.
- Sect. 3. Caryophyllea. Valvae 1—3 nerviae. Arista infra medium floris prodiens.  
Germen glabrum.
92. *A. flexuosa* Web. Schmielen-H. 4. 6. In collibus nemorosis post Jacobsdorf.
44. *Triodia* Beauv. (Gramineae Juss.) Panicula racemosa. Spiculae ovatae, 3—5 florae. Valvae flores subaequantes. Valvulae muticae.
93. *T. decumbens* Beauv. *Poa decumbens* L. Liegender Dreizahn. 4. 6—7. In pratis ad Sandkrug.
45. *Melica* L. (Gramineae Juss.) Spiculae 1—2 florae, ovatae. Valvae valvulae-muticae.
94. *M. nutans* L. Nickendes Perlgras. 4. 6—7. In silva ad Hülse.
95. *M. uniflora* Retz. Einblüthiges P. 4. 5—6. In silvis ad Buschmühle.
46. *Briza* L. (Gramineae Juss.) Panicula expansa. Spiculae cordatae; valvula exterior margine toto explanata; valvae valvulaeque convexae.
96. *B. media* L. Mittleres Zittergras. 4. 6—7. In pratis ad Buschmühle.
47. *Poa* L. (Gramineae Juss.) Panicula plerumque effusa. Spiculae bi—multiflorae, ovatae aut oblongae; valvae valvulaeque ovato-carinatae, muticae.
- Sect. 1. Radix fibrosa, stolones nulli.
97. *P. annua* L. Jähriges Rispengras. ♂. 4—9. In agris, ad vias ubique.
98. *P. nemoralis* L. Wald-N. 4. 6. In pratis et dumetis haud procul a praedio Zandersdorf; Buschmühle.
99. *P. bulbosa* L. Knolliges N. 4. 5—6. In locis apricis prope Grunsberg.

100. *P. fertilis* Host. Fruchtbäres N. 24. 6. Ad ripas rivuli prope Buschmühle.
101. *P. trivialis* L. Gemeines N. 24. 6. In locis humidis ad Dunkershagen.  
Sect. 2. Radix stolonifera, longe lateque repens.
102. *P. pratensis* L. Wiesen- N. 24. 5—6. In pratis prope Osterwick et Fran-  
kenhagen.
103. *P. compressa* L. Zweischneidiges N. 24. 6. In agris haud procul a Neue  
Welt.
48. *Glycèria* Rob. Br. (Gramineae Juss.) Panicula expansa. Spiculae multiflorae,  
cylindricæ, dorso teretes. Valvulae obtusæ.
104. *G. fluitans* Rob. Br. *Poa fluitans* Scop. Schwimmendes Mannagrass. 24.  
6—7. In stagno Heerbruch.
105. *G. spectabilis* Mert. et Koch. *Poa aquatica* L. Großes M. 24. 6. In pa-  
lude Negenpfuhl.
106. *G. aquatica* Presl. Catabrósa aquatica Beauv. Schmielen- M. 24. 6. In  
aquis stagnantibus prope Sandkrug.
49. *Molinia* Schrank. (Gramineae Juss.) Panicula ramosa, contracta; spiculae co-  
nicae, bi—multifloræ; flores e basi introrsum ventricosa conico - attenuati.
107. *M. coerulea* Moench. *Melica coerulea* L. Pfeifen- Schmiele. 24. 7—8. In  
pratis humidis apud Jacobsdorf.
50. *Dáctylis* L. (Gramineae Juss.) Panicula ramosa, ramulis ultimis brevissimis;  
spiculae conglomeratae, compressæ. Valvula exterior sub apice aristata.
108. *D. glomerata* L. Gemeines Knauelgras. 24. 6—7. In pratis et silvis ad  
Buschmühle.
51. *Cynosírus* L. (Gramineae Juss.) Panicula spiciformis, secunda. Spiculae brac-  
teis pinnatis fultæ.
109. *C. cristatus* L. Kammgras. 24. 6—7. In pratis ad paludem Heerbruch.
52. *Festuca* L. (Gramineae Juss.) Panicula ramosa, rhachi incisa. Spiculae pyra-  
midatae. Glumella bivalvis, calloso - articulata; valvula exterior apice  
aristata.
110. *F. ovina* L. Schaf- Schwingel. 24. 5—6. In collibus et pratis frequens.
111. *F. rubra* L. Rother S. 24. 5—6. In campis arenosis ad Wilhelminenthal.
112. *F. pratensis* Smith. Wiesen- S. 24. 6. In pratis ad Hülse.
53. *Bromus* L. (Gramineae Juss.) Panicula ramosa et diffusa; spiculae pyramidatae.  
Valvula exterior sub apice aristata.
113. *B. mollis* L. Wiesen- Trespe. ♂. 5—6. In pascuis ubique.

114. *B. racemosus* L. Trauben-L. ♂. 7. In iisdem locis.  
115. *B. giganteus* L. Riesen-L. 4. 6. Ad marginem silvae Freiheit.  
116. *B. secalinus* L. Roggen-L. 4. Inter segetes saepe frequens.  
117. *B. tectorum* L. Dach-L. ♂. 5—6. In muris hujus urbis.  
118. *B. inermis* L. Wehrlose L. 4. 6—7. Ad agrorum margines ad Schönfeld.  
54. *Phragmites* Trin. (Gramineae Juss.) Panicula ramosissima, diffusa. Spiculae multiflorae; flos inferior masculus, nudus; sequentes hermaphroditici, pilis elongatis cincti.  
119. *P. communis* Trin. Arundo Phragmites L. Nöhr. 4. 8—9. In omnibus stagnis et lacubus frequens.

Ord. III. Trigynia.

55. *Holosteum* L. (Caryophylleae Juss.) Calyx 5 sepalus, persistens. Corolla 5 petala; petala tridentata. Stamina 5 vel 3, 4.  
120. *H. umbellatum* L. Dolden-Spurre. Flores umbellati. ♂. 5. In agris prope silvam Freiheit, Dunkershagen.

Cl. IV. *Tetrandria*.

Ord. I. Monogynia.

A. Flores incompleti:

56. *Majanthemum* DC. (Smilacineae Rob. Br.) Flores racemosi, bracteis minutis. Perigonium corollinum, 4 partitum, revolutum. Stamina perigonii basi adnata; filamenta subulata. Stigma obtusum.  
121. *M. bifolium* DC. Zweiblättrige Schattenblume. Caulis bisilius. 4. 5—6. In silvis frequens.  
57. *Alchemilla* L. (Sanguisorbeae Lindl.) Perigonii tubus campanulatus; limbus octopartitus, lobis alternis minoribus. Stamina fauci perigonii inserta. Stigma capitatum.  
122. *A. vulgaris* L. Gemeiner Sinau. Frauenmantel. Folia reniformia, plicata. Flores virescentes. 4. 4—5. Ad prata ubique.  
123. *A. Aphanes* L. Acker-S. Folia tripartita. Flores glomerati, axillares. ♂. 7. In agris prope Niesewanz, Schönfeld, Richnau.  
58. *Sanguisorba* L. (Sanguisorbeae Lindl.) Perigonii corollini tubus urceolatus, bracteis 3 cinctus; limbus 4 partitus. Stamina laciniis limbi opposita. Stigma capitato - penicilliforme.

124. *S. officinalis* L. Gemeiner Wiesenknöpf. Folia impari-pinnata. 4, 6—7.  
In pratis udis apud Zandersdorf, Buschmühle.

B. Flores completi.

a. Calyx proprius duplex. Corolla monopetala.

59. *Scabiosa* L. (Dipsaceae Juss.) Flores aggregati in clinanthium. Periclinium polyphyllum. Clinanthium paleaceum aut hirsutum. Calyx exterior pro-funde sulcatus; interior patelliformis, margine in 5 setas aristatas desinens. Flosculi tubuloso-infundibuliformes, limbo 4—5 fido, exteriore radiantes.

Sect. 1. Flosculi limbus quadrifidus.

125. *S. arvensis* L. Alfer- $\ddot{\text{S}}$ abiose. Folia caulinia pinnatifida. Flosculi plerum-que carnei. 4. 7. In pratis et agris frequens.

126. *S. succisa* L. Wiesen- $\ddot{\text{S}}$ . Teufels- $\ddot{\text{A}}$ bbi $\ddot{\text{S}}$ . Folia lanceolata. Flosculi coe-ruei. 4. 7—8. In pratis humidis prope Dunkershagen et alibi.

Sect. 2. Flosculi limbus quinquefidus.

127. *S. columbaria* L. Lauben- $\ddot{\text{S}}$ . Folia radicalia obovata, caulinia pinnata. Flosculi coerulei. 4. 7. In pratis et collibus prope Hülfe.

128. *S. ochroleuca* L. Gelbe  $\ddot{\text{S}}$ . Folia radicalia oblonga, caulinia inferiora lyrata, superiora pinnatifida. Flosculi flavescentes. 4. 7. In collibus siccis prope Jacobsdorf.

60. *Dipsacus* L. (Dipsaceae Juss.) Flores aggregati in clinanthium. Periclinium polyphyllum. Clinanthium conicum, paleis pungentibus obssessum. Calyx exterior obsoletus, interior cyathiformis. Flosculi tubuloso-infundibuliformes, limbo quadrilobo.

129. *D. silvestris* Miller. Wald- $\ddot{\text{K}}$ arden. Caulis aculeatus. ♂. 7. In silva post Buschmühle.

b. Calyx simplex. Corolla monopetala, infera.

61. *Plantago* L. (Plantagineae Juss.) Calyx 4fidus. Corolla hypocrateriformis, mar-cescens, limbo 4partito. Stamina elongata.

130. *P. major* L. Großer Wegerich. 4. 7. In agris et viarum marginibus.

131. *P. media* L. Mittlerer  $\ddot{\text{W}}$ . 4. 7. In iisdem locis.

132. *P. lanceolata* L. Langettblättriger  $\ddot{\text{W}}$ . Spica conica. 4. 6. In pratis et pasuis ubique.

133. *P. arenaria* Kitaib. Sand- $\ddot{\text{W}}$ . Spica terminalis, subcorymbosa, ovata. ♂. 6—8. In agris prope Gigel.

62. *Centunculus* L. (Primulaceae Vent.) Calyx 4partitus. Corollae tubus subglo-boso-ventricosus; limbus 4partitus, patens.

134. *C. minimus* L. Kleinster Kleinling. Folia alterna. ♂. 6—7. Post prae-dium Platzig.

c. Calyx simplex. Corolla monopetala, supera.

63. *Galium* L. (Rubiaceae Juss.) Calyx obsoletus, 4 dentatus. Corolla rotata aut hypocrateiformis, limbo 4 partito.

Sect. 1. Caulis retrorsum aculeato-scaber. Inflorescentia axillaris.

135. *G. Aparine* L. Kleb-Labkraut. Folia sena et octona. Flores virescentes. ♂. 6. In ruderatis, ad viam prope villam Schützenhaus.

136. *G. uliginosum* L. Morast-L. Folia sena. Flores albi. 4. 6—7. In uli-ginosis prope Dunkershagen.

137. *G. palustre* L. Sumpf-L. Folia quaterna. Flores albi. 4. 7. In palu-dibus prope Buschmühle.

Sect. 2. Caulis glaber vel hirsutus. Inflorescentia terminalis.

138. *G. boreale* L. Nördliches L. Folia quaterna. Flores albi. 4. 7. In ne-more Zandersdorfensi.

139. *G. verum* L. Gelbes L. Folia octona duodenave, cano-tomentosa. Flores aurei. 4. 6—7. In locis graminosis siccis frequens.

140. *G. Mollugo* L. Weißes L. Folia octona. Flores albi. 4. 6. Ad vias saepe invenitur.

141. *G. cruciatum* Scop. Kreuzblättriges L. Folia quaterna. Flores cymosi, au-rei. 4. 5. In pratis silvaticis prope Buschmühle.

64. *Asperula* L. (Rubiaceae Juss.) Calyx brevissimus, 4 dentatus, deciduus. Corolla infundibuliformis, 4 fida, rarissime 3 fida. Stamina tubo corollae ad-nata. Stigma 2 fidum.

142. *A. odorata* L. Waldmeister. Folia verticillata, octona. Corymbi terminales; flores albi. 4. 6. Prope Buschmühle.

d. Corolla polypetala, supera.

65. *Cornus* L. (Cornaceae DC.) Calyx 4 dentatus. Corolla 4 petala. Stamina pe-talis alterna. Drupa putamine biloculari.

143. *C. sanguinea* L. Rother Hartriegel. Folia ovalia. Flores albi. 4. 6—7. In fruticetis et silvis prope Buschmühle.

Ord. II. Digynia.

66. *Cuscuta* L. (Convolvulaceae Juss.) Calyx 4—5 lobus. Corolla 4—5 fida. Squamae quatuor staminum basi affixae.

144. *C. europaea* L. Europäische Pflanzenseide. Caulis volubilis, ramosus. Ⓛ.  
6. Planta parasitica ad ripas Brahe fluvii apud Rittel.

Ord. III. *Tetragynia*.

67. *Sagina* L. (Caryophylleae Juss.) Calyx 4 sepalus, demum patentissimus. Corolla 4 petala. Capsula unilocularis, polysperma.
145. *S. procumbens* L. Liegende Wasserperle. Caules procumbentes. Ⓛ. 5—7. In paludosis prope Sandkrug.
68. *Radiola* Dill. (Lineae DC.) Calyx 4 sepalus, persistens, sepalis bi—tridentatis. Corolla 4 petala. Capsula subglobosa, 8 locularis, 8 sperma.
146. *R. linoides* Gmel. Leinartiger Zwergfleck. Caulis superne ramosus. Ⓛ. 6—7. Prope Funkermühle.
69. *Potamogéton* L. (Fluviales Vent.) Perigonium 4 partitum. Stamina basi perigonii inserta. Stigmata obtusa. Nuculae quatuor.  
Sect. 1. Folia superiora petiolata, natantia, difformia.
147. *P. natans* L. Schwimmendes Laichkraut. Caulis simplex. 4. 6. In palude Heerbruch.  
Sect. 2. Folia omnia immersa, conformia.
148. *P. lucens* L. Glänzendes L. Caulis ramosus. 4. 6. In stagno Ziegel-See.
149. *P. perfoliatus* L. Durchwachsenes L. Caulis subramosus. 4. 6. In Brahe fluvio apud Menzikal, Klonia.
150. *P. crispus* L. Krauses L. Caulis ramosus compressus. 4. 6. In lacu Lockmann prope Funkermühle.
151. *P. zosterifolius* Schum. Wasserriemenblättriges L. Caulis alato-compressus. 4. 6. In palude Negenpfuhl.

Cl. V. *Pentandria*.

Ord. I. *Monogynia*.

A. *Corolla monopetala, infera*.

a. Nuces quatuor monospermae, vel duae dispermae.

70. *Asperugo* L. (Boragineae Juss.) Calyx 5 fidus, compressus. Corolla infundibuliformis, limbo 5 lobo, fauce fornicibus clausa. Stamina tubo corollae affixa, laciinis alterna. Nuces compressae.
152. *A. procumbens* L. Liegendes Scharffraut. Caulis procumbens. Ⓛ. 5—6. Ad vias, sepes ubique.

71. *Cynoglossum* L. (Boragineae Juss.) Calyx 5 partitus. Corolla infundibuliformis, tubo cylindrico, limbo 5 fido, fauce fornicibus erectis obsita. Stamina fornicibus alterna. Stigma obtusum. Nuces quatuor echinatae.
153. *C. officinale* L. Hundszunge. Caulis villosiusculus. ♂. 6. Ad vias, in agris frequens.
72. *Anchusa* L. (Boragineae Juss.) Calyx 5 fidus. Corolla infundibuliformis, limbo 5 lobo, fauce fornicibus clausa. Stamina inclusa. Stigma capitatum. Nuces fundo calycis affixa, turbinatae.
154. *A. officinalis* L. Ochsenzunge. Caulis hispidus, superne ramosus. ♀. 6. In agris incultis frequens.
73. *Lycópsis* L. (Boragineae Juss.) Calyx 5 partitus. Corolla infundibuliformis, tubo incurvo, limbo oblique 5 lobo, fauce fornicibus villosis clausa. Stigma capitatum. Nuces turbinatae, rugosae.
155. *L. arvensis* L. Acker-Krummhals. Wolfsgesicht. Caulis hispidus. ♂. 6—8. Inter segetes ubique.
74. *Sympyrum* L. (Boragineae Juss.) Calyx 5 partitus. Corolla cylindrico-campanulata, limbo 5 dentato, fauce fornicibus subulatis in conum conniventibus instructa. Stamina fornicibus alterna. Stigma obtusum. Nuces ovatae.
156. *S. officinale* L. Wallwurz. Beinwell. ♀. 6. Ad fossas frequens.
75. *Échium* L. (Boragineae Juss.) Calyx 5 partitus. Corolla tubulosa, superne ampliata, fauce nuda. Nuculae grandiusculae, scabrae, basi truncatae.
157. *E. vulgare* L. Mutterkopf. ♂. 6—8. In agris nostris frequens.
76. *Bordó* L. (Boragineae Juss.) Calyx 5 partitus, post anthesin clausus. Corolla rotata, limbo 5 partito. Faux fornicibus obtusis, emarginatis obsessa. Nuculae turbinatae, rugosae, basi truncatae.
158. *B. officinalis* L. Boretsch. Folia alterna, oblonga et lanceolata. ♂. 6. Transfuga ex hortis prope villam Schützenhaus.
77. *Pulmonária* L. (Boragineae Juss.) Calyx prismaticus, 5 dentatus. Corolla campanulata, limbo 5 fido, fauce pilosa. Nuculae ovato-compressae.
159. *P. officinalis* L. Offizinelles Lungenkraut. ♀. 4—5. Inter fruticeta apud Dunkershagen.
160. *P. angustifolia* L. Schmalblättriges L. Folia omnia lanceolata. ♀. 5—6. In iisdem locis.
78. *Lithospérnum* L. (Boragineae Juss.) Calyx 5 partitus. Corolla infundibuliformis, limbo 5 fido, fauce nuda vel pilis obsita. Nuculae ovato-trigonae.

161. *L. arvense* L. Acker-Steinsame. Folia lanceolata. ♂. 5—6. Ad agrorum et viarum margines frequens.
79. *Myosotis* L. (Boragineae Juss.) Calyx 5 fidus. Corolla hypocrateriformis; limbus planus; fauce fornicibus 5 squamiformibus glabris coarctata. Nuculae basi truncatae.
- Sect. 1. Calyx adpresso-pilosus.
162. *M. palustris* With. Sumpf-Vergißmeinnicht. Caulis angulatus, stolonifer. 4. 5—6. In fossis frequens.
- Sect. 2. Calyx uncinato-setosus.
163. *M. silvatica* Ehrh. Wald-Β. Folia linear-lanceolata. 4. 5. In silvis prope Buschmühle.
164. *M. intermedia* Link. Mittleres Β. Folia oblongo-lanceolata. ♂. 6—7. In agris nostris frequens.
165. *M. hispida* Schlecht. Vorstiges Β. Pedicelli fructiferi patentes calycem apertum aequantes. ♂. 5. In collibus apricis prope silvam Freiheit.
166. *M. versicolor* Pers. Bunteς Β. Pedicelli calyce breviores. Flores primum sulphurei, dein azurei, demum violacei. ♂. 5. In silva apud Hohenkamp.
167. *M. stricta* Link. Straffes Β. Pedicelli brevissimi. ♂. 5—6. In agris arenosis prope Niesewanz, Richnau.
168. *M. sparsiflora* Mik. zerstreutblütiges Β. Pedicelli longissimi, refracti. ♂. 6. In silva prope Regnitz Mühle.
80. *Echinospérnum* Sw. (Boragineae Juss.) Calyx 5 fidus. Corolla hypocrateriformis, limbo plano, 5 lobo, fauce fornicibus brevibus clausa. Nuculae triquetrae.
169. *E. Lappula* Sw. *Myosotis Lappula* L. Klettenartiger Stachelsame. Folia linear-lanceolata, pilis adpressis. ♂ et ♂. 6—7. In agris prope Müskendorf.
- b. Capsula unilocularis.
81. *Anagallis* L. (Primulaceae Vent.) Calyx 5 partitus. Corolla rotata, 5 partita, lacinii ovato-orbiculatis. Capsula acuminata, globosa, circumscissa.
170. *A. phoenicea* Lam. *A. arvensis* L. Acker-Gauchheil. Folia ovata. Flores punicei. ♂. 7. In agris prope Müskendorf, Funkermühle etc.
82. *Lysimachia* L. (Primulaceae Vent.) Calyx 5 partitus, persistens. Corolla rotata, limbo 5 partito. Capsula 5 valvis.

Sect. 1. Pedunculi multiflori.

171. *L. vulgaris* L. Gemeiner Weiderich. Racemi compositi, axillares, foliis longiores. 4. 5. Ad fossarum margines prope Wilhelminenthal.

172. *L. thyriflora* L. Strauß-W. Thyrsi axillares, oppositi, foliis breviores. 4. 6. In paludibus prope Buschmühle.

Sect. 2. Pedunculi uniflori.

173. *L. nemorum* L. Wald-W. Caulis prostratus. Pedunculi axillares folia superantes. 4. 5—6. In pratis sylvaticis prope Buschmühle.

174. *L. Nummularia* L. Pfennigsfraut. Caulis prostratus, repens. Pedunculi foliis breviores. 4. 6—7. In locis paludosis frequens.

83. *Hottónia* L. (Primulaceae Vent.) Calyx 5 partitus, lacinias lanceolatis. Corolla hypocrateriformis; limbus 5 partitus, lacinias ovatis, planis. Capsula ova, 5 valvis.

175. *H. palustris* L. Sumpffeder. Folia pectinato-pinnatisida. 4. 5—6. In aquis stagnantibus frequens.

84. *Primula* L. (Primulaceae Vent.) Calyx tubulosus, 5 dentatus aut 5 fidus. Corolla hypocrateriformis; limbus 5 lobus, lobis obtusis, emarginatis. Capsula ovata.

176. *P. veris* L. Schlüsselblume. 4. 5. In fruticetis frequens.

85. *Menyanthes* L. (Gentianeae Spr.) Calyx 5 partitus. Corolla infundibuliformis; limbus 5 partitus, intus barbatus. Capsula ovato-lanceolata.

177. *M. trifoliata* L. Bitterflee. Folia ternata. Flores racemosi. 4. 5. In aquis stagnantibus frequens.

86. *Erythraea* L. (Gentianeae Spr.) Calyx pentagonus, 5 partitus. Corolla infundibuliformis, tubo cylindrico, limbo 5 fido, patente. Antherae defloratae spiraliiter tortae. Capsula cylindrica, bivalvis.

178. *E. Centaurium* Pers. Große Tausendguldenfraut. Caulis superne ramosiusculus. Flores fasciculato-corymbosi, bracteati. 4. 6. Post villam Schützenhaus.

179. *E. inaperta* Knuth. Kleine E. Caulis ramosissimus. Flores terminales et axillares, ebracteati. ④. 6—7. In iisdem locis.

87. *Convolvulus* L. (Convolvulaceae Juss.) Calyx 5 partitus, nudus vel bracteatus. Corolla infundibuliformi-campanulata, limbo 5 lobo, plicato. Capsula bi-trilocularis.

180. *C. arvensis* L. Acker-Winde. 4. 6. In agris frequens.

181. *C. sepium* L. Zaun-W. 4. 6—7. Inter fruticeta apud Buschmühle.

88. *Hyoscyamus* L. (Solaneae Juss.) Calyx campanulatus, 5 dentatus. Corolla infundibuliformis, limbo oblique 5 lobo. Capsula ovata, operculo circumscisso.

182. *H. niger* L. Gilzenkraut. Caulis viscoso-vilosus. ♂ et ♀. 5—7. In ruderatis frequens.

89. *Datura* L. (Solaneae Juss.) Calyx tubulosus, quinangularis, 5 fidus. Corolla infundibuliformis, 5 plicata, limbo quinangulari. Capsula ovata, echinata.

183. *D. Stramonium* L. Stechapfel. Caulis herbaceus, ramosus. ♂. 6—7. In ruderatis, ad sepes prope Rittel, Menzikal.

90. *Verbascum* L. (Scrophularinae Rob. Br.) Calyx 5 partitus. Corolla rotata, limbo 5 lobo. Capsula 2 valvis.

Sect. 1. Filamenta tria albo-lanata. Folia decurrentia.

184. *V. Thapsus* L. Kleinblumige Königskerze. Folia dense tomentosa. Antherae quater filamentis minores. ♂. 6—7. In campis arenosis frequens.

185. *V. Thapsiforme* Schrad. Großblumige K. Antherae bis filamentis minores. ♂. 6—7. In agris post villam Schützenhaus.

Sect. 2. Filamenta omnia lanata. Flores fasciculati. Folia non decurrentia.

186. *V. nigrum* L. Schwarze K. Folia crenata, tenuissime tomentosa. Filamenta violaceo-lanata. ♂. 6—7. Ad collis radicem prope villam Schützenhaus,

c. Fructus baccatus.

91. *Solanum* L. (Solaneae Juss.) Calyx 5 partitus. Corolla subrotunda, plicata, 5 fida. Antherae conniventes. Baccia polysperma.

187. *S. Dulcamara* L. Bittersüß-Nachtschatten. Caulis frutescens, scandens. Corolla violacea. Baccae rubrae. ♂. 6. Inter fruticeta prope Buschmühle.

188. *S. nigrum* L. Schwarzer N. Caulis herbaceus. Pedunculi subumbellati. Baccae atrae. ♂. 7. In ruderatis, ad muros urbis nostrae.

189. *S. villosum* L. Zottiger N. Caulis annuus, ramosus. Baccae luteae. ♂. 7. In iisdem locis.

190. *S. tuberosum* L. Kartoffel. Colitur.

B. Corolla monopetala, supera.

a. Fructus capsularis.

92. *Campanula* L. (Campanulaceae Juss.) Calyx 5 fidus. Corolla campanulata, 5-fida. Filamenta basi dilatata. Capsula 2—5 locularis.

Sect. 1. Flores pedicellati, solitarii, racemosi vel paniculati.

191. *C. rotundifolia* L. Rundblättrige Glockenblume. Folia radicalia reniformia, caulina linearia. 4. 6—8. In pratis et silvis prope Dunkershagen, Zandersdorf, Buschmühle.
192. *C. patula* L. Öffnungsstehende G. Folia radicalia oblongo-ovata, caulina lanceolata. Corolla violacea. 4. 5—6. In locis graminosis post villam Schützenhaus.
193. *C. persicifolia* L. Pfirsichblättrige G. Folia radicalia obovata, caulina linearis-lanceolata. 4. 5—6. In nemoribus prope Zandersdorf.
194. *C. Trachelium* L. Nesselblättrige G. Folia cordata, superiora oblonga. 4. 7. In silvis nostris frequens.
195. *C. rapunculoides* L. Kriechende G. Folia inferiora subcordata, superiora lanceolata. Racemus terminalis, secundus. 4. 7. In silvis prope Buschmühle.

Sect. 2. Flores sessiles, glomerati.

196. *C. Cervicaria* L. Hörstige G. Folia radicalia lanceolata, caulina lanceolata, superiora amplexicaulia. Corolla coerulea. 4. 7. In nemoribus prope Dunkershagen.
197. *C. glomerata* L. Gefügelte G. Folia oblongo-ovata. Corolla violacea. 4. 7. In iisdem locis.
198. *P. spicatum* L. Achlige Rapunzel. Folia inferiora ovata, superiora lanceolata. 4. 5—6. In silva umbrosa Freiheit.
199. *J. Jasiona* L. (Campanulaceae Juss.) Involucrum imbricatum. Calyx 5 partitus. Corolla 5 partita, laciniis linearibus. Capsula bilocularis.
200. *J. montana* L. Berg-Jasione. Folia linearis-lanceolata. ♂ et ♂. 7. Frequentissima in omnibus agris nostris.
  - b. Fructus baccatus.
201. *Lonicéra* L. (Caprifoliaceae Juss.) Calyx 5 dentatus, Corolla tubulosa, inaequaliter 5 fida, laciniis revolutis. Baccia bi-trilocularis.
202. *L. Xylosteum* L. Heckenfirsche. 4. 5—6. In fruticetis prope Buschmühle.
  - C. Corolla polypetala, infera.
203. *Viola* L. (Violaceae De Cand.) Calyx 5 sepalus. Corolla 5 petala, irregularis; petalum inferius in calcar cavum productum. Capsula trigona, trivalvis.

Sect. 1. Acaules.

201. *V. palustris* L. Sumpf-Veilchen. Folia reniformi-cordata. ♀. 5. In paludosis prope Schützenhaus.  
202. *V. odorata* L. Wohlriechendes V. Folia cordata. ♀. 4. In nemore Zandersdorfensi.

Sect. 2. Caulescentes.

203. *V. mirabilis* L. Wunder-V. Caulis unifarium pilosus. ♀. 5. In pratis sylvaticis prope Buschmühle.  
204. *V. canina* L. Hund-V. Folia cordato-ovata. ♀. 5. In graminosis ubique.  
205. *V. tricolor* L. Stiefmütterchen. ♂ et ♂. 5. In agris et silvis frequens.  
97. *Impatiens* L. (Balsamineae Rich.) Calyx 5 sepalus, irregularis, coloratus, catus. Corolla 4 petala. Capsula cylindrica.  
206. *I. noli tangere* L. Springfaut. Caulis ad genicula tumidus. Folia alterna, oblonga, dentata. ♂. 7—8. In locis paludosis prope Dunkershagen.  
98. *Evonymus* L. (Celastrineae Rob. Br.) Calyx 4—5 fidus. Corolla 4—5 petala. Capsula 3—5 angularis.  
207. *E. europaeus* L. Spindelbaum. Rami laeves. ♂. 5—6. In nemoribus prope Buschmühle; in sepulcreto catholicorum.  
99. *Rhamnus* L. (Rhamneae Rob. Br.) Calyx 4—5 fidus. Corolla 4—5 petala; petala laciiniis calycis alterna. Bacca globosa, carnosa.  
208. *Rh. catharticus* L. Kreuzdorn. Rami in spinas desinentes. ♂. 5—6. In fruticetis ad Dunkershagen.  
209. *Rh. Frangula* L. Faulbaum. Caulis inermis. ♂. 5—6. In fruticetis prope Buschmühle.

D. Corolla polypetala, supera.

100. *Ribes* L. (Grossulareae DC.) Calyx urceolatus, cum germine coalitus, limbo 5 dentato. Corolla 5 petala; petala squamiformia, calycis fauci inserta. Bacca globosa, calyce emarcido coronata.  
210. *R. rubrum* L. Johannisbeere. ♂. 5. In silvis prope Regnitz Mühle.  
211. *R. nigrum* L. Bockbeere. Folia subtus punctato-glandulosa. ♂. 5. Ad collis radicem prope Wilhelmenthal.  
101. *Hedera* L. (Araliaceae Juss.) Calyx ovario adnatus, 5 dentatus, dentibus deciduis. Corolla 5 petala. Bacca globosa.

212. *H. Helix* L. Epheu. Caulis fruticosus, scandens radicans. H. 10. In silva prope Buschmühle.

Ord. II. Digynia.

I. *Flos incompletus.*

102. *Ulmus* L. (Ulmaceae Mirb.) Perigonium turbinatum, 4—8 dentatum. Samara compressa.

213. *U. campestris* L. Feld-Münster. H. 3—4. In campis et silvis prope Buschmühle.

214. *U. effusa* L. Langstieltige R. Flores longe pedunculati. H. 4. In nemoribus post Hülse.

103. *Chenopodium* L. (Chenopodeae Vent.) Perigonium 5 partitum. Utriculus membranaceus, perigonio inclusus, monospermus.

Sect. 1. Chenopodium. Stigmata brevissima. Semen horizontale.

215. *Ch. hybridum* L. Bastard-Gänsefuß. O. 7. In ruderatis ubique.

216. *Ch. urbicum* L. Stadt-G. O. 7. Ad vias.

217. *Ch. murale* L. Mauer-G. O. 7. In iisdem locis.

218. *Ch. Vulvaria* L. Stink-G. Folia cano-farinosa. O. 7. In hortis, ad vias ubique.

219. *Ch. album* L. Weißer G. Folia albo-farinosa. O. 6—8. In cultis et incultis ubique.

220. *Ch. polyspermum* L. Vielsamiger G. O. 7. Ad horrea suburbana.

Sect. 2. Agathophytum. Stigmata elongato-subulata. Semen verticale.

221. *Ch. Bonus Henricus* L. Hundsmelde. 4. 7. Ad vias ubique.

Sect. 3. Orthosporum. Stigmata brevia. Semen verticale.

222. *Ch. rubrum* L. Röther Gänsefuß. O. 7. In ruderatis prope Schützenhaus.

223. *Ch. glaucum* L. Blaugrüner G. Folia subtus glauca. O. 7. Ad horrea suburbii.

104. *Atriplex* L. (Chenopodeae Vent.) Perigonium 2—5 partitum. Utriculus monospermus, compressus.

224. *A. patula* L. Öffnungskehende Melde. O. 8. Ad sepes hortorum ubique.

225. *A. hastata* L. Spießförmige M. O. 7—8. Ad vias, in ruderatis suburbii.

226. *A. hortensis* L. Garten-Melde. Colitur.

105. *Herniaria* L. (Paronychia St. Hilaire.) Perigonium 5 partitum. Stamina decem, alterna sterilia. Utriculus monospermus.

227. *H. glabra* L. Glattes Bruchkraut. Glomeruli axillares, multiflori. ○. 6—7. In agris nostris frequens.

228. *H. hirsuta* L. Rauchhaariges B. Glomeruli pauciflori. ○. 7—9. In arenosis collibus prope Niesewanz.

**II. Flos completus.**

A. Corolla monopetala.

106. *Cynanchum* Rob. Br. (Asclepiadaceae Rob. Br.) Calyx 5 partitus. Corolla rotata, 5 partita. Folliculi duo.

229. *C. Vincetoxicum* Rob. Br. Schwalbenwurz. 4. 6—7. In collibus silvae prope Buschmühle, Hohenkamp.

107. *Gentiana* L. (Gentianae Juss.) Calyx quinque—septemfidus, rarius quadrifidus, campanulatus. Corolla rotata aut cyathiformis aut insundibuliformis; fauce interdum barbata.

230. *G. Pneumonanthe* L. Lungen-Engian. Corolla 5 fida. 4. 8—9. In pratis humidis prope Gemel.

231. *G. Amarella* L. Bitter-Engian. Corolla 5 fida. ○. 8—9. In pratis prope Schlochau.

232. *G. campestris* L. Feld-Engian. Calyx 4 fidus. Corolla 4 fida. ○. 8. In pratis prope Gigel.

B. Corolla pentapetala. Umbelliferae.

a. Umbella capitata aut simplex.

108. *Eryngium* L. (Umbelliferae Juss.) Involucrum subspirosum. Calycis tubus squamulis vesiculisque asper, limbus 5 fidus. Petala conniventia. Capsula bivalvis.

233. *E. planum* L. Flachblättrige Mannstreue. 4. 6—7. Ad viam haud procul a praedio Zandersdorf.

109. *Sanicula* L. (Umbelliferae Juss.) Involucrum oligophyllum. Calyx persistens, limbo 5 dentato. Petala obovata, conniventia. Fructus setis uncinatis dense tectus.

234. *S. europaea* L. Sanikel. 4. 5—6. In silvis umbrosis post Hohenkamp.

110. *Hydrocotyle* L. (Umbelliferae Juss.) Umbella simplex. Calycis margo obsoletus. Petala integra. Fructus planiusculus.

235. *H. vulgaris* L. Gemeiner Wassernabel. Folia peltata. 4. 6. Ad paludem Negenpfehl.

b. Umbella composita.

1. Fructus aculeati aut rostrati.

a. Fructus aculeati, non rostrati.

111. *Torilis* Adans. (Umbelliferae Juss.) Involucrum polyphyllum. Calycis margo 5 dentatus. Petala emarginata cum lacinula inflexa. Fructus a latere contractus.

236. *T. Anthriscus* Gmel. Rettentörbel. ♂. 6. In dumetis, ad sepes ubique.

β. Fructus rostrati, non aculeati.

112. *Anthriscus* Hoffm. (Umbelliferae Juss.) Involucrum nullum. Calycis margo obsoletus. Petala truncata vel emarginata cum lacinula inflexa. Fructus ovatus, ecostatus.

237. *A. Cerefolium* Hoffm. Körbel. Caulis supra genicula puberulus. ○. 5. Ad hortorum margines post stagnum Ziegel-See.

238. *A. silvestris* Hoffm. Wald-R. Caulis inferne hirsutus. 4. 6. In silva uda prope Buschmühle.

239. *A. vulgaris* Pers. Gemeiner R. Caulis glaber. Stylus brevissimus. ○. 5—6. Ad sepes: Müskendorf.

113. *Chaerophyllum* L. (Umbelliferae Juss.) Calycis margo obsoletus. Petala obovata, emarginata, cum lacinula inflexa. Fructus a latere compressus. Rostrum fere nullum.

240. *Ch. temulum* L. Gift-Rälberkropf. Caulis sub geniculis inflatus. ♂. 6. Ad sepes prope Zandersdorf, Buschmühle.

241. *Ch. bulbosum* L. Knollen-R. Caulis basi hispidus, supra glaber. ♂. 6. In dumetis prope Dunkershagen.

2. Fructus sine rostro et aculeis.

a. Fructus a latere compressus.

α. Calyx obsoletus.

114. *Bupleurum* L. (Umbelliferae Juss.) Petala subrotunda, integra, reflexa; lacinula truncata. Fructus stylopodio coronatus.

242. *B. rotundifolium* L. Rundblättriges Hasenohr. Involucrum nullum; involucella pentaphylla. Flores lutei. ○. 7—8. Inter segetes.

115. *Carum* L. (Umbelliferae Juss.) Involucrum monophyllum vel nullum. Petala obovata, emarginata, cum lacinula inflexa. Fructus oblongus.

243. *C. Carvi* L. Gemeiner Rämmel. Caulis angulatus. ♂. 5. In pascuis post villam Schützenhaus.

116. *Aegopodium L.* (Umbelliferae Juss.) Petala obovata, emarginata, cum lacinula inflexa. Fructus oblongus.
244. *A. Podagraria L.* Giersch. 4. 5. Ad sepes, in hortis.
117. *Pimpinella L.* (Umbelliferae Juss.) Petala obovata, emarginata, cum lacinula inflexa. Fructus obovatus, stylis reflexis stylopodioque pelviformi coronatus.
245. *P. magna L.* Große Vibernell. Styli germinate longiores, 4. 6. In pratis prope Zandersdorf.
246. *P. saxifraga L.* Steinbrech-Vibernell. Styli germinate breviores. 4. 7. In collibus apricis prope sepulcrenum Judaeorum.
247. *P. nigra Willd.* Schwarze Vibernell. Styli germinate breviores. 4. 7. Inter fruticeta nemoris Zandersdorffensis.
118. *Conium L.* (Umbelliferae Juss.) Involucrum 5 phylum; involucella 3 phylla, unilateralia. Petala obcordata, cum lacinula brevissima inflexa. Carpelum jugis 5 prominulis, undulato - crenatis.
248. *C. maculatum L.* Gefleckter Schierling. Caulis maculatus, glaber. ♂. 7. In ruderatis, ad sepes, vias: Müskendorf, Hennigsdorf.
- β. Calyx quinquedentatus.
119. *Cicuta L.* (Umbelliferae Juss.) Involucella polyphylla. Calycis dentes foliosi. Petala obcordata, cum lacinula inflexa. Fructus subrotundus, sulcatus.
249. *C. virosa L.* Wasser-Schierling. Rhizoma fistulosum septatum. Caulis tenue striatus. 4. 8. In fossibus, paludibus prope Buschmühle.
120. *Oenanthe L.* (Umbelliferae Juss.) Involucrum oligophyllum vel nullum; involucella polyphylla. Petala emarginata, cum lacinula inflexa. Fructus cylindraceus, calyce pistillisque coronatus.
250. *O. Phellandrium Lam.* Phellandrium aquaticum L. Fenchel-Nebendolde. ♂. 7. In fossis prope Hülse.
121. *Sium L.* (Umbelliferae Juss.) Involucrum polyphyllum; involucella polyphylla. Petala emarginata, cum lacinula inflexa. Fructus stylopodio pulvinato et margine depresso stylisque reflexis coronatus.
251. *S. latisolum L.* Wassermerk. 4. 7. In fossis prope Buschmühle, Hülse.
- b. Fructus a dorso compressus.
- α. Petala integra, involuta.
122. *Angélica L.* (Umbelliferae Juss.) Involucrum oligophyllum vel nullum; involucella polyphylla. Fructus utrinque bialatus.
252. *A. silvestris L.* Bürstwurz. 4. 7. In pratis silvaticis apud Regnitz Mühle.

123. *Archangelica* Hoffm. (Umbelliferae Juss.) Involucrum polyphyllum; involucella polyphylla. Petala acuminata. Fructus utrinque bialatus.
253. *A. officinalis* Hoffm. Angelica Archangelica L. Engelwurz. ♂ aut 4. 7. In pratis umbrosis udis prope Buschmühle.
124. *Pastinaca* Spr. (Umbelliferae Juss.) Involucella subnulla. Calycis margo obsoletus. Fructus plano-compressus.
254. *P. sativa* L. Pastina. ♂. 7. In nemore Zandersdorfsensi.
125. *Peucedanum* L. (Umbelliferae Juss.) Involucrum varium; involucella polyphylla. Calycis margo 5 dentatus. Fructus margine dilatato complanato cinctus.
255. *P. palustre* Moench. *Selinum palustre* L. Sumpf-Silge. ♂. 7. In pratis paludosis prope Buschmühle.
256. *P. Cervaria* Lapey. Athamanta Cervaria L. Hirschwurz. 4. 7. In silvis prope Regnitz Mühle.
257. *P. Oreoselinum* Moench. Athamanta Oreoselinum L. Berg-Silge. 4. 7. In collibus apricis prope Hülse.
- β. Petala emarginata, involuta.
126. *Heracléum* L. (Umbelliferae Juss.) Involucrum oligophyllum; involucella polyphylla. Calyx 5 dentatus. Petala bifida. Fructus membranaceo-marginatus. Flores subradiantes.
258. *H. Sphondylium* L. Gemeine Bärenklau. ♂. 7. In pratis prope Hülse.
127. *Selinum* L. (Umbelliferae Juss.) Involucrum oligophyllum; involucella polyphylla. Calycis margo obsoletus. Fructus utrinque bialatus.
259. *S. carifolium* L. Kümmelblättrige Silge. 4. 7. In pratis humidis apud Schlochau.
- c. Fructus non compressus, rotundatus.
128. *Séseli* L. (Umbelliferae Juss.) Involucella polyphylla, reflexa. Calycis margo 5 dentatus. Fructus tomentoso-hispidus, stylis reflexis coronatus.
260. *S. Libanotis* Koch. Athamanta Libanotis L. Libanotis. 4. 7. In nemoribus prope Dunkershagen, Zandersdorf.
129. *Aethusa* L. (Umbelliferae Juss.) Involucella oligophylla, umbellulas superantia. Calycis margo obsoletus. Fructus ovato-subglobosus.
261. *Ae. Cynapium* L. Hundspetersilie. Folia nitida. ♂ et ♂. In hortis oltoriis frequens.

Ord. III. Trigynia.

130. *Viburnum* L. (Caprifoliaceae Juss.) Calyx 5 dentatus. Corolla rotata, 5 loba.  
Bacca subrotunda, monosperma.
262. *V. Opulus* L. Wilder Schneeball. ♂. 5—6. Ad collis radicem post vil-  
lam Schützenhaus.
131. *Sambucus* L. (Caprifoliaceae Juss.) Calyx superus, 5 dentatus. Corolla ro-  
tata, 5 loba. Bacca subrotunda, trisperma.
263. *S. nigra* L. Hollunder. ♂. 6. In pagis, ad sepes frequens.
264. *S. Ebulus* L. Zwerg-Hollunder. Caulis herbaceus, sulcatus. ♂. 7. In hor-  
tis, plantariis nostris.
265. *S. racemosa* L. Trauben-Hollunder. Arborescens. Baccae coccineae. ♂.  
6. In iisdem locis.

Ord. IV. Tetragynia.

132. *Parnassia* L. (Droseraceae DC.) Calyx 5 partitus. Corolla 5 petala. Paraco-  
rolla. Capsula tetragona.
266. *P. palustris* L. Sumpf-Herzblatt. 4. 7—8. In pratis nostris ubique.

Ord. V. Pentagynia.

133. *Linum* L. (Linoideae DC.) Calyx 5 sepalus. Corolla 5 petala. Capsula sub-  
globosa.
267. *L. catharticum* L. Purgir-Flachs. Caulis superne dichotomus. Ⓛ. 6—7.  
Ad nemus Schönsfeldense.
268. *L. usitatissimum* L. Lein. Colitur.
134. *Drósera* L. (Droseraceae DC.) Calyx 5 partitus. Corolla 5 petala, marcescens.  
Capsula ovata, unilocularis.
269. *D. rotundifolia* L. Rundblättriger Sonnentau. Petioli pilosi. 4. 6—7.  
In pratis muscosis silvae Freiheit.
270. *D. anglica* L. Langblättriger S. Petioli glabri, recti. 4. 6—7. In iis-  
dem locis.
135. *Armeria* Willd. (Plumbagineae Juss.) Flores capitati. Calyx monosepalus,  
scariosus, 5 dentatus. Corolla 5 petala.
271. *A. vulgaris* Willd. Grasnelke. 4. 7—8. In agris frequens.

Ord. VI. Polygynia.

136. *Myosurus* L. (Ranunculaceae Juss.) Calyx 5 sepalus. Corolla 5 petala. Capsula triquetra.  
272. *M. minimus* L. Mäuseschwanz. ♂. 6. Inter segetes.

Cl. VI. Hexandria.

Ord. I. Monogynia.

I. *Flos incompletus.*

A. *Perigonium glumaceum.*

137. *Juncus* L. (Juncaceae Rob. Br.) Perigonium 6 partitum. Stigmata tria, filiformia. Capsula trilocularis, polysperma. Folia teretiuscula.  
Sect. 1. Folia nulla, horum loco vaginae. Cyma lateralis.  
273. *J. conglomeratus* L. Knauelblütige Simse. Cyma conglomerata. 4. 7. In fossis frequens.  
274. *J. effusus* L. Bielblütige S. Cyma effusa. 4. 7. In paludibus prope Jacobsdorf.  
275. *J. glaucus* Ehrh. Blaugrüne S. Cyma explicata. 4. 7. In fossis prope Müskendorf.  
276. *J. filiformis* L. Faden-S. Cyma pauciflora. 4. 6. In paludibus silvae Freiheit.  
Sect. 2. Calami foliati. Cyma terminalis e fasciculis composita.  
277. *J. lampocarpus* Ehrh. Glanzfrüchtige S. Calamus compressus. 4. 7—8.  
In pratis ad ripas lacus Lockmann.  
Sect. 3. Calami foliati. Flores solitarii.  
278. *J. squarrosum* L. Sparrige S. Folia rigidissima, glauca. 4. 7. Ad marginem paludis Negenpfuhl.  
279. *J. bufonius* L. Knoten-S. Folia setacea. ♂. 7—8. In pratis humidis prope Dunkershagen, Zandersdorf.  
138. *Luzula* L. (Juncaceae Rob. Br.) Perigonium 6 partitum. Stigmata tria filiformia. Capsula unilocularis, trisperma. Folia plana.  
280. *L. vernalis* DC. Luzula pilosa Willd. Frühling-Hainsimse. 4. 5. In collibus et silvis frequens.  
281. *L. albida* DC. Weißliche ♀. Cyma composita, expansa. 4. 6—7. In silva post Hohenkamp.

282. *L. campestris* DC. Feld- $\mathfrak{H}$ . Cyma subsimplex. Flores capitato-aggregati.  
4. 5. In pratis et collibus post villam Schützenhaus.
283. *L. multiflora* Lejeune. Vielblütige  $\mathfrak{H}$ . Pedunculi erecti. 4. 5. In locis  
graminosis siccis prope Sandkrug.
139. *Acorus* L. (Aroideae Juss.) Spadix cylindraceus, undique floribus tectus. Pe-  
rigonium 6phyllum. Capsula baccata, triangularis.
284. *A. Calamus* L. Ralms. 4. 6—7. In paludibus prope Dunkershagen.  
B. Perigonium corollinum.  
a. Perigonium superum.
140. *Galanthus* L. (Amaryllideae Rob. Br.) Perigonium 6phyllum; phylla externa  
lanceolata, interna breviora.
285. *G. nivalis* L. Schneeglöckchen. 4. 3—4. In hortis et in silva prope  
Buschmühle.  
b. Perigonium inferum, sexdentatum aut sexpartitum.
141. *Convallaria* L. (Smilacineae Rob. Br.) Perigonium campanulatum, limbo sex-  
partito. Bacca trisperma. Flores racemosi.
286. *C. majalis* L. Maiblume. 4. 5. In silva prope Buschmühle.
142. *Polygónatum* Desf. (Smilacineae Rob. Br.) Perigonium tubuloso-infundibuli-  
forme, limbo sexdentato. Bacca trisperma.
287. *P. vulgare* Redouté. Convallaria Polygonatum L. Echte Siegelblume. Pe-  
dunculi axillares, uni-rarius biflori. 4. 6. In nemore prope Hülse.
288. *P. multiflorum* Moench. Convallaria multiflora L. Vielblumige  $\mathfrak{S}$ . Pedun-  
culi axillares, bi-quinqueflori. 4. 6. In nemoribus humidis prope Zan-  
dersdorf, Buschmühle.
289. *P. verticillatum* Moench. Convallaria verticillata L. Quirlblütige  $\mathfrak{S}$ . Pe-  
dunculi axillares, multiflori. 4. 6. In silva Freiheit.
143. *Asparagus* L. (Asphodeleae Bartl.) Perigonium subcampanulatum, sexpartitum,  
deciduum. Bacca globosa, oligosperma.
290. *A. officinalis* L. Spargel. 4. 6—7. In nemore Zandersdorfsensi.  
c. Perigonium inferum, hexaphyllum.
144. *Allium* L. (Asphodeleae Bartl.) Flores capitati aut subumbellati, spatha spa-  
thisve ante anthesin inclusi. Capsula trilocularis.
291. *A. arenarium* L. Wülferslauch. Flores rosei. 4. 7. Inter segetes.
145. *Anthéricum* L. (Asphodeleae Bartl.) Flores racemosi. Filamenta filiformia.  
Capsula obtuse trigona.
292. *A. ramosum* L. Nestige Graslinie. 4. 6—7. Post villam Schützenhaus.

146. *Ornithogalum* L. (Asphodeleae Bartl.) Flores corybosi et racemosi. Filamenta basi dilatata, apice attenuata. Capsula membranacea, ovata.  
293. *O. pratense* Pers. Wiesen-Vogelmilch. Bulbi tres, liberi. 4. 5. Prope Schützenhaus.  
294. *O. luteum* L. Gelbe Vogelmilch. Bulbus solitarius. 4. 4. In hortis frequens.  
295. *O. minimum* L. Kleinste Vogelmilch. Bulbis duobus. 4. 4. In iisdem locis.

II. *Flos completus.*

147. *Berberis* L. (Berberideae Vent.) Calyx 6 sepalus, coloratus. Petala sex.  
Bacca bi-trisperma.  
296. *B. vulgaris* L. Verberie. Sonerdorn. Spinae tripartitae. 5. 6. Post Schützenhaus.

Ord. II. Trigynia.

148. *Triglochin* L. (Juncagineae Rich.) Perigonium 6 phylum. Capsula tres aut sex.  
297. *T. palustre* L. Sumpf-Dreizack. Folia semiteretia. 4. 6. Ad paludem Heerbruch.  
149. *Scheuchzeria* L. (Juncagineae Rich.) Perigonium sexpartitum. Capsulae tres, inflatae.  
298. *S. palustris* L. Sumpf-Scheuchzerie. Folia vaginis membranaceis. 4. 5—6. Prope Heinrichsthal.  
150. *Rumex* L. (Polygoneae Juss.) Perigonium 6 phylum; phylla tria interna majora, conniventia. Caryopsis triquetra.  
Sect. 1. Flores hermaphroditici vel polygami. Folia basi attenuata, rotundata vel cordata. Lapathum Tourn.  
299. *R. Nemolápathum* Ehrh. Wald-Umpfer. Valvae oblongae. 4. 7. Prope Dunkershagen.  
300. *R. Hydrolápathum* Huds. Niesen-A. Valvae triangulares, reticulato-venosa. 4. 7. Apud Regnitz Mühle.  
301. *R. aquaticus* L. Wasser-A. Valvae cordatae, sine callis. 4. 7. Prope Dunkershagen, Sandkrug.  
302. *R. obtusifolius* L. Sumpfsblättriger A. Valvae ovato-triangulares. 4. 7. Prope Jacobsdorf.  
303. *R. crispus* L. Krauser A. Folia crista, undulata. 4. 7. Ad vias frequens.  
304. *R. conglomeratus* Schreb. Knauelblütiger A. Valvae oblongae, omnes calliferae. 4. 7. Prope Sandkrug.

Sect. II. Flores dioici vel polygami. Folia hastata vel sagittata. Acetosa Tourn.

305. *R. Acetosa* L. Sauer-Ampfer. 4. 6. In pascuis frequens.

306. *R. Acetosella* L. Kleiner Sauer-Ampfer. 4. 6. In iisdem locis.

Ord. III. Polygynia.

151. *Alisma* L. (Alismaceae Rich.) Calyx 3 sepalus. Corolla 3 petala. Capsulae uniloculares, monospermae.

307. *A. Plantago* L. Froschlöffel. Flores rosei. 4. 6—7. Prope Buschmühle.

Cl. VII. *Heptandria*.

Ord. I. Monogynia.

152. *Aesculus* L. (Hippocastaneae DC.) Calyx 5 dentatus. Corolla 5 petala, inaequalis. Capsula echinata, coriacea.

308. *Ae. Hippocastanum* L. Noß-Kastanie. h. 6. Prope Schützenhaus.

153. *Trifentalis* L. (Primulaceae Vent.) Calyx 7 partitus. Corolla 7 petala, rotata. Capsula unilocularis, polysperma.

309. *T. europaea* L. Siebenstern. Dreifaltigkeitsblümchen. 4. 6. In nemoribus frequens.

154. *Calla* L. (Aroideae Juss.) Spatha monophylla. Spadix cylindricus, undique stylis staminibusque tectus. Bacca carnosa, oligosperma.

310. *C. palustris* L. Sumpf-Schlangenfrucht. 4. 6. In paludibus frequens.

Cl. VIII. *Octandria*.

Ord. I. Monogynia.

I. Flores incompleti.

155. *Daphne* L. (Thymelae Juss.) Perigonium infundibuliforme, marescens, limbo 4 partito. Drupa globosa, monosperma.

311. *D. Mezereum* L. Seidelbast. Kesterhals. h. 3—4. Prope Buschmühle.

II. Flores completi.

A. Corolla monopetala.

156. *Calluna* Salisb. (Ericae Juss.) Calyx 4 sepalus. Corolla 4 fida, infera. Capsula 4 locularis, 4 valvis.

312. *C. vulgaris* Salisb. Haidefrucht. Flores racemosi, rosei. h. 8. In silvis ubique.

157. *Vaccinium* L. (Vaccineae DC.) Calyx 4dentatus. Corolla urceolata vel campanulata, limbo 4dentato vel -fido. Bacca globosa.
313. *V. Myrtillus* L. Blaubeere. ♂. 4—5. In silvis frequens.
314. *V. Vitis idaea* L. Preusselbeere. Folia sempervirentia, coriacea, supra lucida, subtus resinoso-punctata. ♂. 5. In pinetis frequens.
315. *V. uliginosum* L. Trunkelbeere. ♂. 4—5. In silva Freiheit.
158. *Oxycoccus* Pers. (Vaccineae DC.) Calyx 4fidus. Corolla ad basin 4partita, lacinias post anthesin reflexis. Bacca 4locularis, polysperma.
316. *O. palustris* Pers. *Vaccinium Oxycoccus* L. Moosbeere. Flores rosei. ♂.  
6. In paludosis frequens.

B. Corolla tetrapetala.

159. *Epilobium* L. (Onagraceae Juss.) Calycis tubus brevis, limbus 4partitus. Corolla calyci inserta. Capsula tetragona.
- Sect. 1. Chamaenerion. Folia sparsa. Flores explanati. Stamina ex basi conniventia-declinata.
317. *E. angustifolium* L. Schmalblättriges Weidenröschen. Racemus terminalis.  
4. 7. Prope Hohenkamp.
- Sect. 2. Lysimachion. Folia inferiora opposita, superiora alterna. Flores infundibuliformes. Stamina erecta.
318. *E. hirsutum* L. Rauhaariges W. Caulis pilosus. Corolla magna, rosea.  
4. 7—8. Ad Buschmühle.
319. *E. parviflorum* Schreb. Kleinblumiges W. Caulis villosus. 4. 6—7. Ad Walkmühle.
320. *E. montanum* L. Berg-W. Stigma 4fidum. 4. 6. Prope Wilhelminenthal.
321. *E. palustre* L. Sumpf-W. Stigma clavatum. 4. 7. Ad Schützenhaus.
322. *E. roseum* Schreb. Rosenfarbenes W. Stigma elongato-clavatum. 4. 7. In iisdem locis.
323. *E. tetragonum* L. Vierkantiges W. Caulis tetragonus. 4. 7. Prope Dundershagen.
324. *E. pubescens* Roth. Weichhaariges W. Corolla parva dilute violacea. 4. 7. Prope Sandkrug.
160. *Oenothera* L. (Onagraceae Juss.) Calyx tubulosus; limbus 4partitus. Capsula cylindrica.
325. *O. biennis* L. Nachtfarze. Caulis herbaceus, villoso-hispidus. ♂. 6. Prope Gemel.

Ord. II. Trigynia.

161. *Polygonum* L. (Polygoneae Juss.) Perigonium corollinum, 4—5 fidum. Nux perigonio tecta.

Sect. 1. *Bistorta* Tourn. Caulis simplicissimus monostachyus. Styli tres.

326. *P. Bistorta* L. Ritter-Knöterich. Flores rosei. 4. 6. Prope Schützenhaus.

Sect. 2. *Persicaria* Tourn. Caulis ramosus, ramis monostachyis. Stamina quatuor—octo. Styli duo—tres.

327. *P. Amphibium* L. Wässer-K. Flores purpurei. 4. 6. In locis humidis.

328. *P. Persicaria* L. Gemeiner Knöterich. Folia saepe nigro maculata. ⊖. 7 8. In locis humidis frequens.

329. *P. Hydropiper* L. Scharfer K. Ochreae campanulatae, truncatae, ciliatae. ⊖. 7—8. Ad paludem Heerbruch.

330. *P. minus* Huds. Kleiner K. Ochreae adpresso pilosae. ⊖. 6—8. Ad vias.

Sect. 3. *Avicularia* Meisn. Flores axillares. Stigmata tria, subsessilia.

331. *P. aviculare* L. Vogel-Knöterich. Caulis procumbens. ⊖. 7. Ad vias frequens.

Sect. 4. *Helxine* DC. Flores axillares, fasciculati. Stylus unicus, brevis, stigmate unico trilobo. Caulis volubilis.

332. *P. Convolvulus* L. Winden-Knöterich. ⊖. 7. In agris frequens.

333. *P. dumetorum* L. Heck-Knöterich. ⊖. 7. In dumetis prope Buschmühle.

Sect. 5. *Fagopyrum* Tourn. Flores racemosi, racemi paniculati vel corymbosi, et terminales et axillares. Styli tres, brevissimi.

334. *P. Fagopyrum* L. Buchweizen. ⊖. 7. Colitur.

Ord. III. Tetragynia.

162. *Paris* L. (Smilacinae Rob. Br.) Calyx 4 sepalus. Corolla 4 petala. Filamenta subulata. Bacca 4 locularis.

335. *P. quadrifolia* L. Einbeere. Folia quaterna. 4. 6. In silva prope Buschmühle.

163. *Adoxa* L. (Caprifoliaceae Bartl.) Perigonium rotatum, 4—5 lobum. Capsula baccata.

336. *A. Moschatellina* L. Bisamkraut. Folia ternata. 4. 5. Ad alnorum radices prope Dunkershagen.

Cl. IX. *Enneandria.*

Ord. I. Hexagynia.

164. *Bütomus* L. (Butomeae Rich.) Perigonum 6 phyllum, corollinum; phylla tria interiora staminifera.  
337. *B. umbellatus* L. Blumenbinse. Flores rosei. 4. 7. Prope Schützenhaus.

Cl. X. *Decandria.*

Ord. I. Monogynia.

A. *Corolla monopetala.*

165. *Andrómeda* L. (Ericae Juss.) Calyx 5 partitus. Corolla ovata; limbus 5 fidus, laciñiis reflexis. Capsula 5 locularis.  
338. *A. polifolia* L. Poleiblättrige Andromeda. Folia margine revoluta, subtus albida. H. 5—6. Prope silvam Freiheit.  
166. *Arctostáphylos* Adans. (Ericae Juss.) Calyx 5 partitus. Corolla urceolata, limbo 5 dentato, reflexo. Drupa pentapyrena.  
339. *A. Uva ursi* Spreng. Värentraube. Caulis fruticosus, procumbens. Folia reticulato-venosa. Flores carnei. H. 5—6. In silva prope Hülse.

B. *Corolla pentapetala, raro tetrapetala.*

167. *Monótropa* L. (Ericae Juss.) Calyx 5 sepalus. Petala carnosa, mellifera. Capsula 5 valvis.  
340. *M. Hypópitys* L. Fichtenspargel. Dhnblatt. Caulis squamosus. Flos terminalis decandrus, flores laterales octandri. 4. 7. Prope Wilhelminenthal.  
168. *Ledum* L. (Ericae Juss.) Calyx 5 dentatus. Capsula 5 locularis, in valvas 5 dehiscens.  
341. *L. palustre* L. Vorst. Flores corymbosi, albi. H. 5—6. In paludosis prope Buschmühle.  
169. *Pyróla* L. (Ericae Juss.) Calyx 5 partitus. Corolla pseudopentapetala. Capsula 5 locularis.  
Sect. 1. Stylus exsertus, rectus.  
342. *P. uniflora* L. Einblütiges Birnfraut. Scapus uniflorus. 4. 6. Prope Wilhelminenthal.  
343. *P. secunda* L. Einsichtsblütiges B. Racemus secundus. 4. 5. In eodem loco.

344. *P. minor* L. Kleines B. Corolla globoso - campanulata. 4. 6. Post villam Schützenhaus. *Bibliothek Lübeck*
- Sect. 2. Stylus exsertus, declinatus.
345. *P. rotundifolia* L. Rundblättriges B. Scapus floribus racemosis. 4. 5—6. Prope Hohenkamp.
346. *P. chlorantha* L. Grünblütiges B. Racemus pauciflorus. 4. 5—6. Prope Sandkrug.
170. *Chimáphila* Pursh. (Ericaceae Juss.) Calyx 5 fidus. Corolla pseudopentapetala. Capsula 5 locularis, apice dehiscens.
347. *Ch. umbellata* Nuttal. Wintergrün. Flores rosei. 4. 7. Prope Buschmühle.
- Ord. II. Digynia.
171. *Chrysoplénium* L. (Saxifrageae Juss.) Perigonum corollinum, 4—5 lobum. Capsula birostris. Flores cum soliis floralibus corymbum aureum exhibent.
348. *Ch. alternifolium* L. Wechselblättriges Mägkraut. 4. 4. Prope Dunkershagen.
349. *Ch. oppositifolium* L. Parblättriges M. 4. 4. In eodem loco, sed rarius.
172. *Saxífraga* L. (Saxifrageae Juss.) Calyx 5 fidus. Corolla 5 petala. Capsula birostris.
350. *S. granulata* L. Wurzelkörniger Steinbrech. Radix granulata. 4. 5. Prope Schützenhaus.
173. *Gypsóphila* L. (Caryophylleae Juss.) Calyx campanulatus, angulatus, 5 fidus. Corolla 5 petala. Capsula unilocularis.
351. *G. muralis* L. Mauer-Gesäkraut. Petala dilute purpurea, venis saturatioribus. ♂. 7. In campis prope Berglau.
174. *Saponária* L. (Caryophylleae Juss.) Calyx tubulosus, 5 dentatus. Capsula cylindrica.
352. *S. officinalis* L. Gemeines Seifenkraut. Flores corymbosi, albo - rubentes. 4. 6—7. In agris prope Zandersdorf.
175. *Diánthus* L. (Caryophylleae Juss.) Calyx tubulosus, 5 dentatus, basi squamis imbricatis suffultus. Capsula oblonga.
- Sect. 1. Armeriastrum Ser. Flores capitati vel subaggregati. Petala dentata vel subintegerrima, carnea vel purpurea.
353. *D. Carthusianorum* L. Karthäuser-Nelke. 4. 6. In campis prope Zandersdorf.
354. *D. prolifer* L. Sprossende N. ♂. 6—7. In collibus prope Niesewanz.

Sect. 2. *Caryophyllum* Ser. Flores solitarii vel paniculati. Petala dentata.  
355. *D. deltoides* L. Delta-*M.* Petala inciso-dentata, barbata. 4. 6—8. Ad viam stratam prope Sandkrug.

Sect. 3. *Tunica* Scop. Flores solitarii. Petala laciñiata.  
356. *D. arenarius* L. Sand-*M.* Petala multifida. In agris prope Heinrichsthal.

176. *Scleranthus* L. (Paronychia St. Hilaire.) Perigonium monophyllum; limbus 4—5 partitus. Caryopsis.

357. *S. annuus* L. Jähriger Knauel. Flores subdecandri. ♂. 6—7. Inter setetes frequens.

358. *S. perennis* L. Ausdauernder K. Flores decandri. 4. 6—7. In campis arenosis prope Müskendorf.

Ord. III. Trigynia.

177. *Silene* L. (Caryophylleae Juss.) Calyx tubulosus, 5 dentatus. Petala bifida. Capsula polysperma.

359. *S. chlorantha* Ehrh. Cucubalus chloranthus Willd. Grünblumiges Leimkraut. Flores racemosi, secundi. 4. 6—7. Ad Buschmühle.

360. *S. nutans* L. Hängendes L. Flores secundi, sub anthesin nutantes. 4. 6—7. In collibus prope Hohenkamp.

361. *S. inflata* Smith. Cucubalus Behen L. Aufgeblasenes L. 4. 6—7. Prope Schützenhaus, Gigel.

362. *S. Otites* Pers. Cucubalus Otites L. Ohrlöffel-L. Caulis pubescens. Flores paniculati, dioici. 4. 6—8. In collibus prope Niesewanz.

178. *Cucubalus* L. (Caryophylleae Juss.) Calyx campanulatus, 5 dentatus. Petala bifida. Bacca unilocularis, polysperma.

363. *C. bacciferus* L. Taubenkopf. Bacca globosa. 4. 7—8. Prope Buschmühle.

179. *Arenaria* L. (Caryophylleae Juss.) Calyx 5 sepalus. Petala integra. Capsula polysperma.

364. *A. trinervia* L. Dreinerviges Sandkraut. Folia trinervia. ♂. 6. Prope Walkmühle.

365. *A. serpyllifolia* L. Quendelblättriges S. Folia glanduloso-pilosa. ♂ et ♂. 6—7. In agris prope Gigel.

366. *A. rubra* L. Rothes S. Folia subcarnosa. ♂. 6—7. In agris prope Wilhelminenthal.

180. *Stellaria* L. (Caryophylleae Juss.) Calyx 5 sepalus. Petala bifida. Capsula sexvalvis, polysperma.

Sect. 1. Folia ovata, cordata.

367. *St. media* Smith. Alsine media L. Vogelmeier. ♂. 4—9. In hortis olitoriis ubique.

368. *St. nemorum* L. Wald-Sternkraut. 4. 6—7. Prope Buschmühle.

Sect. 2. Folia lanceolata, linearia.

369. *St. Holostea* L. Großes St. Caulis tetragonus. 4. 5. Prope Dunkershagen.

370. *St. palustris* Retz. St. glauca With. Meergrünes St. 4. 6. Prope Buschmühle.

371. *St. graminea* L. Grasartiges St. 4. 6—7. Prope Zandersdorf.

372. *St. Alsine* Hoffm. Meierartiges St. Caules decumbentes. ♂. 6—7. Post villam Schützenhaus.

373. *St. crassifolia* Ehrh. Dickblättriges St. 4. 6—7. In pratis prope Sandkrug.

Ord. IV. Pentagynia.

181. *Oxalis* L. (Oxalideae DC.) Calyx 5 sepalus. Corolla 5 petala; petala unguiculata. Capsula pentagona.

374. *O. Acetosella* L. Sauer-, Hasenklee. 4. 4—5. Prope Dunkershagen.

182. *Sedum* L. (Crassulaceae DC.) Calyx 5 partitus, marcescens. Corolla 5 petala. Squamae 5 nectariferae basi petalorum. Capsulae.

375. *S. Telephium* L. Fette Henne. 4. 8. Post villam Schützenhaus.

376. *S. acre* L. Mauer-Pfeffer. 4. 6—8. In muris et agris ubique.

377. *S. sexangulare* L. Echseckiger M. 4. 6—8. Prope Gigel.

183. *Agrostemma* L. (Caryophylleae Juss.) Calyx tubulosus, decemcostatus, 5 dentatus, coriaceus. Petala integra. Capsula.

378. *A. Githago* L. Korn-Made. 4. 6. Inter segetes frequens.

284. *Lychnis* L. (Caryophylleae Juss.) Calyx tubulosus, 5 dentatus. Petala plurimque bifida. Capsula.

Sect. 1. Viscaria. Calyx arctus; petala integra; capsula 5 locularis.

379. *L. Viscaria* L. Pechnelke. Caules viscosi. 4. 5—6. In graminosis siccis frequens.

Sect. 2. Melandrium. Calyx Iaxus, fructifer inflatus; petala bipartita; capsula unilocularis.

380. *L. dioica* L. Gemeine Lichtnelke. Caulis villosus. Flores dioici, albi. ♂. 5—6. In agris frequens.

381. *L. diurna* Sibth. *L. silvestris* Hoppe. Tagblühende ♀. Petala rubella. 4.  
5—6. Prope Dunkershagen.
382. *L. Flos cuculi* L. Rukufē♀. Petala quadrifida. 4. 5—7. In pratis.
185. *Cerastium* L. (Caryophylleae Juss.) Calyx 5 partitus. Petala bipartita. Capsula oblonga.  
Sect. 1. Corolla calycem superans.
383. *C. aquaticum* L. Wasser-Hornkraut. Caules villoso-viscosi. 4. 6—7.  
Prope Dunkershagen.
384. *C. arvense* L. Acker-H. Flores dichotomo-paniculati. 4. 5—6. In agris.  
Sect. 2. Corolla calycem aequans aut minor.
385. *C. vulgatum* Pers. Gemeines H. ♂. 5—6. In agris.
386. *C. semidecandrum* L. Fünfzähniges H. 4. 5—6. In agris arenosis.
186. *Spérgula* L. (Caryophylleae Juss.) Calyx 5 partitus. Petala integra. Capsula subglobosa. Flores albi.
387. *S. arvensis* L. Acker-Sparf. Folia verticillata. ♂. 6—7. In agris frequens.
388. *S. nodosa* L. Knotiger S. Folia opposita. 4. 7. Prope Gigel.

## Cl. XI. *Dodecandraia.*

### Ord. I. Monogynia.

187. *Asarum* L. (Aristolochiae Juss.) Perigonium corollinum, trifidum. Capsula.
389. *A. europaeum* L. Haseltwurz. Folia bina, reniformia. 4. 4—5. In nemore Zandersdorfseni.
188. *Lythrum* L. (Lythrariae Juss.) Calyx cylindricus. Corolla 6 petala. Stamina alterna longiora. Capsula calyce vestita.
390. *L. Salicaria* L. Blutfraut. Flores dodecandi. 4. 7. Ad Dunkershagen, Zandersdorf.

### Ord. II. Digynia.

189. *Agrimonia* L. (Rosaceae Juss.) Calyx turbinatus, uncinato-setosus, fauce clausa, limbo 5 fido. Corolla 5 petala. Ovaria duo.
391. *A. Eupatoria* L. Odernennig. Flores spicati, lutei. 4. 7. Ad Dunkershagen.

Ord. III. Trigynia

190. *Euphorbia* L. (Euphorbiaceae Juss.) Periclinium campanulatum, 4—5 dentatum, appendiculis glandulosis, lunatis vel bicornibus. Flores masculi in calathidium circa unicum femineum aggregati. Capsula tricocca.

Sect. 1. *Tithymalus* Koch. Folia exstipulata. Appendices subreniformes, non vero lunatae, neque bicornes.

392. *E. helioscopia* L. Sonnenwenden-Wolfsmilch. Umbella 5 radiata. ♂. 6. Ad Zandersdorf.

Sect. 2. *Esula* Roep. Folia exstipulata. Appendices lunatae vel bicornes.

393. *E. Esula* L. Esels-W. Umbella multiradiata. Appendices bicornes. ♀. 6. Prope Dunkershagen.

394. *E. Cyparissias* L. Cypressen-W. Umbella multiradiata. Appendices bicornes. 4. 5—6. Prope Grunsberg.

395. *E. Peplus* L. Garten-W. Umbella triradiata. Appendices bicornes. ♂. 7—9. In agris cultis frequens.

Ord. IV. Dodecagynia.

191. *Sempervivum* L. (Crassulaceae DC.) Calyx multipartitus. Corolla polypetala. Petala plerumque basi coalita. Squamae nectariferae.

Sect. 1. Corolla stellato-expansa.

396. *S. tectorum* L. Gemeines Häuslauch. Corolla dodecapetala. ♀. 7—8. In tectis oppidi Friedland.

Sect. 2. Corolla erecto-campanulata.

397. *S. soboliferum* Sims. Sprossendes H. Corolla hexapetala. ♀. 7—8. In sepulcreto catholicorum.

Cl. XII. *Icosandria*.

Ord. I. Monogynia.

192. *Prunus* L. (Amygdaleae Juss.) Calyx campanulatus, limbo 5 fido. Corolla 5 petala. Drupa.

398. *P. spinosa* L. Schlehedorf. Rami spinosi. ♂. 5. Post villam Schützenhaus,

399. *P. Padus* L. Faulbaum. Draubenzirsche. Petioli glandulosi. Flores racemosi. ♂. 5. Prope Buschmühle.

In hortis nostris coluntur:

*P. insititia* L. Krekken-Pflaume; *P. domestica* L. Ungarische Pflaume; *P. avium* L. Süßkirsche; *P. Cerasus* L. Sauerkirsche; *P. Armeniaca* L. Aprikose; *P. Persica* L. Pfirsich.

193. *Philadelphus* L. (Philadelphaea Don.) Calyx cum germine coalitus, limbo 4—5 partito. Corolla 4—5 petala. Capsula 4—5 valvis.

400. *Ph. coronarius* L. Wilder Jasmin. Pfeifenstrauch. Flores corymbosi, albi. H. 6. Prope Schützenhaus.

Ord. II. Di—Pentagynia.

194. *Sorbus* L. (Pomaceae Lindl.) Calyx urceolatus, limbo 5 partito. Corolla 5-petala. Pistilla tria. Fructus baccatus.

401. *S. Aucuparia* L. Eberesche. Quittsche. H. 5. Ad vias.

195. *Mespilus* L. (Pomaceae Lindl.) Calyx 5 fidus. Corolla 5 petala. Drupa.

402. *M. Oxyacantha* Gaertn. Crataegus Oxyacantha L. Weißdorn. Flores corymbosi, digyni, albi, antheris rubescensibus. H. 5. Prope Hülse.

403. *M. monogyna* Ehrh. Crataegus monogyna. Einsamiger Weißdorn. Flores plerumque monogyni; pedunculi villosi. H. 5. Prope Schützenhaus.

196. *Pirus* L. (Pomaceae Lindl.) Calyx 5 partitus, superus. Corolla 5 petala. Pistilla quinque. Pomum.

404. *P. communis* L. Birnbaum. H. 5. Prope Pollnitz.

405. *P. Malus* L. Apfelbaum. H. 5. In silva prope Buschmühle.

197. *Spiraea* L. (Rosaceae Juss.) Calyx 5 fidus. Corolla 5 petala. Capsulae di-hexaspermae.

406. *S. Ulmaria* L. Sumpf-Spiersstaude. 4. 6—7. Ad fossam post Schützenhaus.

407. *S. Filipendula* L. Knollige S. Radix tuberosa. 4. 6—7. In pratis ad Wilhelminenthal.

Ord. III. Deca—Polygynia.

A. Calyx quinquefidus, lacinia uniserialibus.

198. *Rosa* L. (Rosaceae Juss.) Calycis tubus ventricosus; limbus 5 fidus. Nuces plurimae, calycis tubo inclusae.

408. *R. canina* L. Hundsröse. Aculei falcati, compressi. Flores dilute carnei. H. 6. Prope villam Schützenhaus.

409. *R. tomentosa* Smith. *R. villosa* L. Filzige Rose. Folia utrinque tomentosa. Aculei recti, compressi. Flores carnei. H. 6. Prope Dunkershagen.
199. *Rubus* L. (Rosaceae Juss.) Petala 5, calyci inserta. Receptaculum conicum, baccis tectum.  
Sect. 1. Frutescentes.
410. *R. Idaeus* L. Himbeere. Fructus rubri. H. 6. In silva prope Buschmühle.
411. *R. fruticosus* L. Brombeere. Fructus nigrū, nitidi. H. 6—7. Ad sepes prope Hülse.
412. *R. caesius* L. Blaubestäubte Brombeere. Caulis procumbens, caesio-pruinosis. Fructus caesio-pruinosi. H. 6—7. Ad Hohenkamp.
- Sect. 2. Herbacei.
413. *R. saxatilis* L. Felsen-Brombeere. Caulis flagellis reptantibus, inermis, pilosus. Fructus rubri. 4. 6. In silvaticis ad Regnitz Mühle.
414. *R. Chamaemorus* L. Zwerg-Brombeere. Caulis erectus, simplex, inermis. Pedunculi solitarii, uniflori. 4. 6. In paludosis ad Neue Welt.
- B. Calyx 8—10fidus, laciinis biserialibus, exterioribus appendiculiformibus.
200. *Fragaria* L. (Rosaceae Juss.) Calyx 10fidus, laciinis alternis minoribus. Corolla 5 petala. Stamina numerosa, calyci adnata.
415. *Fr. vesca* L. Wald-Erdbeere. Caulis stolonifer. 4. 5. In silvis frequens.
416. *Fr. collina* Ehrh. Hügel-Erdbeere. Fructus duriusculi. 4. 5. In collibus apricis prope Hülse.
201. *Potentilla* L. (Rosaceae Juss.) Calyx 10fidus, laciinis alternis minoribus. Corolla 5 petala. Receptaculum siccum.
- Sect. 1. Flores albi.
417. *P. alba* L. Weißblühendes Fingerkraut. Caules adscendentes. 4. 5. Post Schützenhaus.
418. *P. Fragariastrum* Ehrh. Erdbeer-ʒ. Caules procumbentes. 4. 5. Prope Wilhelminenthal.
- Sect. 2. Flores lutei.
- a, Folia pinnata.
419. *P. anserina* L. Gänse-ʒ. Caules repentes. 4. 5. In pascuis frequens.
420. *P. supina* L. Niedriges ʒ. Caules ramosi. 4. 7—8. Prope Walkmühle.
- b, Folia digitata.
421. *P. recta* L. Grades ʒ. Caulis erectus, hirsutus. 4. 6. In silvaticis ad Hülse.

422. *P. argentea* L. Silberweisses ♂. Caulis adscendens. 4. 6. In locis apri-  
cisis frequens.
423. *P. reptans* L. Kriechendes ♂. Caules flagelliformes. 4. 6. Prope villam  
Schützenhaus.
424. *P. opaca* L. Dunkles ♂. Petala retusa, calycem aequantia. 4. 6. Prope  
Hülfe.
425. *P. verna* L. Frühlings-♂. 4. 4—5. In collibus post Schützenhaus.
426. *P. cinerea* Chaix. Graublättriges ♂. Caules decumbentes. Petala calyce  
duplo longiora. 4. 4—5. Prope Niesewanz.
427. *P. Güntheri* Pohl. Günther's ♂. Caules decumbentes, villoso-tomentosi. 4.  
5—6. In locis arenosis prope Kl. Konitz.
202. *T tormentilla* L. (Rosaceae Juss.) Calyx 8 fidus, laciniis alternis minoribus.  
Corolla 4 petala. Receptaculum siccum, sericeum.
428. *T. erecta* L. Aufrechte Tormentille. Caules erectiusculi. 4. 6—7. In  
silvaticis ad Dunkershagen.
429. *T. reptans* L. Kriechende T. Caules decumbentes. Folia ternata, rarius quin-  
nata. 4. 6—7. Ad Buschmühle.
203. *Geum* L. (Rosaceae Juss.) Calyx 10 fidus, laciniis alternis minoribus. Co-  
rolla 5 petala. Receptaculum siccum.
430. *G. rivale* L. Wasser-Benediktenwurz. Flores nutantes, clausi. Calyx ob-  
scure sanguineus. 4. 5—6. Ad Dunkershagen.
431. *G. urbanum* L. Wahre B. Flores erecti, aperti, flavi. 4. 6. Ad Busch-  
mühle.
204. *Cómarum* L. (Rosaceae Juss.) Calyx coloratus 10 fidus, laciniis alternis mino-  
ribus. Corolla 5 petala, calyce minor. Receptaculum spongiosum.
432. *C. palustre* L. Blutauge. Flores terminales. 4. 7. In paludosis frequens.

Cl. XIII. *Polyandria.*

Ord. I. Monogynia.

A. *Corolla tetrapetala.*

205. *Actaea* L. (Ranunculaceae Juss.) Calyx 4 sepalus, coloratus.

433. *A. spicata* L. Christophsraut. 4. 5. In silva ad Buschmühle.

206. *Chelidónium* L. (Papaveraceae Juss.) Calyx disepalus, caducus. Capsula si-  
liquaeformis.

434. *Ch. majus* L. Schößkraut. 4. 5—9. Ad muros frequens.
207. *Papáver* L. (Papaveraceae Juss.) Calyx disepalus, caducus. Capsula sub stigmate poris dehiscaens.
435. *P. Rhoeas* L. Klatschrosen-Mohn. Caulis multiflorus. Ⓛ. 5—6. Inter segetes.
436. *P. dubium* L. Zweifelhafter Mohn. Pili caulinis patentibus, peduncularum ad pressi. Capsula oblongo-clavata. Ⓛ. 5—6. In iisdem locis.
437. *P. Argemone* L. Acker-Mohn. Capsula elongato-clavata. Ⓛ. 5—6. In agris.
438. *P. somniferum* L. Garten-Mohn. Colitur.

B. *Corolla pentapetala.*

208. *Helianthemum* Tourn. (Cistineae DC.) Calyx 3- aut 5 sepalus, sepalis duobus minoribus, raro majoribus. Capsula.
439. *H. vulgare* Gaertn. Sonnenröschen. Caulis decumbens. Flores flavi. ℥. 6—7. In nemore Louisenhöhe ad Schlochau.
209. *Tilia* L. (Tiliaceae Kunth.) Calyx 5 sepalus. Capsula coriacea.
440. *T. grandifolia* Ehrh. Großblättrige Linde. Corymbi 2—4 flori. ℥. 7. Ad vias.
441. *T. parviflora* Ehrh. Kleinblättrige L. Corymbi 5—9 flori. ℥. 7. In iisdem locis.

C. *Corolla polypetala.*

210. *Nymphaea* L. (Nymphaeaceae Juss.) Calyx 4-, rarius 5 sepalus, intus coloratus, Filamenta petaloidea.
442. *N. alba* L. Weiße Teichrose. 4. 7. In stagno Negenpfuhl.
211. *Nuphar* Smith. (Nymphaeaceae Juss.) Calyx 5—6 sepalus, coloratus. Petala 5—19, dorso fovea nectarifera praedita.
443. *N. luteum* Smith. Gelbe Seerose. Mummel. 4. 7. In stagnis frequens.

Ord. II. Trigynia.

212. *Delphinium* L. (Ranunculaceae Juss.) Calyx 5 sepalus, corollinus; sepulum superius calcaratum. Petala 4, 2 superiora calcarata.
444. *D. Consolida* L. Rittersporn. Flores azurei. Ⓛ. 6. In agris frequens.
213. *Aconitum* L. (Ranunculaceae Juss.) Calyx 5 sepalus, corollinus; sepulum superius fornicateum. Petala 5, 2 superiora cuculliformia, nectarifera.
445. *A. variegatum* L. Langhelmiger Eisenhut. Flores saturate coeruleo-violacei. 4. 7—8. In silvaticis prope Gemel.

Ord. III. Pentagynia.

214. *Aquilegia* L. (Ranunculaceae Juss.) Calyx 5 sepalus, petaloideus. Petala 5 cyathiformia, basi in calcar cavum producta. Capsula.  
446. *A. vulgaris* L. Ueberlet. Flores cernui, violacei. 4. 6. In silva Freiheit.

Ord. IV. Polygynia.

*A. Flos incompletus.*

215. *Hepatica* Dill. (Ranunculaceae Juss.) Involucrum calyciforme. Perigonium corollinum, 6—9 phylum.  
447. *H. triloba* DC. Leberblümchen. Scapi uniflori. 4. 4—5. In nemoribus frequens.  
448. *Pulsatilla* C. Bahl. (Ranunculaceae Juss.) Involucrum triphyllum, a flore remotum, digitato-partitum, basi in vaginam concretum. Perigonium 6-phyllum, corollinum.  
449. *P. pratensis* Mill. Anemone pratensis L. Schwarze Rüchenschelle. Flos nutans; perigonii phylla campanulato-commixta, apice revoluta, atro-purpurea. 4. 4—5. Prope silvam Freiheit.  
450. *P. vulgaris* Mill. Anemone Pulsatilla L. Gemeine R. Caulis villosissimus. Flos erectus; perigonii phylla apice recta, violacea. 4. 4—5. In eodem loco.  
451. *P. vernalis* Mill. Anemone vernalis L. Frühlings-R. Flos subnutans; perigonii phylla apice recta, extus purpurascens, intus albida. 4. 4—5. In eodem loco.  
452. *P. patens* Mill. Anemone patens L. Offenstehende R. Flos suberectus, extus villosus; perigonii phylla apice recta, atro-violacea. 4. 4—5. In pineto prope Buschmühle.  
217. *Anemone* L. (Ranunculaceae Juss.) Perigonium 3—6 phylum.  
453. *A. silvestris* L. Wald-Anemone. Perigonium 5 phylum, extus villosum, album. 4. 6. Prope Buschmühle.  
454. *A. nemorosa* L. Busch-A. Perigonium hexaphyllum, album, extus saepe roseum. 4. 4—5. Prope Dunkershagen.  
455. *A. ranunculoides* L. Ranunkel-A. Perigonium 5 phylum, flavum. 4. 4—5. In eodem loco.  
218. *Thalictrum* L. (Ranunculaceae Juss.) Perigonium 4—5 phylum, corollinum.  
456. *Th. minus* L. Kleine Wiesen-Rute. Caulis striatus. Flores subumbellati, cernui, slavescentes. 4. 6—7. Prope silvam Freiheit.

456. *Th. flavum* L. Gelbe Wiesen-Raute. Caulis sulcatus. Flores aggregati erecti, flavi. 4. 6. Prope Hülse.
457. *Th. aquilegifolium* L. Alkeleiblättrige W. Flores purpurascentes. 4. 5—6. Ad Dunkershagen.
458. *Th. angustifolium* L. Schmalblättrige W. Caulis sulcatus. Flores nutantes, flavi. 4. 7. In agris prope Schönfeld.
219. *Caltha* L. (Ranunculaceae Juss.) Perigonium corollinum, 5 phylum. Folliculi oblongi, compressi.
459. *C. palustris* L. Röhrlume. 4. 4. In pratis frequens.

B. *Flos completus.*

220. *Trollius* L. (Ranunculaceae Juss.) Calyx polysepalus, corollinus. Corolla 5-petala aut polypetala, parva.
460. *T. europaeus* L. Regel-Ranunkel. Flores globosi, speciosi. 4. 6. Ad villam Hülse.
221. *Ranunculus* L. (Ranunculaceae Juss.) Calyx 5 sepalus. Petala 5, ad unguem sovea nectarifera, nuda vel squamula tecta. Carpella nucamentacea.  
Sect. 1. Batrachium DC. Petala alba, ungue flavo; sovea nectarifera nuda. Plantae aquatice submersae vel natantes. Carpella transverse rugoso-striata.
461. *R. aquatilis* L. *R. heterophyllum* Wigg. Wasser-Hahnenfuß. Caules nataentes. 4. 6. In stagno Heerbruch.
462. *R. fluitans* Lam. Schwimmender H. Folia omnia submersa. 4. 6. Ad Buschmühle.  
Sect. 2. *Ranunculus* DC. Petala flava; sovea nectarifera squamula tecta. Carpella levia.

α. *Folia integra.*

463. *R. Flammula* L. Schmalblättriger H. 4. 6. In pratis humidis frequens.
464. *R. Lingua* L. Zungenblättriger H. 4. 6. In paludibus silvae Freiheit.
- β. *Folia palmata vel ternato-partita.*
465. *R. auricomus* L. Goldhaariger H. Petoli basi vaginantes. 4. 6. In pratis frequens.
466. *R. cassubicus* L. Kassubischer H. Petoli in vaginis inclusi. 4. 5. Ad Regnitz Mühle.
467. *R. acris* L. Scharfer H. 4. 6. Ad Dunkershagen.
468. *R. lanuginosus* L. Wolliger H. 4. 5. In silva ad Hülse.
469. *R. bulbosus* L. Knollen-H. Caulis basi bulbosus. 4. 5. In agris frequens.
470. *R. repens* L. Kriechender H. Stolones repentes. 4. 6. In agris frequens.

471. *R. sceleratus* L. Gift- $\ddot{H}$ . Caulis crassus. ○. 7. Ad Dunkershagen.
472. *R. polyanthemos* L. Vielblumiger  $\ddot{H}$ . Caulis multiflorus. 4. 5—6. Ad Sandkrug.  
Sect. 3. *Philonotis* DC. Petala flava; fovea nectarifera squamula teeta.  
Carpella granulata aut muricata.
473. *R. arvensis* L.  $\ddot{A}cker\ddot{H}$ . Caulis multiflorus. ○. 5—6. Inter segetes.
222. *Ficaria* Moench. (Ranunculaceae Juss.) Calyx trisepalus. Corolla polypetala;  
fovea nectarifera squamula destituta. Carpella oblonga, compressa.
474. *F. ranunculoides* Moench. Feigwärzenfrau. Radix grumosa. 4. 4. In  
hortis frequens.

#### Cl. XIV. *Didynamia*.

- Ord. I. *Gymnospermia*. Nuces quatuor calycis fundo immersae,
- A. Calyx aequalis.
- a, Dentes calycis acuti.
223. *Ajuga* L. (Labiatae Juss.) Cor. labium sup. sere nullum, bilobum; inf. trifidum, lobo medio maximo.
475. *A. reptans* L. Kriechender Günsel. Caulis stolonibus repentibus. 4. 5.  
Ad Dunkershagen.
476. *A. genevensis* L. Genfer Günsel. 4. 6. Prope Hülse.
477. *A. pyramidalis* L. Pyramiden-Günsel. 4. 6. Ad Buschmühle.
224. *Mentha* L. (Labiatae Juss.) Corolla insundibuliformis, 4loba; labium sup.  
emarginatum; inf. trilobum.
478. *M. silvestris* L. Wald-Münze. 4. 7. Ad Dunkershagen.
479. *M. arvensis* L.  $\ddot{A}cker\ddot{M}$ . Flores verticillati. 4. 7. In agris.
480. *M. aquatica* L. Wasser- $\ddot{M}$ . Flores verticillato-capitati. 4. 7. Prope Hülse.
225. *Pulegium* Mill. (Labiatae Juss.) Calyx bilabiatus; labium  $\frac{3}{2}$  fidum. Corolla 4loba.
481. *P. vulgare* M. *Mentha Pulegium* L. Polei-Münze. Caules repentes. Flores  
verticillati. 4. 7. Ad villam Schützenhaus.
226. *Nepeta* L. (Labiatae Juss.) Corollae labium  $\frac{3}{2}$  fidum.
482. *N. cataria* L. Katzen-Münze. 4. 7—8. Ad sepes ubique.
227. *Glechoma* L. (Labiatae Juss.) Corollae labium  $\frac{2}{3}$  lobum.
483. *G. hederaceum* L. Gundermann. 4. 4—5. Ad sepes frequens.
228. *Lamium* L. (Labiatae Juss.) Cor. labium sup. fornicatum, inf. trilobum.
484. *L. album* L. Weiße Laubnessel. Petala alba. 4. 5—6. Ad sepes frequens.

485. *L. purpureum* L. Purpur- $\delta$ . 4. 5—6. In ruderatis ubique.
486. *L. maculatum* L. Gefleckte  $\delta$ . 4. 5—8. Inter fruticeta ad Dunkershagen.
487. *L. amplexicaule* L. Stengelumfassende  $\delta$ . ○. 5—6. Ad villam Schützenhaus.
229. *Stachys* L. (Labiatae Juss.) Labium corollae sup. fornicatum; inf. tripartitum.
488. *St. palustris* L. Sumpf-Ziest. Caulis retrorsum hispidus. 4. 7—8. Prope Dunkershagen.
489. *St. silvatica* L. Wald- $\beta$ . 4. 7. Ad Buschmühle.
490. *St. arvensis* L. Acker- $\beta$ . Caulis debilis, hirsutus. ○. 7. In agris.
491. *St. germanica* L. Deutscher  $\beta$ . Caulis lanatus. ♂. 7. Ad Schönfeld.
- b, Dentes calycis aristati.
230. *Galeopsis* L. (Labiatae Juss.) Corollae labium sup. fornicatum; inf. trilobum.
492. *G. Ládanum* L.. Rosenrothe Hanfnessel. Caulis pubescens. Flores rosei. ○. 8. In agris.
493. *G. versicolor* Curt. Buntblumige  $\delta$ . Caulis hispidus. ○. 7. Ad Dunkershagen.
494. *G. pubescens* Bess. Weichhaarige  $\delta$ . Caulis sub geniculis hispidus. ○. 8. Ad Hohenkamp.
495. *G. Tetrahit* L. Gemeine  $\delta$ . Caulis sub geniculis tumidus. ○. 6—8. In agris.
231. *Galeobdolon* Smith. (Labiatae Juss.) Cor. labium sup. fornicatum, inf. tripartitum.
496. *G. luteum* Smith. Galeopsis Galeobdolon L. Goldnessel. Corolla flava. 4. 5. Ad Dunkershagen.
232. *Betonica* L. (Labiatae Juss.) Cor. labium  $1/3$  fidum, lacinia media majore.
497. *B. officinalis* L. Betonie. Calyx pilosus; corolla purpurea. 4. 7. Ad Zandersdorf.
233. *Ballota* L. (Labiatae Juss.) Cor. labium  $1/3$  partitum, lacinia media maxima.
498. *B. vulgaris* Link. *B. nigra* L. Stinknessel. Andorn. 4. 6—8. Ad se-  
pes ubique.
234. *Leonurus* L. (Labiatae Juss.) Cor. labium sup. concavum, inf. trilobum.
499. *L. Cardiaca* L. Löwenschwanz. Herzgespann. 4. 7—8. Ad Dunkershagen.
235. *Marrubium* L. (Labiatae Juss.) Cor. labium  $2/3$  lobum.
500. *M. vulgare* L. Andorn. Caules tomentosi. 4. 6—9. In ruderatis frequens.
- B. Calyx bilabiatus.
- a, Labia divisa.
236. *Origanum* L. (Labiatae Juss.) Cor. labium sup. emarginatum, inf. trilobum.
501. *O. vulgare* L. Dosten. Corolla purpurea. 4. 7. Ad Buschmühle.

237. *Clinopodium* L. (Labiatae Juss.) Flores involucro setaceo cincti. Corollae labium sup. emarginatum, inf. trifidum, lobo medio latiore.
502. *C. vulgare* L. Wirbeldost. Caulis villosus. 4. 7. Ad Hülse.
238. *Thymus* L. (Labiatae Juss.) Corollae labium sup. emarginatum, inf. trifidum.
503. *Th. Serpyllum* L. Quendel-Thymian. Caulis decumbens. 5. 6—7. In collibus.
504. *Th. Acinos* L. Steinquendel. Caulis erectus. 4. 8. Ad Schützenhaus.
239. *Prunella* L. (Labiatae Juss.) Cor. labium sup. galeatum, inf. 3fidum, lacinias obtusis.
505. *P. vulgaris* L. Brunelle. 4. 7. In pascuis frequens.
506. *P. grandiflora* Jacq. Großblumige B. Corolla calycem quadruplo superans. 4. 6—7. Ad Walkmühle.  
b, Calycis labia indiyisa.
240. *Scutellaria* L. (Labiatae Juss.) Cor. labium sup. concavum, trifidum, inf. deflexum.
507. *Sc. galericulata* L. Helmraut. Flores secundi. 4. 7. Ad Buschmühle.  
Ord. II. Angiospermia. Fructus in receptaculo solitarius.
- I. *Antherarum* *sacculi* *basi* *spinula* *instructi*.
- A. Ovarium biloculare.
- a, Calyx quadridentatus.
241. *Alectrolophus* Hall. (Scrophularinae R. Br.) Calyx ventricosus; corolla ringens.
508. *A. grandiflorus* Wallr. Rhinanthus crista galli L. Hähnenfarn. ○. 6—7. In pratis frequens.
242. *Euphrasia* L. (Scrophularinae R. Br.) Calyx cylindricus. Corolla ringens, labio  $\frac{1}{3}$  lobo.
509. *E. officinalis* L. Dößziner Augentrost. ○. 7—8. In pratis frequens.
243. *Odontites* Hall. (Scrophularinae R. Br.) Calyx tubulosus. Cor. labium  $\frac{1}{3}$  lobum,
510. *O. rubra* Pers. Euphrasia Odontites. Rother Augentrost. Racemi secundi. Corolla pallide rubra. ○. 8. Ad villam Schützenhaus.
244. *Melampyrum* L. (Scrophularinae R. Br.) Cor. labium sup. fornicatum, margine reflexo, inf. trifidum.
511. *M. arvense* L. Acker-Wachtelweizen. Bracteae roseae. ○. 6—7. Ad viam stratan.
512. *M. nemorosum* L. Hain-W. Bracteae summae violaceae aut albidae. Corolla crocea, tubo aurantiaco. ○. 6—7. Ad Dunkershagen.

513. *M. pratense* L. Wiesen-W. Corolla flava. ♂. 6—7. Ad Schützenhaus.
514. *M. sylvaticum* L. Wald-W. Flores secundi, flavi. ♂. 6—7. Ad Hohenkamp.  
b. Calyx quinquedentatus.
245. *Pedicularis* L. (Scrophularinae R. Br.) Cor. labium sup. galeatum, inf. trilobum.
515. *P. palustris* L. Sumpf-Röthelfraut. Caulis solitarius, ramosus. 4. 6. Ad Wilhelminenthal.
516. *P. sylvatica* L. Wald-Röthelfraut. Caules plurimi, fasciculati. ♂. 6. Ad Dunkershagen.
- B. Ovarium uniloculare.
246. *Lathraea* L. (Orobancheae Juss.) Calycis limbus 4 fidus. Cor. labium  $\frac{1}{3}$ .
517. *L. squamaria* L. Schuppenwurz. Caulis squamosus. 4. 4. Ad Buschmühle.
247. *Orobanche* L. (Orobancheae Juss.) Calyx disepalus. Corolla ringens.
518. *O. rubens* Wallr. Bräunliche Sommerwurz. Spica densiflora. 4. 5—6.  
Ad Walkmühle.

## II. *Antherae muticae.*

### A. Ovarium uniloculare.

248. *Limosella* L. (Scrophularinae R. Br.) Calyx 5 fidus. Cor. limbus 5 fidus.
519. *L. aquatica* L. Wasser-Schlammloßel. Pedunculi uniflori. ♂. 7—8. Ad paludem Negenfuhl.
- B. Ovarium biloculare.
249. *Linaria* Tourn. (Scrophularinae R. Br.) Calyx 5 partitus. Corolla calcarata;  
labium  $\frac{1}{3}$  lobum.
520. *L. vulgaris* Mill. Gemeines Leinfraut. Caulis ramosus. 4. 7—9. Prope Wilhelminenthal.
521. *L. Cymbalaria* Mill. Zimbelfraut. Caulis adscendens, ramosus. Flores solitarii. 4. 5—9. In ruderatis.
250. *Scrophularia* L. (Scrophularinae R. Br.) Calyx 5 fidus. Corolla subglobosa,  
5 loba.
522. *S. nodosa* L. Knotige Brauntwurz. Caulis acutangulus. 4. 6—7. Ad Dunkershagen.
523. *S. aquatica* L. Wasser-Brauntwurz. Caulis anguli alati. 4. 6—7. Prope Wilhelminenthal.

### C. Ovarium triloculare.

251. *Linnaea* Gron. (Caprifoliaceae Juss.) Calyx 5 partitus. Corolla subcampanula, 5 fida.
524. *L. borealis* Gron. Nordische Linnaea. Caulis repens. 5. 6. Ad Hohenkamp.

D. Ovarium quadriloculare.

252. *Verbena* L. (Verbenaceae Dietr.) Calyx 5 dentatus. Corollae limbus 5 lobus.  
253. *V. officinalis* L. Eisenhart. Caulis ramosus. ♂. 6—9. Ad vias.

### Cl. XV. *Tetradynamia*.

Ord. I. Siliculosae. Fructus ratione longitudinis latus et brevis.

A. Silicula non dehiscens.

253. *Neslia* Desv. (Cruciferae Juss.) Silicula subglobosa, stylo coronata, monosperma.  
256. *N. paniculata* Desv. Alyssum paniculatum Willd. Rispen-Neslie. Flores  
exigui, flavi. ♂. 6. Ad Zandersdorf.  
254. *Corónopus* Smith. (Cruciferae Juss.) Silicula a latere compressa.  
257. *C. Ruellii* Smith. Cochlearia Coronopus L. Krähenfuß. Flores albi. ♂.  
6—7. In sepulcretis.

B. Silicula dehiscens.

a, Siliculae oligospermae.

255. *Teesdália* R. Br. (Cruciferae Juss.) Petala exteriora plerumque longiora. Si-  
licula obovata.  
528. *T. nudicaulis* R. B. Iberis nudicaulis L. Nacktfingelige Teesdale. ♂. 5.  
Prope Neue Welt.

b, Siliculae polyspermae.

256. *Berteroa* Moench. (Cruciferae Juss.) Petala bifida. Silicula convexa, stylo  
coronata.  
529. *B. incana* Moench. Alyssum incanum L. Bertero. ♂. 6. In collibus frequens.  
257. *Camelina* Crantz. (Cruciferae Juss.) Silicula turgida, piriformis.  
530. *C. sativa* Crantz. Alyssum sativum Willd. Seindotter. ♂. 6. Ad Wilhel-  
minenthal.  
531. *C. dentata* Pers. Gejähnte L. ♂. 6. Inter Linum.  
258. *Draba* L. (Cruciferae Juss.) Petala bifida. Silicula plano - compressa.  
532. *D. verna* L. Hungerblümchen. Scapi multiflori. ♂. 4—5. In agris frequens.  
259. *Thlaspi* L. (Cruciferae Juss.) Filamenta edentula. Silicula dorso alata.  
533. *Th. arvense* L. Acker-Läschelfraut. ♂. 5—6. In agris frequens.  
260. *Capsella* Moench. (Cruciferae Juss.) Silicula obcordato - triangularis, a latere  
compressa.  
534. *C. bursa pastoris* Moench. Thlaspi bursa pastoris L. Hirtentasche. ♂. 5—  
8. In agris.

261. *Armoracia* Fl. Wett. (Cruciferae Juss.) Silicula subglobosa.  
535. *A. rusticana* Fl. Wett. Cochlearia Armoracia L. Meerrettig. 4. 6. Ad sepes.  
262. *Lepidium* L. (Cruciferae Juss.) Silicula ovata, stylo coronata.  
536. *L. ruderale* L. Schutt-Schafkresse. ♂. 6—7. Ad sepes.  
537. *L. campestre* R. Br. Feld-Schafkresse. Folia amplexicaulia. ♂. 6—7. Ad Walkmühle.

Ord. II. Siliquosae. Fructus angustus et ratione latitudinis longus.

A. Siliqua non dehiscens.

263. *Raphanistrum* Wallr. (Cruciferae Juss.) Calyx adpressus. Siliqua moniliformis.  
538. *R. arvense* Wallr. Raphanus Raphanistrum L. Hederich. ⊙. 5—6. Inter segetes frequens.

B. Siliqua dehiscens.

264. *Turritis* L. (Cruciferae Juss.) Siliqua linearis. Semina biseritalia.  
539. *T. glabra* L. Glattes Thurmkraut. ♂. 5—6. In pascuis ad Dunkershagen.  
265. *Cardamine* L. (Cruciferae Juss.) Siliqua linearis. Semina uniserialia.  
540. *C. pratensis* L. Wiesen-Schaumkresse. Antherae flavae. 4. 5. In pratis.  
541. *C. amara* L. Bittere Schaumkresse. Antherae violaceae. 4. 5. Ad Dunkershagen.

266. *Arabis* L. (Cruciferae Juss.) Siliqua compressa; semina uniserialia.

542. *A. arenosa* Scop. Sisymbrium arenosum L. Sand-Gänsekresse. ♂. 6. Ad Niesewanz.

267. *Nasturtium* R. Br. (Cruciferae Juss.) Siliqua teretiuscula; semina inaequaliter biseritalia.

543. *N. palustre* DC. Sisymbrium palustre Leyss. Sumpf-Brunnenkresse. 4. 6. Ad Dunkershagen.

544. *N. silvestre* R. Br. Sisymbrium silvestre L. Wald-Br. 4. 6—7. Ad Hülse.

545. *N. amphibium* R. Br. Sisymbrium amphibium L. Wasser-Br. 4. 6—7. In paludosis ad Hülse.

546. *N. officinale* R. Br. Sisymbrium Nasturtium L. Offizinelle Br. 4. 6. Ad Dunkershagen.

268. *Barbaraea* R. Br. (Cruciferae Juss.) Siliqua tetragono-anceps; semina uniserialia.

547. *B. vulgaris* R. Br. Erysimum Barbarea L. Winter-Schafkresse, ♂. 6. Ad Schützenhaus.

269. *Sisymbrium* L. (Cruciferae Juss.) Siliqua teretiuscula; semina uniserialia.

- Sect. 1. Velarum DC. Siliqua apicem versus attenuata, subuliformis. Flores flavi.
548. *S. officinale* Scop. *Erysimum officinale* L. Gebräuchliche Raufe. ♂. 5—6.  
Ad vias frequens.
- Sect. 2. Irio DC. Siliquae teretes. Flores flavi.
549. *S. Sophia* L. Sophien-R. ♂. 6. In agris ad Niesewanz.
- Sect. 3. Alliaria DC. Siliquae teretes; semina longitudinaliter striata. Flores albi.
550. *S. Alliaria* Scop. *Erysimum Alliaria* L. Knoblauchs-R. ♂. 5—6. In sepulcretis.
- Sect. 4. Arabidopsis DC. Siliquae linearēs; semina non striata. Flores albi.
551. *S. Thalianum* Gaudin. *Arabis Thaliana* L. Thal's-R. ♂. 5. Ad Dundershagen.
270. *Cheirinia* Link. (Cruciferae Juss.) Siliqua exacte tetragona; semina uniserialia.
552. *Ch. cheiranthoides* Link. *Erysimum cheiranthoides* L. Lackartige Schoten-Dotter. ♂. 7. Ad Jesiorken.
271. *Sinapis* L. (Cruciferae Juss.) Siliqua teretuscula; semina uniserialia.
553. *S. arvensis* L. Ucker-Senf. ♂. 6. Inter segetes ad Schönfeld.
554. *S. alba* L. Weißer Senf. ♂. 6. In agris ad Buschmühle.

## Cl. XVI. *Monodelphia.*

### Ord. I. Pentandria.

272. *Erodium* L'Herit. (Geraniaceae Juss.) Calyx 5 sepalus. Corolla 5 petala. Stamina 10, 5 sterilia. Carpellorum rostra demum spiraliter torta.
555. *E. cicutarium* Smith. Reiher-Schnabel. Caulis decumbens. ♂. 5. In agris frequens.

### Ord. II. Decandria.

273. *Geranium* L. (Geraniaceae Juss.) Calyx 5 sepalus. Corolla 5 petala. Carpellorum rostra denique circinnatim revoluta.
- Sect. 1. Perennia. Pedunculi biflori.
556. *G. silvaticum* L. Wald-Storchschnabel. Petala violacea. 4. 7. Ad Dundershagen.
557. *G. pratense* L. Wiesen-St. Petala coerulea. 4. 7. In pratis.
558. *G. palustre* L. Sumpf-St. Caulis, petioli, pedunculique hirsuti. Petala purpurea. 4. 6. Ad Dunkershagen.
- Sect. 2. Annua. Pedunculi biflori.
559. *G. dissectum* L. Schlägblättriger St. Petala calycem aequantia. ♂. 7. Ad Zandersdorf.

560. *G. Robertianum* L. Ruprechts-St. Petala calycem duplo superantia. ♂.  
6—7. Ad Hohenkamp.

561. *G. pusillum* L. Kleinster St. Caulis velutino-pubescent. Flores pentandri.  
♂. 7—8. In agris frequens.

Ord. III. Polyandria.

274. *Malva* L. (Malvaceae Kunth.) Calyx 5 fidus, involucro triphylo cinctus. Pe-  
tala basi coalita. Carpella monosperma, in orbem disposita.

562. *M. Alcea* L. Alcea-Malve. Flores rosei. 4. 7. Ad Rittel.

563. *M. silvestris* L. Wald-M. Petala rosea, purpureis striis perducta. ♂. 7.  
Ad vias.

564. *M. rotundifolia* L. Rundblättrige M. Caulis procumbens. Petala rosea,  
calycem duplo superantia. 4. 7—8. Ad sepes.

Cl. XVII. *Diadelphia.*

Ord. I. Hexandria.

275. *Fumaria* L. (Fumariaceae Juss.) Calyx disepalus. Corolla ringens calcarata.

565. *F. officinalis* L. Erdbrauch. Petala rosea, apice atropurpurea. ♂. 6—7.  
Ad Dunkershagen.

276. *Corydalis* Dill. (Fumariaceae Juss.) Calyx disepalus. Corolla 4 petala, rin-  
gens. Petalam sup. calcaratum.

566. *C. cava* Schweigg. Höhler Lerchensporn. Tubera cava. 4. 4—5. Ad  
Buschmühle.

567. *C. solida* Smith. Dichter ♀. Tubera solida. 4. 4—5. In iisdem locis.

568. *C. fabacea* Pers. Bohnenartiger ♀. Caulis basi squamiger. Tubera solida.  
Flores parvi. 4. 4—5. Ad Hülse.

Ord. II. Octandria.

277. *Polygala* L. (Polygaleae Juss.) Calyx 5 sepalus, coloratus. Petala superiora  
vexillum, inferius carinam sistentia.

569. *P. vulgaris* L. Kreuzblume. Flores cyanei, virescentes albescentesve. 4.  
6. In pascuis frequens.

Ord. III. Decandria.

- A. Leguminina mono-trisperma.  
a, Stamina monadelpha.

278. *Ononis* L. (Leguminosae Juss.) Calyx 5 fidus. Vexillum striatum, carina acu-  
minata. Legumen turgidum.

570. *O. spinosa* L. Dornichte Hauhechel. Caules spinosi. 4. 7. In agris frequens
571. *O. hircina* L. Bockss. H. Caulis inermis. 4. 7. Prope Hohenkamp.
279. *Anthyllis* L. (Leguminosae Juss.) Calyx ventricosus, 5 dentatus. Vexillum maximum; carina obtusiuscula. Legumen calyce tectum.
572. *A. vulneraria* L. Wundflee. 4. 6. In pratis siccis ad Sandkrug.  
b, Stamina diadelpha.
280. *Melilotus* Tourn. (Leguminosae Juss.) Calyx tubulosus, 5 dentatus. Carina obtusa. Legumen subglobosum.
573. *M. alba* Lam. Weißer Steinilee. Petala alba. ♂. 7. Ad Zandersdorf.
281. *Trifolium* L. (Leguminosae Juss.) Calyx tubulosus, 5 dentatus. Carina obtusa. Legumen obovatum. Flores capitati.
- Sect. 1. *Lagopus*. Flores sessiles. Calycis faux interne linea elevata callosa, et saepe pilosa, vel annulo piloso obsita.
574. *T. pratense* L. Wiesen-R. Capitula basi involucrata. ♂. 5. In pratis.
575. *T. alpestre* L. Alpen-R. Capitula gemina ternave. 4. 5. Ad Hülse.
576. *T. arvense* L. Ucker-R. Capitula villosissima. ♂. 7. Ad Schönfeld.
- Sect. 2. *Trifoliastrum* DC. Flores pedicellati, bracteis parvis fulti. Calycis faux nuda, dentes aequales, vel duo superiores longiores.
577. *T. montanum* L. Berg-R. Capitula basi nuda. Flores albi. 4. 5. Ad Pollnitz.
578. *T. repens* L. Kriechenber R. Caulis repens. Flores albi. 4. 5. Ad Müskendorf.
579. *T. hybridum* L. Bastard-R. Caules adscendentes. Flores albi, deinde rosei et cito deflexi. 4. 6. Ad Dunkershagen.
- Sect. 3. *Chronosemium* DC. Flores pedicellati, bracteis fulti. Calycis faux nuda, dentes duo superiores breviores.
580. *T. agrarium* L. Goldfarbiger R. Flores aurei, dein dilute fuscii. 4. 6. Prope Hülse.
581. *T. procumbens* L. Liegender R. Flores sulphurei. ♂. 6. Ad Wilhelminenthal.
582. *T. filiforme* L. Fadenförmiger R. Capitula pauciflora, lutea. ♂. 5—6. Prope Gigel.
- B. Legumina polysperma.
1. Legumina unilocularia.
- a, Calyx quinquefidus vel quinquedentatus.
282. *Orobus* L. (Leguminosae Juss.) Calycis dentes inaequales. Vexillum obcordatum. Legumen teretiusculum. Cirri nulli.
583. *O. vernus* L. Frühling-Walderbse. Caulis angulatus. 4. 4—5. Ad Dunkershagen.

584. *O. tuberosus* L. Knollige W. Rhizoma ad articulos tuberosum. Caulis alatus. 4. 5. Ad Buschmühle.
585. *O. niger* L. Schwarze W. Caulis angulatus, ramosus. 4. 5. In iisdem locis.
283. *Láthyrus* L. (Leguminosae Juss.) Calyx 5 dentatus. Cor. papilionacea. Petioli in apice cirrhosi.
586. *L. pratensis* L. Wiesen-Platterbse. Caulis angulosus. Flores flavi. 4. 6. Ad Schützenhaus.
587. *L. silvestris* L. Wald-W. Caulis et petioli lato-alati. Petala ex carneo et purpureo mixta. 4. 7. Ad Buschmühle.
588. *L. palustris* L. Sumpf-W. Caulis alatus. Flores rubro-violacei. 4. 7. Ad Dunkershagen.
284. *Vicia* L. (Leguminosae Juss.) Calyx 5 fidus. Vexillum explanatum, adscendens. Stylus superne undique pilosus. Legumen compressum, lineare vel oblongum. Folia paripinnata; petioli cirrhiferi.  
Sect. 1. Pedunculi racemosi, multiflori.
589. *V. silvatica* L. Wald-Wicke. Flores albidi, coeruleo-venosi. 4. 7. Ad Buschmühle.
590. *V. cassubica* L. Kasubische W. Flores rubro-violacei. 4. 7. Prope Hülse.
591. *V. Cracca* L. Vogel-W. Flores coerulei. 4. 6—7. Prope Buschmühle.
592. *V. villosa* Roth. Zottige W. Folia villosa. Flores violacei. ♂ et ♀. 7. Ad Zandersdorf.  
Sect. 2. Pedunculi pauciflori; vix racemosi.
593. *V. sepium* L. Zaun-W. Racemi brevissimi. 4. 6. Prope Schützenhaus.
594. *V. angustifolia* Roth. Schmalblättrige W. Flores subgemini. ♂. 5—6. In agris.
595. *V. lathyroides* L. Platterbsenartige W. Flores solitarii, rubentes. ♂. 5. Prope Niesewanz.
596. *V. sativa* L. Futter-Wicke. } Coluntur.  
597. *V. Faba* L. Saubohne. }
- Adn. *Pisum arvense* Schüb. Graue Erbse. Flores violacei et *P. sativum* L. Weisse Erbse. Flores albi. Coluntur.  
b, Calyx bilabiatus.
285. *Sarothámnus* Wimm. (Leguminosae Juss.) Cal. labium  $\frac{2}{3}$  dentatum. Vexillum reflexum. Legumen oblongum, compressum.
598. *S. vulgaris* Wimm. Spartium scoparium L. Pfriemen. Frutex ramosissimus. Flores solitarii, aurei. ♂. 6—7. Ad Wilhelminenthal.

286. *Genista* L. (Leguminosae Juss.) Cal. labium  $\frac{2}{3}$  dentatum. Vexillum explanatum. Legumen oblongum, compressum.
599. *G. germanica* Deutscher Ginster. Flores racemosi, flavi. H. 6—7. In nemore Zandersdorfsensi.
287. *Lotus* L. (Leguminosae Juss.) Cal. labium  $\frac{2}{3}$  fidum. Vexillum patens; alae conniventes; carina rostrata. Legumen teres, stylo coronatum.
600. *L. corniculatus* L. Gehörnter Schoten-Klee. Caulis procumbens. Flores lutei, rufescentes. 4. 5—9. Ad vias.
288. *Medicago* L. (Leguminosae Juss.) Cal. labium  $\frac{2}{3}$  fidum. Vexillum subreflexum. Legumen falcatum vel cochleatum.
601. *M. lupulina* L. Hopfenartiger Schnecken-Klee. Spicae multiflorae. ⊙. 5—6. Ad Schützenhaus.
602. *M. falcata* L. Sichel-Schnecken-K. Racemi multiflori. Legumina falcata-cochleata. 4. 7. Ad Walkmühle.  
2. Legumina bilocularia.
289. *Astragalus* L. (Leguminosae Juss.) Calyx 5 dentatus. Vexillum alas aequans vel superans. Leguminis sutura interior introflexa.
603. *A. glycyphyllos* L. Süßholzblättrige Wolfschote. Caulis procumbens, ramosus. Flores flavescentes. 4. 6. Ad Zandersdorf.
- C. Lomentum.
290. *Coronilla* L. (Leguminosae Juss.) Calyx 5 dentatus. Carina acuminato-rostrata. Lomentum teretiusculum.
604. *C. varia* L. Bunte Kronwicke. Vexillum roseum, alae et carina albae, apex carinae atropurpureus. 4. 6. Ad viam stratam.

### CL. XVIII. *Polyadelphia.*

Ord. I. Polyandria.

291. *Hypéricum* L. (Hypericinæ Juss.) Calyx 5 sepalus. Corolla 5 petala. Capsula membranacea.  
Sect. 1. Sepala integerrimæ nec margine fimbriata, nec glanduloso-ciliata.  
605. *H. perforatum* L. Gemeines Johanniskraut. 4. 6. In agris.
606. *H. tetrapterum* Fries. Vierflügeliges J. Caulis quadrangularis, angulis latiis. 4. 7. Ad Dunkershagen.
607. *H. humifusum* L. Liegendes J. Caules prostrati. 4. 6. Ad Sandkrug.  
Sect. 2. Sepala margine glanduloso-serrulata, vel fimbriata.
608. *H. hirsutum* L. Langhaariges J. Caules teretes, villosi. 4. 6. Ad Zandersdorf.

Cl. XIX. *Syngenesia.*

Ord. I. Polygamia aequalis. Flores omnes hermaphroditi.

A. Semiflosculosae. Flores omnes ligulati, fertiles.

1. Pappus pilosus.

292. *Crepis* L. (Synanthereae Rich.) Periclinium calyculatum. Clinanthium nudum.  
609. *C. tectorum* L. Dach-Pippian. ♂. 6—7. Ad viam stratum.

293. *Taraxacum* Juss. (Synanthereae Rich.) Periclinium imbricatum. Pappus radiato-expansus.

610. *T. officinale* Wigg. Leontodon Taraxacum L. Butterblume. 4. 5. Ad vias.

294. *Hieracium* L. (Synanthereae Rich.) Periclinium imbricatum. Clinanthium nudum. Pappus hispidulus.

Sect. 1. Piloselloidea. Radix saepe flagellifera. Caulis scapiformis, subaphyllus.  
Herba saepissime glanduloso-hirsuta.

611. *H. Pilosella* L. Kleines Habichtskraut. Flagelliferum. 4. 5. In collibus.

612. *H. Auricula* L. Gedrührtes H. Flagelliferum. Caulis subunifolius. Calathidia subquaterna. 4. 6. Ad Wilhelminenthal. 613. *H. pratense* Tausch.  
Wiesen-H. Caulis paucifolius, hirsutus. Flores cymosi. 4. 7. Ad Walkmühle. 614. *H. praealtum* Villars. Schlanke H. Caulis subunifolius, apice  
saepe glandulifer. 4. 5. Ad Niesewanz. 615. *H. cynosum* Villars. Acker-  
boldiges H. Caulis paucifolius, pube stellata et setis obsitus, apice saepe  
glandulifer. 4. 5. Prope Sandkrug.

Sect. 2. Pulmonaroidea. Caulis plus minusve foliatus. Pili glandulosi saepe in  
pedunculis et periclinio, at nunquam in foliis.

616. *H. paludosum* L. Sumpf-H. Periclinium pilis nigricantibus obsitum. 4. 6.  
Ad Dunkershagen. 617. *H. vulgatum* Fries. Gemeines H. Caulis corym-  
bifer. 4. 6. Ad Hütte.

Sect. 3. Aphyllopoda. Folia radicalia sub anthesi nulla. Pedunculi squamosi.  
Periclinii phylla pluriserialia, tota aut sursum glabra.

618. *H. umbellatum* L. Doldentragendes H. Periclinii phylla apice recurva. 4.  
7—8. Ad Dunkershagen. 619. *H. silvestre* Tausch. Wald-H. Periclinii  
phylla siccitate nigricantia. 4. 7. Prope Jesiorken.

295. *Sonchus* L. (Synanthereae Rich.) Periclinium imbricatum. Clinanthium nudum. Pappus mollissimus. Flores lutei.

620. *S. oleraceus* L. Kohlartige Gänsefisch. ♂. 7. In hortis olitoriis. 621. *S. arvensis* L. Acker-G. Caulis apice corymbosus. 4. 7. Ad Dunkershagen. 622.  
*S. asper* Vill. Scharfe G. Caulis ramosus. Folia integra. ♂. 7. In locis cultis.

296. *Lactuca* L. (Synanthereae Rich.) Periclinium imbricatum. Clinanthium nudum. Pappus stipitatus.
623. *L. Scariola* L. Wilder Lattich. ♂. 7. In ruderatis.
624. *L. muralis* DC. Mauer-§. 4. 7. Prope Regnitz Mühle.
297. *Chondrilla* L. (Synanthereae Rich.) Periclinium calyculatum. Clinanthium nudum.
625. *Ch. juncea* L. Knorpel-Salat. 4. 7. Ad Niesewanz.  
2. Pappus plumosus.
298. *Tragopogon* L. (Synanthereae Rich.) Periclinii phylla basi coalita. Clinanthium nudum.
626. *T. pratensis* L. Wiesen-Bocksbart. Flores aurei. ♂. 5. In pascuis.
299. *Hypochoeris* L. (Synanthereae Rich.) Periclinium subcampanulatum, imbricatum. Clinanthium paleaceum.
627. *H. radicata* L. Nestiges Ferkelfraut. Pedunculi squamosi. 4. 6. Ad vias.
628. *H. maculata* L. Geflecktes F. Caulis 1—3 flor. 4. 7. Ad Hülle.
300. *Scorzonéra* L. (Synanthereae Rich.) Periclinium imbricatum, squamis latis. Clinanthium nudum.
629. *S. humilis* L. Wilde Haferwurz. Caulis lanatus, uniflorus. 4. 6. Prope Heinrichsthal.
301. *Picris* L. (Synanthereae Rich.) Periclinii squamae exteriores breviores. Clinanthium nudum.
630. *P. hieracioides* L. Habichtsfrauertige Wurzblume. Caulis corymboso-ramosus. ♂. 7. Ad Hülle.
302. *Apúrgia* Scop. (Synanthereae Rich.) Periclinium imbricatum, scorpiculatum. Clinanthium nudum. Pappus sessilis.
631. *A. autumnalis* Hoffm. Leontodon autumnalis L. Herbst-Löwenzähn. Scapus ramosus, declinatus, squamosus. 4. 7. Prope Walkmühle. 632. *A. hispida* Willd. Leontodon hastilis L. Borstiger F. Scapus uniflorus, subnudus. 4. 6—7. Ad viam stramat.
303. *Cichórium* L. (Synanthereae Rich.) Periclinium duplex. Clinanthium nudum vel subpaleaceum.
633. *C. Intybus* L. Eichorie. 4. 6. Ad vias frequens.
304. *Arnóseris* Gaertn. (Synanthereae Rich.) Periclinium fructiferum torulosum, globoso - connivens. Clinanthium nudum.
634. *A. pusilla* Gaertn. Lampsana pusilla Willd. Kleiner Lamm-Salat. Scapi subtriflori. ♂. 6—7. Ad Niesewanz.

305. *Lampsana* L. (Synanthereae Rich.) *Periclinium subcylindricum.* *Clinanthium nudum.* Pappus nullus.
635. *L. communis* L. Rainfohl. Caulis ramosus. ♂. 6—7. In ruderatis.  
B. Capitatae. Flores omnes tubulosi, fertiles.  
1. Pappus plumosus.
306. *Cirsium* Tourn. (Synanthereae Rich.) *Periclinii phylla plus minusve spine-scentia.* *Clinanthium setoso - paleaceum.*
636. *C. lanceolatum* Scop. *Carduus lanceolatus* L. Lanzettblättrige Kraußdistel. *Periclinii phylla patentia.* ♂. 7. Ad Zandersdorf. 637. *C. palustre* Scop. *Carduus palustris* L. Sumpf-Kraußdistel. *Periclinii phylla adpressa.* ♂. 7. Ad Dundershagen. 638. *C. oleraceum* Scop. *Cnicus oleraceus* L. Kohlartige Kraußdistel. *Periclinii phylla apice patentia.* ♀. 7. Ad Schützenhaus. 639. *C. arvense* Scop. *Serratula arvensis* L. Acker-Kraußdistel. ♀. 7. Inter segetes frequens.
307. *Carlina* L. (Synanthereae Rich.) *Periclinii phylla exteriora spinosa.* *Clinanthium paleaceo - setosum.*
640. *C. acaulis* L. Stengellose Ebertwurz. Caulescens, uniflorus. ♀. 7. Ad Hülse.
641. *C. vulgaris* L. Gemeine E. Caulis bi—multiflorus. ♂. 7. Ad Gigel.  
2. Pappus setaceo-pilosus.
308. *Carduus* L. (Synanthereae Rich.) *Periclinii phylla apice spinosa aut acuminata.*
642. *C. crispus* L. Krause Distel. Ramis alato-spinosis. ♂. 7. In agris frequens.
309. *Onopordum* L. (Synanthereae Rich.) *Periclinii phylla mucronato - pungentia.* *Clinanthium favosum.*
643. *O. Acanthium* L. Stachelige Krebsdistel. Caulis alatus. Folia spinosa. ♂.  
7. Ad Zandersdorf.
310. *Arctium* L. (Synanthereae Rich.) *Periclinii phylla in mucronem cartilagineum uncinatum desinentia.* *Clinanthium planum, paleaceum.*
644. *A. tomentosum* Schk. *Lappa tomentosa* Lam. Filzige Klette. Calathidia subcorymbosa. ♂. 7. In incultis. 645. *A. minus* Schk. *Lappa minor* DC. Kleine Kraußdistel. Calathidia subracemosum, minora. ♂. 7. In iisdem locis. 646. *A. majus* Schk. *Lappa major* Gaertn. Große Kraußdistel. Calathidia subcorymbosa, glabra. ♂. 7. Ad sepes.
311. *Serrátula* L. (Synanthereae Rich.) *Periclinii phylla inermia.* *Clinanthium setoso - paleaceum.*
647. *S. tinctoria* L. Färber-Scharte. ♀. 7—9. Ad Hohenkamp.
312. *Eupatorium* L. (Synanthereae Rich.) *Periclinium cylindricum.* *Clinanthium nudum.*
648. *E. cannabinum* L. Wasserhanf. Kunigundenfrau. ♀. 7. Ad Buschmühle,

Ord. II. Polygamia superflua. Flores radii femininei, fertiles, ligulati vel tubulosi; disci hermaphroditi, fertiles, semper tubulosi.

A. Tubulosae. Flores omnes tubulosi.

1. Pappus obsoletus vel nullus.

313. *Artemisia* L. (Synanthereae Rich.) Periclinium imbricatum. Clinanthium nudum vel villosum. Flores femininei uniserialis.

Sect. 1. *Absinthium* Tourn. Calathidium heterogamum. Clinanthium villosum. 649. *A. Absinthium* L. Wermuth. 4. 8. In sepulcreto puaeii Schönsfeld.

Sect. 2. *Abrotanum* Tourn. Calathidium heterogamum. Clinanthium nudum.

650. *A. vulgaris* L. Beifuß. Calathidia erecta. 4. 8. In ruderatis. 651. *A. campestris* L. Feld-Β. Caules adscendentes. 4. 7. In agris ad Wilhelminenthal.

314. *Tanacétum* L. (Synanthereae Rich.) Periclinium campanulatum. Clinanthium convexum. Flores femininei uniserialis.

652. *T. vulgare* L. Rainfarn. Calathidia corymbosa. 4. 7. In agris frequens. 2. Pappus pilosus.

315. *Gnaphálium* L. (Synanthereae Rich.) Periclinii phylla inaequalia, scariosa. Clinanthium nudum.

Sect. 1. *Gnaphalium* Don. Calathidia heterogama, monoica. Florés hermaphroditi pauci, flores femininei pluriserialis, hi solum plerumque fertiles.

653. *G. silvaticum* L. Wald-Katzenpfötchen. Periclinii phylla fusco-maculata. 4. 7. Ad Buschmühle. 654. *G. uliginosum* L. Sumpf-Β. Caulis albolanatus. ①. 7. Ad Negenfuhl.

Sect. 2. *Helichrýsum* Gaertn. Flores femininei pauci, uniserialis, ceteri hermaphroditi. 655. *G. arenarium* DC. Gelbes Β. Periclinii phylla nitida, aurea. 4. 7—9. In arenosis.

Sect. 3. *Filago* L. Flores hermaphroditi pauci, femininei plures, hi solum plerumque fertiles.

656. *G. montanum* Willd. *Filago montana* L. Berg-Filzraut. Calathidia pauci-flora. ①. 7. In agris. 657. *G. arvense* Willd. *Filago arvensis* L. Acker-Β. Tota planta dense lanata. ①. 6. Ad Gigel.

Sect. 4. *Antennaria* Gaertn. Calathidia homogama, dioica; hermaphrodita sterilia, pappo apice incrassato.

658. *G. dioicum* L. Frühlings-Β. Caulis stolonifer. Flores albi vel rosei. 4. 5. Ad Schützenhaus.

- B. Ligulatae. Flores radii ligulati.
1. Pappus pilosus. Clinanthium nudum.
316. *Tussilago* L. (Synanthereae Rich.) Periclinium cylindricum, subcalyculatum.
659. *T. Farfara* L. Gemeiner Hufstattich. Caulis squamosus, uniflorus. 4. 4.  
In hortis suburbii.
317. *Petasites* Gaertn. (Synanthereae Rich.) Calathidia dioica, heterogama. Periclinium simplex.
660. *P. officinalis* Moench. Tussilago Petasites L. Aechter Hufstattich. 4. 4. In  
hortis olitorioriis „die Wälle“.
318. *Solidago* L. (Synanthereae Rich.) Flores radii concolores; hermaphrodit tubulosi.
661. *S. Virgaurea* L. Goldruth. 4. 7. In nemore Zandersdorfsensi.
319. *Erigeron* L. (Synanthereae Rich.) Flores radii pluriseriales; disci tubulosi  
5 dentati.
662. *E. acris* L. Schafses Berufkraut. Periclinii phylla purpurascens. 4. 7.  
Ad Gigel. 663. *E. canadensis* L. Kanadisches B. Folia setoso - ciliata.  
4. 6. In eodem loco.
320. *Inula* L. (Synanthereae Rich.) Periclinii phylla squarrosa. Antherae basi  
biaristatae.
664. *I. salicina* L. Weidenblättriger Alant. Caulis uni - pluriflorus. 4. 6 - 7.  
Ad Müskendorf. 665. *I. britannica* L. Britischer A. Caulis villosus. 4.  
7. Ad Hülse. 666. *I. pulicaria* L. Pulicaria vulgaris Gaertn. Blöß - A.  
○. 7. Ad Buschmühle.
321. *Cineraria* L. (Synanthereae Rich.) Flores radii interdum nulli; disci tubulosi.
667. *C. palustris* L. Senecio palustris DC. Sumpf - Aschfraut. Caulis villosus.  
○. 7. Prope Hülse.
322. *Senecio* L. (Synanthereae Rich.) Periclinium cylindricum vel conicum. Flores  
radii interdum nulli; disci tubulosi.
- Sect. 1. Senecio. Flores ligulati nulli vel brevissimi, revoluti.
668. *S. vulgaris* L. Gemeines Kreuzfraut. Folia carnosiuscula. ○. 5 - 9. In  
hortis. 669. *S. viscosus* L. Klebriges R. Folia viscosa. ○. 7. Ad Nie-  
sewanz. 670. *S. silvaticus* L. Wald-R. Caulis corymboso - ramosus. ○.  
6. Ad Hohenkamp.
- Sect. 2. Jacobaea. Calathidia radiata, calyculata. Folia pinnatifida, glabra  
vel glabriuscula.
671. *S. Jacobaea* L. Jakob's R. Folia amplexicaulia. 4. 7 - 8. Ad Funkermühle.
672. *S. aquaticus* Huds. Wasser-R. Folia laete virentia. 4. 7 - 8. Ad Dunkershagen.

- Sect. 3. Doria. Calathidia radiata, calyculata. Folia integra, integerrima vel serrata
673. *S. saracenicus* L. Saracenisches R. Radius suboctoflorus. 4. 7—8. Ad  
Rittel. 674. *S. paludosus* L. Sumpf-R. Radius multiiflorus. 4. 7—8.  
Ad Dunkershagen.
2. Pappus obsoletus vel nullus. Clinanthium nudum.
323. *Bellis* L. (Synanthereae Rich.) Periclinium uni—biseriale. Pappus nullus.
675. *B. perennis* L. Mittagsblümchen. 4. 4—9. In pascuis frequens.
324. *Matricaria* L. (Synanthereae Rich.) Flores radii uniserialis. Pappus nullus.
676. *M. Chamomilla* L. Kamille. ①. 6. In agris frequens.
325. *Chrysanthemum* L. (Synanthereae Rich.) Periclinium planiusculum vel hemi-sphaericum. Pappus nullus.
677. *Ch. Leucanthemum* L. Weiße Wucherblume. Flores radii candidi. 4. 6.  
Inter segetes. 678. *Ch. segetum* L. Gelbe W. Flores radii aurei. ①. 6.  
In iisdem locis.
326. *Pyrethrum* Smith. (Synanthereae Rich.) Periclinium campanulatum. Pappus  
coroniformis, obsoletus.
679. *P. inodorum* Smith. Geruchloser Bertram. ①. 7. Ad viam stratam.  
C. Clinanthium paleaceum.
327. *Anthemis* L. (Synanthereae Rich.) Clinanthium conicum aut convexum. Pap-  
pus callosus.
- Sect. 1. Radius albus.
680. *A. arvensis* L. Acker-Kamille. ①. 7. In arenosis frequens.
681. *A. Cotula* L. Hundskamille. ①. 7. Ad Neue Welt.
- Sect. 2. Radius luteus.
682. *A. tinctoria* L. Färber-R. 4. 7. Inter segetes.
328. *Achillea* L. (Synanthereae Rich.) Flores radii 4—6. Pappus nullus.
683. *A. Ptarmica* L. Sumpf-Schafgarbe. 4. 7. Prope Hülse.
684. *A. Millefolium* L. Schafgarbe. 4. 6. Ad vias frequens.
- Ord. III. Polygamia frustranea. Flores radii seminei abortu stig-  
matis neutri, disci hermaphrodit, fertiles.
329. *Centaurea* L. (Synanthereae Rich.) Periclinii squamae imberbes vel spinosae.  
Clinanthium setoso - paleaceum.
685. *C. Cyanus* L. Kornblume. ①. 6. In agris frequens. 686. *C. Scabiosa* L.  
Sfabiosen-Glockenblume. Periclinii squamae coloratae, fimbriatae. 4. 7.  
In agris. 687. *C. Jacaea* L. Gemeine J. Squamae ovatae, lacerae. 4. 7.  
In iisdem locis.

330. *Bidens* L. (Synanthereae Rich.) Periclinii phylla exteriora patentia. Flores nunc omnes hermaphroditi, tubulosi, nunc radii ligulati et neutri. Papus aristatus.

688. *B. tripartita* L. Dreitheiliger Zweizahn. Flores discoidei. ♂. 8. Ad Schützenhaus. 689. *B. cernua* L. Nickender ♀. Calathidia cernua. ♂. 8. Ad paludem Negenpühl.

## Cl. XX. *Gynandria.*

### Ord. I. Monandria.

A. Ophrydineae. Pollinaria granulosa, caudiculata, per caudiculas retinaculis affixa.

331. *Orchis* L. (Orchideae Juss.) Perigonii labellum 3lobum, calcaratum. Retinacula duo intra bursiculam unicam.

Sect. 1. Tubera integra.

690. *O. Morio* L. Gemeines Knabenkraut. Labelli lobi lati. 4. 6. Ad Schützenhaus. 691. *O. mascula* L. Männliches ♂. Labellum profunde trilobum, 4. 6. Ad Gigel.

Sect. 2. Tubera palmata.

692. *O. maculata* L. Geflecktes ♂. Flores dilute lilacini, maculis lineolisque purpureis picti. 4. 6. Ad Walkmühle. 693. *O. latifolia* L. Breitblättriges ♂. Caulis fistulosus. 4. 6. Ad Dunkershagen.

332. *Gymnadenia* R. Br. (Orchideae Juss.) Retinacula distincta, basi nuda.

694. *G. conopsea* R. Br. Orchis conopsea L. Zwerg-Orchis. Flores purpurei, rarius albi. 4. 6. Ad Schlochau.

333. *Platanthera* Rich. (Orchideae Juss.) Labellum integrum, calcaratum. Retinacula distincta, nuda.

695. *P. bifolia* Rich. Orchis bifolia L. Nachtschatten. Calcar longissimum. 4. 5—6. Ad Buschmühle.

334. *Herminium* R. Br. (Orchideae Juss.) Labellum hastato-trifidum, basi saccato-calcaratum. Retinacula sejuncta, nuda.

696. *H. Monorchis* R. Br. Einfloellige Herminie. Flores viridi-luteoli. 4. 6. Ad Hohenkamp.

B. Limodoreae. Pollinaria granulosa, ecaudiculata, proscollae adglutinata.

335. *Epipactis* Rich. (Orchideae Juss.) Labellum ecalcaratum, geniculatum, lobo basilari nectarifero.

697. *E. latifolia* Allion. Breitblättrige Sumpfwurz. Flores virentes. 4. 7. Ad Rittel. 698. *E. palustris* Crantz. *Serapias longifolia* L. Gemeine S. Flores cinereo - virentes. 4. 6—7. Ad Hülse.
336. *Listera* R. Br. (Orchideae Juss.) Labellum ecalcaratum, deflexum, bifidum.
699. *L. ovata* R. Br. Eiförmige Lister. Folia ovata. 4. 5—6. Ad Regnitz.
700. *L. cordata* R. Br. Herzförmige L. Folia cordata. 4. 6. Prope Gemel.
337. *Neottia* L. (Orchideae Juss.) Labellum ecalcaratum, basi saccatum.
701. *N. nidus avis* Rich. Nestwurz. Planta albido - fuscens. 4. 6. Ad Hohenkamp.
339. *Goodyéra* R. Br. (Orchideae Juss.) Labellum ecalcaratum, basi saccato - gibbum.
702. *G. repens* R. Br. Kriechende Gudhere. Rhizoma repens. Flores albidi. 4. 7. Ad Hohenkamp.
- C. Malaxidineae. Pollinaria cereacea, ecaudiculata, proscollae adglutinata.
339. *Sturmia* Reichb. (Orchideae Juss.) Labellum ecalcaratum, integrum et reflexum.
703. *S. Loeselii* Reichb. Lösel's Fettfraut. Folia bina. 4. 6. Ad Regnitz Mühle.

Ord. II. Diandria.

340. *Cypripedium* L. (Orchideae Juss.) Labellum inflato - calceoliforme. Gynostemium 3 fidum, lacinias lateralibus antheriferis, media maxima exantherata.
704. *C. Calceolus* L. Venusfuh. Perigonum purpureo - fuscum; labellum flavum, rubro - punctatum. 4. 6. Ad Buschmühle.

Ord. III. Hexandria.

341. *Aristolochia* L. (Aristolochiae Juss.) Perigonum apice in ligulam dilatatum.
705. *A. Clematitis* L. Österluzei. 4. 6. Ad sepes prope Hohenkamp.

Cl. XXI. Monoeccia.

Ord. I. Diandria.

342. *Lemna* L. (Lemnaceae Link.) Flores marginales hermaphroditi vel abortu dici. Utriculus oligospermus.
706. *L. polyrrhiza* L. Vielwurzelige Wasserlinse. ♂. 7. In stagno Ziegel-See.
707. *L. gibba* L. Bucklige W. ♂. 7. In eodem stagno. 708. *L. trisulca* L. Dreisurchige W. ♂. 6. In stagno Heerbruch. 709. *L. minor* L. Kleine W. Entenfleott. ♂. 6. In stagnis frequens.

Ord. II. Triandria.

343. *Typha* L. (Typhaceae Juss.) Flores diclini in spicas densissimas cylindricas congesti. Spica mascula superior, seminea inferior. Utriculus monospermus.

710. *T. latifolia* L. Breitblättriger Rohrkolben. Duderkeule. 4. 7. In stagno Heerbruch. 711. *T. angustifolia* L. Schmalblättriger R. 4. 7. In eodem stagno.

344. *Sparganium* L. (Typhaceae Juss.) Flores diclini in capitula globosa congesti, mascula superiora.

712. *S. ramosum* Smith. Nestiger Igelpf. Culmus ramosus. 4. 6. Ad Dunkershagen. 713. *S. simplex* Smith. Einfacher J. Culmus simplex. 4. 6. In iisdem locis. 714. *S. natans* L. Schwimmender J. Culmus simplex. 4. 6. Ad Heinrichsthal.

345. *Carex* L. (Cyperaceae Juss.) Spicae dicliniae aut androgynae. Stamina duo vel tria.

Sect. 1. Spicula solitaria terminalis, dioica. Stigmata duo.

715. *C. dioica* L. Zweihäusige Segge. Culmus subtriqueter. 4. 5. Ad Heerbruch.

Sect. 2. Spiculae androgynae in spicam continuam vel interruptam dispositae.  
a, Spiculae superne masculae. Stigmata duo.

716. *C. arenaria* L. Sand-S. Culmus superne angulis scaber. 4. 5. Ad Niesewanz. 717. *C. vulpina* L. Fuchs-S. Spiculae ternae quinqueve. 4. 6. Ad Dunkershagen. 718. *C. muricata* L. Stachels-S. Spiculae plures solitariae aut binae. 4. 6. Ad Walkmühle.

b, Spiculae basi masculae, in spica simplici alternae. Stigmata duo.

719. *C. remota* L. Entferntblättrige S. Culmus gracilis. 4. 6. Ad Hülse.

720. *C. stellulata* Good. Sternförmige S. Spiculae remotiusculae. 4. 6. Prope Müskendorf. 721. *C. leporina* L. Hasen-S. Spiculae alternae. 4. 6. Ad Schützenhaus. 722. *C. elongata* L. Verlängerte S. Squamae ferrugineae. 4. 5. Ad Buschmühle. 723. *C. canescens* L. Graue S. Squamae albidæ. In iisdem locis.

Sect. 3. Spica terminalis mascula, laterales femineae.

a, Stigmata duo.

724. *C. caespitosa* L. Nasen-S. Spicula mascula solitaria. 4. 5. Ad Hülse.

725. *C. stricta* Good. Straffe S. Culmus dense caespitosus. 4. 5. Ad Sandkrug. 726. *C. acuta* L. Scharfe S. Spiculae masculae binae ternaeve. 4. 5. Prope Gigel.

b, Stigmata tria. Spica terminalis mascula, vel androgyna, floribus scilicet inferioribus masculis.

727. *C. limosa* L. Schlamm-S. Spica mascula solitaria. 4. 6. Ad Hölle.  
728. *C. pilulifera* L. Pillen-S. Spiculae semineae subternae. 4. 5. Ad Dunkershagen. 729. *C. collina* Willd. Hügel-S. Spiculae semineae subgeminae. Squamae nigricantes. 4. 5. Prope Niesewanz. 730. *C. praecox* Jacq. Frühe S. Squamae ferrugineae, carina virescente. 4. 5. In iisdem locis. 731. *C. ciliata* Willd. Haide-S. Squamae margine albo-membranaceae. 4. 5. Ad Gigel. 732. *C. digitata* L. Gefingerte S. 4. 5. Ad Hohenkamp. 733. *C. panicea* L. Schwaden-S. Spiculae semineae laxiflorae. 4. 5. Ad Dunkershagen. 734. *C. pallescens* L. Bleiche S. Spiculae semineae cernuae. 4. 6. Ad Buschmühle. 735. *C. flava* L. Gelbe S. Bracteae culnum longe superantes. 4. 5. Ad Walkmühle.

c, Stigmata tria. Spicae masculae plerumque plures.

α. Fructus glabri.

736. *C. vesicaria* L. Blasen-S. Culmus triqueter. 4. 6. Ad Buschmühle.  
737. *C. paludosa* Good. Sumpf-S. 4. 5—6. In iisdem locis.  
738. *C. riparia* Good. Ufer-S. 4. 5. Prope Sandkrug.

β. Fructus hirti.

739. *C. hirta* L. Steifhaarige S. 4. 5. Ad Niesewanz.  
740. *C. filiformis* L. Faden-S. 4. 5—6. Ad Neue Welt.

### Ord. III. Tetrandria.

346. *Alnus* Gaertn. (Betulineae Rich.) Flores amentacei. Nux bilocularis, disperma.  
741. *A. glutinosa* Gaertn. Erle. Folia subrotunda. ℥. 4. Ad Dunkershagen.  
742. *A. incana* DC. Graue E. Folia ovata. ℥. 4. Ad Buschmühle.  
347. *Urtica* L. (Urticeae Juss.) Perigonium floris masculi 4-partitum; perigonium floris feminiae bivalve. Nucula monosperma.  
743. *U. urens* L. Kleine Brennessel. ⓠ. 7. In ruderatis.  
744. *U. dioica* L. Große Br. 4. 6. Ad sepes.

### Ord. IV. Pentandria.

348. *Xanthium* L. (Synanthereae Rich.) Calathidia terminalia mascula, lateralia feminine. Drupa echinata.  
745. *X. Strumarium* L. Spitzflette. ⓠ. 7—8. Ad Schützenhaus.

Ord. V. Polyandria.

A. Flores incompleti.

a, Non amentacei.

349. *Ceratophyllum* L. (Ceratophylleae Gray.) Perigonum flor. masc. irregulariter incisum; flor. sem. nullum. Nux.

746. *C. submersum* L. Untergetauchtes Hartblatt. Nux apice spina mucronata. 4.

7. In stagno Negenpfuhl. 747. *C. demersum* L. Gemeines ḥ. Nux tri-

spinosa, basi tuberculata. 4. 7. In eodem stagno.

b, Flores masculi amentacei. Stamina perigonio inserta.

350. *Fagus* L. (Cupuliferae Rich.) Amentum masculum subglobosum. Flores fe-

minei solitarii. Nuces geminae.

748. *F. silvatica* L. Rothbuche. ḥ. 5—6. In silvis frequens.

351. *Quercus* L. (Cupuliferae Rich.) Amenti masculi flores dissiti. Flores feminei

in axilla gemmiformes. Nux perigonio semigloboso tecta.

749. *Q. Robur* L. Steinreiche. Fructus oblongi, sessiles. ḥ. 5. In silvis.

750. *Q. pedunculata* L. Sommerreiche. Fructus pedunculati. ḥ. 5. In iisdem locis.

c, Flores masculi, vel masculi et feminei, amentacei.

352. *Corylus* L. (Cupuliferae Rich.) Amenti masculi squamae imbricatae, subpel-

tatae. Flores feminei gemmacei, singuli. Nux monosperma.

751. *C. Avellana* L. Haselnußstrauß. ḥ. 4. In silvis frequens.

353. *Carpinus* L. (Cupuliferae Rich.) Amenti masculi squamae ovatae, solitariae.

Nux ovata perigonio vestita.

752. *C. Bétulus* L. Weiß-, Hagebuche. ḥ. 5. In silvis frequens.

354. *Bétula* L. (Betulineae Rich.) Amenti masculi squamae stipitatae et peltatae;

amenti feminei squamae trilobae. Nux monosperma, utrinque membrana-

ceo - alata.

753. *B. alba* L. Weiße Birke. Ramuli verrucosi. ḥ. 5. Ad viam stratum.

754. *B. pubescens* L. Weißhaarige B. Ramuli pubescentes. ḥ. 5. Ad Regnitz

Mühle. 755. *B. fruticosa* Pall. Strauchbirke. Ramuli punctis resinosis

adpersi. ḥ. 5. Ad Hülse.

B. Flores completi.

355. *Myriophyllum* L. (Halorageae R. Br.) Flores spicato - verticillati, monoici, su-

periores masculi.

756. *M. spicatum* L. Achrentragendes Laufendblatt. 4. 6. In stagno Negenpfuhl.

757. *M. verticillatum* L. Quirlblätiges L. Flores axillares. 4. 6—7. In eo-

dem stagno.

356. *Sagittaria* L. (Alismaceae Rich.) Calyx 3 sepalus; corolla 3 petala. Carr-pella numerosa.
758. *S. sagittifolia* L. Pfeilftraut. 4. 6. Prope Schützenhaus.
- Ord. VI. Monadelphia.
357. *Pinus* L. (Coniferae Juss.) Amenta mascula circa ramos, sessilia, aggregata. Amenta seminea squamis bifloris. Strobilus.
759. *P. silvestris* L. Kiefer. Fichte. h. 5. In silvis frequens.
760. *P. Abies* L. Nothanne. Folia solitaria. h. 5. Ad Dunkershagen.
358. *Bryonia* L. (Cucurbitaceae Juss.) Calyx 5 dentatus. Corolla 5 partita. Bacca globosa, trilocularis.
761. *B. alba* L. Weiße Zaunrübe. Baccae nigrae. 4. 7—8. Ad Buschmühle.
762. *B. dioica* L. Rothe 3. Flores dioici. Baccae rubrae. 4. 8. Ad Hülse.

**Cl. XXII. Dioecia.**

Ord. I. Diandria.

359. *Salix* L. (Salicineae Rich.) Flores amentacei. Amentum squamis unifloris. Stamina 1—3 vel 5.
- Sect. 1. Fragiles Koch. Squamae amenti concolores, luteo-virides, ante fructus maturitate caducae.
763. *S. pentandra* L. Lorbeerweide. Amenta mascula tri—decandra. h. 5. Ad Ziegel-See. 764. *S. fragilis* L. Bruchw. Amenta diandra. h. 4. Ad vias. 765. *S. alba* L. Weiße W. Amenta diandra. h. 4. Ad vias. 766. *S. vitellina* L. Goldw. Amenta diandra. h. 4. Ad Zandersdorf.
- Sect. 2. Amygdalinae Koch. Squamae amenti concolores, luteo-virides, persistentes.
767. *S. amygdalina* L. Mandelblättrige W. Amenta triandra. h. 4—5. Ad Buschmühle. 768. *S. undulata* Ehrh. Wellenblättrige W. Amenta triandra. Squamae apice barbatae. h. 5. Ad Rittel.
- Sect. 3. Pruinosaes Koch. Squamae amenti apice discolores. Antherae defloratae luteae. Cortex interior aestate citrinus.
769. *S. acutifolia* Willd. Spitzblättrige W. h. 4—5. Ad Gemel.
770. *S. daphnoides* Vill. Seidelbast-W. h. 4—5. Ad Buschmühle.
- Sect. 4. Purpureae Koch. Squamae amenti apice discolores. Antherae purpureae, defloratae nigrae. Cortex interior aestate citrinus.
771. *S. purpurea* L. Purpur-W. Amenta monandra. h. 4—5. Prope Müskendorf.

Sect. 5. *Viminales* Koch. Squamae amenti apice discolores. Antherae defloratae luteae. Cortex interior virescens.

772. *S. viminalis* L. Korb-W. H. 4—5. Prope Rittel.

Sect. 6. *Capreae* Koch. Squamae amenti apice discolores. Antherae defloratae luteae. Capsulae pedicellatae, pedicello nectarium saltem bis superante.

773. *S. cinerea* L. Uschgrae W. Gemmae incanae. H. 4. Ad Buschmühle.

774. *S. caprea* L. Saal-W. Gemmae glabrae. H. 4—5. In nemore Zandersdorsensi.

775. *S. aurita* L. Salbei-W. H. 5. Ad Buschmühle.

776. *S. repens* L. Kriechende W. H. 5. In nemore Schönfeldensi.

Ord. II. Triandria.

360. *Empetrum* L. (Empetreae Nutt.) Calyx 3 partitus, basi squamis 3 suffultus.

Corolla 3 petala. Stamina petalis alterna. Bacca globosa, 6—8 sperma.

777. *E. nigrum* L. Schwarze Rauschbeere. Corolla rosea; stamina purpurea. H. 5. Prope Prechlau.

Ord. III. Tetrandria.

361. *Viscum* L. (Loranthae Juss.) Perigonium floris masculi 4 partitum, Bacca globosa, viscosa.

778. *V. album* L. Mistel. H. 4—5. Planta parasitica in Tiliis sepulcreti ecclesiam evangelicam persequentium.

Ord. IV. Pentandria.

362. *Humulus* L. (Urticeae Juss.) Perigonium floris masculi 5 partitum; perigonium flor. fem. squamaceum.

779. *H. Lupulus* L. Hopfen. Caules sinistrorum volubiles, angulosi. H. 7. Ad Buschmühle.

363. *Cannabis* L. (Urticeae Juss.) Perigonium flor. masc. 5 partitum; perigonium flor. fem. utriculiforme, latere lians. Nux monosperma.

780. *C. sativa* L. Hanf. O. 7. Ad Dunkershagen.

Ord. V. Octandria.

364. *Populus* L. (Salicineae Rich.) Perigonium cyathiforme. Stamina 8—10.

781. *P. alba* L. Silber-Pappel. H. 5. Ad laterarium praedii Gigel.

782. *P. tremula* L. Bitter-*p.* h. 4. Ad viam post villam Schützenhaus et alibi.

783. *P. balsamifera* Willd. Balsam-*p.* h. 4—5. Ad viam stratam post sepulcreta.

784. *P. nigra* L. Schwarz-*p.* h. 4. Ad viam stratam.

785. *P. dilatata* Ait. Pyramiden-*p.* h. 4. In palaestra scholae nostrae.

Ord. VI. Enneandria.

365. *Mercurialis* L. (Euphorbiaceae Juss.) Perigonium tripartitum. Stamina 9—12. Capsula dicocca.

786. *M. perennis* L. Alsdauerndes Bingelfraut. Flores feminei longe pedunculati. 4. 5. Ad Dunkershagen.

366. *Hydrocharis* L. (Hydrocharideae DC.) Calyx tripartitus. Corolla tripetala. Capsula sexlocularis.

787. *H. morsus ranae* L. Froschbiss. 4. 7. In stagno Negenfuhl.

Ord. VII. Dodecandra.

367. *Stratiotes* L. (Hydrocharideae DC.) Calyx tripartitus. Corolla tripetala. Bacca hexagona, polysperma.

788. *St. aloides* L. Aloeblättrige Siggelblume. Flores albi. 4. 7. In stagno Negenfuhl.

Ord. VIII. Monadelphia.

368. *Juniperus* L. (Coniferae Juss.) Amenti masculi squamae subpeltatae. Flores feminei terni, involucro trifido cincti. Bacca spuria trisperma.

789. *J. communis* L. Wachholder. h. 5. In silvis.

Cl. XXIII. *Polygamia.*

Ord. I. Monoecia.

369. *Acer* L. (Acerineae DC.) Calyx 5 partitus. Corolla 5 petala. Filamenta floris masculi longissima. Samarae duae.

790. *A. platanoides* L. Gemeiner Ahorn. h. 5. In sepulcreto ecclesiam evangelicam persequentium.

791. *A. campestre* L. Feld-Ahorn. h. 5. In dumetis prope Berglau.

Ord. II. Dioecia.

370. *Fraxinus* L. (Oleineae Link.) Calyx 3—4 partitus, aut nullus. Corolla 3—4 partita, aut nulla. Nux plano-compressa.

792. *F. excelsior* L. Esche. h. 6. In palaestra scholae nostrae.

---

A d d e n d a.

---

Pag. 6. inseratur ante Fam. 12. Smilacinae:

Fam. 11a. *Liliaceae*. Perigonium corollinum, hexaphyllum; stamina sex; germen liberum. — Genus: *Lilium*.

Pag. 37. post 211. *R. nigrum* L. Bocksbere. add.:

211a. *R. Grossularia* L. Stachelbeere. h. 5. Prope sepulcretum Judaeorum.

Pag. 45. post 291. *A. arenarium* L. Uckerlauch. inseratur:

144a. *Lilium* L. (Liliaceae DC.) Flores terminales et axillares. Perigonii phylla sulco nectarifero.

291a. *L. Martagon* L. Türkenbund-Lilie. 4. 7—8. Ad Berglau.

Pag. 47. post 307. *A. Plantagineum* add.:

307a. *A. natans* L. Schwimmender F. Flores albi. 4. 6—8. In nemore Schönfeldensi.

Pag. 52. post 356. *Dianthus arenarium* inserat.:

356a. *D. superbus* L. Prächtige N. Petala basi barbata. ♂? 4? 6—8. In silva Freiheit.

Pag. 72. post 602. *M. falcata* add.:

602a. *M. sativa* L. Gebauter Schnecken-R. Luzerne. Racemi oblongi. Flores violacei. 4. 7—8. Ad villam Schützenhaus.

---





... ist der von der Universität zu, und die Universität ist eine der ältesten und berühmtesten der Welt. Sie ist eine Universität, die nicht nur einen hohen Stand in Wissenschaft und Kunst, sondern auch in Politik und Freiheit. Sie ist eine Universität, die nicht nur einen hohen Stand in Wissenschaft und Kunst, sondern auch in Politik und Freiheit.

## Schulnachrichten.



### Erster Abschnitt.

## Allgemeine Lehrverfassung.

### Prima.

Ordinarius: Herr Professor Lindemann.

### A. Sprachen.

I. Deutsche Sprache. Die vier ersten Perioden der deutschen Litteraturgeschichte nach Roberstein. Leitung der freien Vorträge, deren Inhalt sich auf die neuere Litteratur bezog. Verbesserung der Auffäße. Gelesen wurden Göthe's Hermann und Dorothea und die Iphigenie. 2 St. Dr. Professor Lindemann.

II. Lateinische Sprache. Cic. de off. lib. I. II. cap. 1—18. Die Übersetzung war deutsch, die Erklärung lateinisch. Cursivisch wurden die Reden pro Milone und pro Murena gelesen und die früher memorirte erste catilinarische wurde theilweise wiederholt. Correctur der lateinischen Auffäße und der Exercitien aus Ruhnken und aus Seyffert's Palaestra Ciceroniana; Extemporalien aus Cicero und Muret; Grammatik und zwar syntaxis ornata nach Zumpt. Alle vierzehn Tage wurden von den Schülern im Sommer-Semester freie lateinische Vorträge über Gegenstände aus der alten Geschichte gehalten, an welche



sich Disputir-Übungen schlossen. Zur Privatlectüre war das fünfte Buch der Tusculanen bestimmt. 6 St. Hr. Gymnasial-Lehrer Dr. Peters. Das Leben, die Schriften und die Metrik des Horaz; Erläuterung der Oden des dritten und vierten Buches. Einzelne Oden wurden memoriert und viele von den Schülern privatim gelesen. 2 St. Brüggemann.

- III. Griechische Sprache. Einführung in den Thucydides; Lectüre aus dessen zweitem Buche mit besonderer Hervorhebung der Leichenrede des Perikles, welche von den Schülern auswendig gelernt wurde. Die schriftlichen Übungen im Übersezzen aus attischen Schriftstellern in das Griechische und Deutsche wurden zu Hause und in der Classe fortgesetzt. Grammatik nach Buitmann. Zur Privatlectüre wurde Herodot gewählt. 4 St. Brüggemann.  
Hom. Il. lib. I—IV. Die Erklärung lateinisch, die Übersetzung deutsch. 2 St. Hr. Prof. Lindemann.
- IV. Französische Sprache. Grammatik nach Caspers und zwar die Syntax; Correctur der französischen Exercitien und Übungen an der Tafel. Montesquieu: Considérations sur les causes de la grandeur etc. von chap. 13 bis zu Ende. 2 St. Hr. Gymnasial-Hülfsslehrer Stephan.
- V. Polnische Sprache. Mit den Schülern polnischer Zunge der Prima und Secunda wurden ausgewählte Stücke aus den Wypisy polskie überzeugt und besprochen, grammatische Fragen behandelt, Disputir-Übungen veranstaltet und Übertragungen aus dem Deutschen in das Polnische schriftlich und mündlich geübt. 2 St. Hr. G.-H.-L. Stephan.
- VI. Hebräische Sprache. Prosaische und poetische Stücke aus dem Lesebuch von Gesenius wurden mit Berücksichtigung der Formenlehre und Syntax erklärt, sowie auch schriftliche Übungen im Übersezzen aus dem Hebräischen in das Lateinische und Deutsche angestellt. 2 St. Hr. Religionslehrer Thamm.

## B. Wissenschaften.

- I. Religionslehre. 1.) Für die katholischen Schüler. Die Lehre von der Gnade; die h. Sacramente; Erklärung der Apostelgeschichte im Grundtexte. 2 St. Hr. R.-L. Thamm. — 2.) Für die

evangelischen Schüler. Religionslehre nach Schmieder und zwar letzter Abschnitt. Erklärung des ersten Korintherbriefes im Grundtexte.  
2 St. Hr. Superintendent Annecke.

II. Philosophische Propädeutik. Logik nach Eßer. 2 St. Hr. Prof. Lindemann.

III. Mathematik. Wiederholung der Lehre von den Kettenbrüchen und deren Anwendung bei der Auflösung unbestimpter Gleichungen; die Theorie der Permutationen, Combinationen und Variationen und deren Anwendung auf die Wahrscheinlichkeitsrechnung; das Binomial-Theorem für ganze positive wie negative und für gebrochene Exponenten; Auflösung der quadratischen Gleichungen mit Hülfe der Trigonometrie und der kubischen und biquadratischen Gleichungen. Wiederholung der Stereometrie und die sphärische Trigonometrie. 4 St. Hr. Oberlehrer Wichert.

Als Handbücher dienten der Leitfaden von Matthias und Grunert's Lehrbuch der allgemeinen Arithmetik. In den drei oberen Classen wurden außer manchen bei Gelegenheit der vorgetragenen Sätze sich entwickelnden Aufgaben den Schülern noch schwierigere zur häuslichen Lösung alle drei Wochen gestellt und von dem Lehrer corrigirt. Auch sind mit den Schülern der Prima practische Übungen im Feldmessen angestellt worden.

IV. Geschichte und Geographie. Neuere und neueste Geschichte nach Pütz. Wiederholung aus der neuern Geographie. 2 St. Hr. Prof. Lindemann.

V. Physik. Die Lehre von dem Schall und von dem Lichte. Im Winter 2 St.; im Sommer 1 St. Hr. D.-L. Wichert.

Als Handbuch wurde in Prima und Secunda August's Auszug aus Fischer's mechanischer Naturlehre zu Grunde gelegt. Soweit es der physikalische Apparat gestattete, wurde der Unterricht durch Experimente veranschaulicht.

VI. Naturgeschichte. Wiederholung der Naturgeschichte im Sommer-Semester. 1 St. Hr. Gymnasial-Lehrer Haub.

---

Der Director unterhielt sich mit den Primanern über Anordnung und

Einrichtung des academischen Studiums unter mehrfacher Bezugnahme  
auf die Vorschule des academischen Lebens von Bomhard.

## Secunda.

Ordinarius: Herr Gymnasial-Lehrer Dr. Moisisszig.

### A. Sprachen.

- I. Deutsche Sprache. Poetik; Leitung der freien Vorträge; Declamiren; Correctur der Auffäze. Gelesen wurden Schiller's Wallenstein und Don Carlos. 3 St. Hr. G.-L. Dr. Moisisszig.
- II. Lateinische Sprache. Liv. lib. VI. — Cic. Laelius. Die erste catilinarische Rede wurde von den Schülern der Ober-Secunda von neuem memorirt, die Rede für den Dichter Archias mit den Schülern der ganzen Secunda durchgenommen und darauf von denselben memorirt. Die Erklärung lateinisch. Correctur der Exercitien; in den letzten Monaten des Schuljahres wurde den Schülern der Ober-Secunda Gelegenheit zum freien schriftlichen Ausdruck gegeben; Exttemporalien; Grammatik nach Zumpt und zwar die syntaxis verbi. Den Stoff zur Privatlectüre gab Caesar de B. G. 6 St. Hr. G.-L. Dr. Moisisszig.  
Virgil's Leben und Dichtungen; aus der Aeneide lib. XI und XII. 2 St. Brüggemann.
- III. Griechische Sprache. Xenoph. Cyrop. lib. I. und die ersten Capitel des zweiten Buches. Hom. Odyss. lib. I—V. Die Erklärung lateinisch, die Übersetzung deutsch. Grammatik nach Buttman: Wiederholung der unregelmäßigen Zeitwörter, die Lehre von der Wortbildung, die Syntax bis zur Lehre von den modis; Correctur der Exttemporalien und Exercitien. 6 St. Hr. Prof. Lindemann.
- IV. Französische Sprache. Grammatik nach Caspers: von der starken Conjugation bis zur Syntax des Pronomens. Charles XII par Voltaire: Buch III. und IV. Correctur der Exercitien. 2 St. Hr. G.-L. Stephan.
- V. Polnische Sprache. Mit den deutschen Schülern der Prima und Secunda wurde die polnische Grammatik nach Poplinski durchgenommen

und durch mündliche und schriftliche Übungen eingeprägt. Zum Übersezen diente das Elementarbuch von Poplinski. 2 St. Hr. G.-H.-L. Stephan.

VI. Hebräische Sprache. Formenlehre; Übungen im Lesen und Übersezen nach den Büchern von Gesenius. 2 St. Hr. R.-L. Thamm.

### B. Wissenschaften.

- I. Religionslehre. 1.) Für die katholischen Schüler. Die Glau-benslehren. Hr. R.-L. Thamm. 2.) Für die evangelischen Schüler. S. Prima.
- II. Mathematik. Wiederholung der Lehre von den einfachen Gleichungen mit mehreren Unbekannten und von den quadratischen Gleichungen; die arithmetischen und geometrischen Progressionen; die Rechnung mit Logarithmen und die Zinseszinsenrechnung. Wiederholung der Lehre von der Ähnlichkeit der Dreiecke und Figuren; die Berechnung ebener Figuren und die Trigonometrie. 4 St. Hr. D.-L. Wichert.
- III. Geschichte und Geographie. Orientalische und griechische Geschichte nach Püg. — Geographie von Amerika und Australien. 3 St. Hr. Prof. Lindemann.
- IV. Physik. Allgemeine Einleitung in die Physik; die allgemeinen Eigen-schaften der Körper; die Hauptbestimmungen aus der Chemie; die Lehre von der Luft. 2 St. Hr. D.-L. Wichert.

### Tertia.

Ordinarius: Herr Gymnasial-Lehrer Dr. Peters.

### A. Sprachen.

- I. Deutsche Sprache. Die Lehre vom Satze nach Hoffmann's Schulgram-matik; die Lehre von den allgemeinen Eigenschaften des deutschen Stils nach Siemers; Declamiren aus Hülfstett's Sammlung und Correctur der schriftlichen Arbeiten. 3 St. Hr. G.-L. Haub.
- II. Lateinische Sprache. Caes. de B. G. lib. I. und einige Capitel aus lib. II. Zwölf Capitel des ersten Buches gaben, nachdem sie in der

Classe übersetzt und erklärt waren, den Stoff zum Memoriren und zu den an dasselbe geknüpften Übungen. 3 St. Grammatik nach Zumpt: die Lehre von der Wortbildung, von den Adverbien und von den Präpositionen; Verbindung des Subjects mit dem Prädicate und Rektion der Casus. 2 St. Correctur der schriftlichen Arbeiten aus Ligzinger's Beispielen zum Übersezzen, 4. Cursus. 1 St. Hr. G.-L. Dr. Peters. Ovid. Metamorph. lib. X. zum Theil, lib. XI. und lib. I. bis v. 348. Der Anfang des ersten Buches, der Tod des Orpheus, wurde memorirt. Lehre von der Quantität und die Anfangsgründe der Metrik mit schriftlichen Übungen. 2 St. Hr. G.-H.-L. Stephan.

- III. Griechische Sprache. Unter-Tertia. Nach der Wiederholung des Pensums der Quarta die Lehre von dem Zeitworte bis an die Partikeln nach Buttmann. Aus dem Lesebuch von Jacobs die aesopischen Fabeln, welche sämmtlich auswendig gelernt wurden, und die folgenden Abschnitte bis zum 12. Stücke der Naturgeschichte. Correctur der schriftlichen Arbeiten. 6 St. Hr. G.-H.-L. Stephan.

Ober-Tertia. Im Winter-Semester aus Jacobs die Naturgeschichte und die Länder- und Völkerkunde; im Sommer-Semester Xenoph. Anab. lib. II. Stoff zum Memoriren und zu den aus demselben abgeleiteten Übungen boten gelesene Stücke aus Jacobs und aus Xenoph. Anab. lib. II. 1, §. 7 — 23. Grammatik nach Buttmann: nach Wiederholung des Vorhergehenden die gesammte unregelmäßige Conjugation und Einübung der in der Prosa gebräuchlichen unregelmäßigen Zeitwörter; die Lehre von den Partikeln und der Wortbildung; Correctur der schriftlichen Arbeiten. 6 St. Hr. G.-L. Dr. Peters.

- IV. Französische Sprache. Grammatik bis zur zweiten starken Conjugation nach Caspers; Übungen im Lesen und Übersezzen in Florian's Numa Pompilius. Schriftliche Exercitien. 2 St. Hr. G.-H.-L. Stephan.

## B. Wissenschaften.

- I. Religionslehre. 1.) Für die katholischen Schüler. Die Selbstliebe; die Nächstenliebe; die besonderen Standespflichten; die Festzeiten der Kirche; die Lehre von der Tugend und von der Sünde. Handbuch: Ontrup. 2 St. Hr. R.-L. Thamm. 2.) Für die evan-

geliſchen Schüler. Der Glaubenslehren zweites Hauptstück nach Kniewel; Erklärung des Evangelisten Matthäus im Grundtexte bis Cap. 10. 2 St. Hr. Superint. Annecke.

II. Mathematik. Wiederholung der Lehre von den Dezimalbrüchen; die algebraischen und die Rechnungsarten mit ganzen positiven und negativen Potenzen; Ausziehen der Quadrat- und Kubikwurzeln; einfache Gleichungen mit einer unbekannten Größe. — Congruenz der Dreiecke mit den dahin gehörenden Sätzen; Gleichheit der Figuren aus Grundlinie und Höhe; Verwandlung derselben; die Lehre von dem Kreise. 4 St. Hr. D.-L. Wichert.

III. Geschichte und Geographie. Geschichte der Römer bis auf den Untergang des weströmischen Reiches nach Pütz. Neuere Geographie der Länder des ehemaligen imperium Romanum. Handbuch: Nieberding. 3 St. Hr. G.-L. Dr. Peters.

IV. Naturgeschichte. Im Winter-Semester Mineralogie mit Benutzung der vorhandenen Mineralien-Sammlung; im Sommer-Semester Botanik: nothwendige Terminologie bei der Beschreibung der Pflanzen an lebendigen Exemplaren; natürliches und Linne'sches System; Beschreibung der um Conitz wildwachsenden Pflanzen. Handbuch: Haub's Naturgeschichte. 2 St. Hr. G.-L. Haub.

## Quarta.

Ordinarius: Herr Gymnasial-Lehrer Kattner.

### A. Sprachen.

I. Deutsche Sprache. In dem einen Cötus. Grammatik nach Hoffmann; mündliche und schriftliche Übung im richtigen Ausdrucke der Gedanken; Declamationsübungen und Lesen von Musterstücken aus Hülstett's Sammlung. 3 St. Hr. G.-L. Dr. Moisissitzig.

In dem andern Cötus. Grammatik nach Hoffmann und zwar wurde die Lehre von der Declination und Conjugation, vom Satze, von den Temporibus und Modis, sowie die Orthographie und Interpunction eingeübt. Aus Hülstett's Sammlung wurden einzelne Stücke

gelesen und erklärt, auch wurde wöchentlich ein Gedicht auswendig gelernt und vorgetragen; Correctur der meistens in Erzählungen, leichteren Beschreibungen und in Briefen bestehenden schriftlichen Arbeiten, deren Stoff vorher in der Schule besprochen war. 3 St. Hr. Gymnasial-Hilfslehrer Raabe.

II. Lateinische Sprache. In dem einen Cötus. Aus Cornelius Nepos die Lebensbeschreibungen des Pausanias und Alcibiades; die erstere wurde memorirt. Wiederholung der unregelmäßigen Zeitwörter; syntaxis casuum und die Hauptabschnitte der syntaxis verbi nach Zumpt; Correctur der schriftlichen Exercitien. 7 St. Hr. G.-L. Dr. Moissitzig.

Nach Zumpt die Lehre von der Quantität der Sylben, von den Versfüßen und iambischen Versen; Phaedri fab. lib. I. II. III. mit Auswahl. 2 St. Hr. Professor Junker.

In dem andern Cötus. Aus Cornelius Nepos die Lebensbeschreibungen des Pelopidas, Algesilaus und Eumenes; die erstere wurde memorirt, wobei die Schüler im Bilden ähnlicher Sätze in den mannigfältigsten Wendungen geübt wurden. Wiederholung des grammatischen Pensums der vorhergehenden Classe; syntaxis casuum, der Infinitiv, der Accusativ mit dem Infinitiv, einige Partikeln und das Nothdürftigste von dem Gebrauche der Modi nach Zumpt; Correctur der schriftlichen Exercitien. 7 St. Hr. G.-L. Kattner.

Nach Zumpt die Lehre von der Quantität der Sylben, von den Versfüßen und den iambischen Versen; Phaedri fab. lib. I. 1—15. 2 St. Hr. G.-L. Kattner.

III. Griechische Sprache. Die Formenlehre bis zu den Zeitwörtern auf μι nach Buttmann. Die entsprechenden Stücke aus dem Elementarbuch von Jacobs wurden übersetzt, analysirt und einige auch auswendig gelernt; Correctur der schriftlichen Übungen. 6 St.

In dem einen Cötus Hr. G.-L. Kattner.

In dem andern Cötus Hr. Prof. Junker.

## B. Wissenschaften.

I. Religionslehre. 1.) Für die katholischen Schüler. Die h. Sacramente, die vier letzten Dinge, die Pflichten gegen Gott und gegen

- sich selbst nach Ontrup. Erklärung der sonn- und festäglichen Episteln. 2 St. Hr. R.-L. Thamm. 2.) Für die evangelischen Schüler. Die fünf Hauptstücke des Luth. Catechismus wurden nach dem Handbuche von Weiß auswendig gelernt und die beiden ersten ausführlich erklärt, sowie Kernsprüche aus der h. Schrift dem Gedächtnisse eingeprägt und die Schüler im Auffschlagen der Bibel geübt. Biblische Geschichte des N. T. 2 St. Hr. Superint. Annecke.
- II. Mathematik. Dezimalbrüche; Verwandlung der gemeinen Brüche in Dezimalbrüche; einfache und zusammengesetzte Proportion; Regel von Dreien, Fünfen, Sieben u. s. w.; Kettenregel; Gesellschafts- und Alli-gationsrechnung. — Das erste Buch von Euklid's Elementen. 3 St. Hr. Prof. Dr. Junker.
- III. Geschichte und Geographie. Orientalische und griechische Geschichte bis auf Alexander den Großen mit steter Berücksichtigung der alten Geographie nach Püz. — Neuere Geographie Asiens, Amerika's, Afrika's und Australiens nach Nieberding. Die Schüler zeichneten von den durchgenommenen Ländern Charten. 3 St. Hr. G.-H.-L. Stephan.
- IV. Naturgeschichte. Knochenthiere. 2 St. Hr. G.-L. Haub.
- 

## Quinta.

Ordinarius: Herr Gymnasial-Lehrer Haub.

### A. Sprachen.

- I. Deutsche Sprache. Lesen und Erklären aus Hülstett's Sammlung; Vortrags-Uübungen; Correctur der schriftlichen Arbeiten und practische Anwendung der orthographischen Regeln. 4 St. Hr. G.-L. Haub.
- II. Lateinische Sprache. Wiederholung und Erweiterung der Formenlehre nach Zumpt's Kleiner Grammatik; Übersetzen aus Litzinger's Übungsbüche mit Auswahl bis S. 102.; Memoriren überseztter Stücke aus Litzinger; Correctur der schriftlichen Arbeiten. 10 St. Hr. G.-L. Haub.

### B. Wissenschaften.

- I. Religionslehre. 1.) Für die katholischen Schüler. Glaubens-

- Lehre: die Erlösung, die Heiligung und die Gnadenmittel nach Ontrup. Biblische Geschichte des A. und N. Testamentes nach Kabath; Erklärung der auswendig gelernten sonn- und festäglichen Evangelien. 2 St. Hr. R.-L. Thamm. 2.) Für die evangelischen Schüler. Die beiden ersten Hauptstücke des Lutherischen Catechismus wurden wiederholt und dem Wortsinne nach erklärt und sämmtliche im Leitfaden von Preuß enthaltene Liederverse von den Schülern auswendig gelernt. Biblische Geschichte des A. Z.: von der Schöpfung bis auf das Zeitalter der Richter nach Preuß. 2 St. Hr. Superint. Annecke.
- II. Rechnen. Die vier Rechnungsarten in benannten, ganzen und gebrochenen Zahlen; die einfache und zusammengesetzte Regel von Dreien mit geraden und umgekehrten Verhältnissen. 4 St. Hr. G.-L. Kattner.
- III. Geschichte und Geographie. Die Lebensgeschichten der bedeutendsten Männer des Mittelalters und einiger der neueren Zeit wurden nach Welter's Geschichtshandbuche vorgetragen und wiederholt. — Nach Wiederholung des Pensums der Sexta nahm der Lehrer die einzelnen europäischen Länder nach Nieberding's Leitfaden mit besonderer Berücksichtigung der Gebirgs- und Fluss-Systeme durch und ließ die Schüler monatlich eine Charte zeichnen. 3 St. Hr. G.-H.-L. Raabe.
- IV. Naturgeschichte. Einleitung in die Naturgeschichte und Übung in der Beschreibung der Säugetiere. 2 St. Hr. G.-L. Haub.

---

### S e x t a.

Ordinarius: Herr Gymnasial-Hülfsslehrer Raabe.

#### A. Sprachen.

- I. Deutsche Sprache. Aus Hülstett's Sammlung wurden Stücke von den Schülern an die Tafel geschrieben und daran die nothwendigsten grammatischen und orthographischen Regeln angeknüpft. Die schriftlichen Arbeiten bestanden im Winter im Abschreiben der auswendig gelernten Gedichte, im Sommer in kleinen Erzählungen, welche vorher in der Schule durchgesprochen waren. 2 St. Hr. G.-H.-L. Raabe.

Lese- und Vortrags-Übungen auswendig gelernter Gedichte. 2 St.  
Brüggemann.

II. Lateinische Sprache. Die regelmäßige Formenlehre nach Zumpt's  
kleiner Grammatik. Aus Litzinger's Anleitung wurde übersezt und me-  
morirt; Correctur der schriftlichen Arbeiten. 10 St. Hr. G.-H.-L.  
Raabe.

### B. Wissenschaften.

I. Religionslehre. 1.) Für die katholischen Schüler. Glaubens-  
lehre nach Ontrup: die Lehre von Gott, von den erschaffenen Dingen,  
und von dem Erlöser. Biblische Geschichte des A. T. nach Rabath.  
2 St. Hr. R.-L. Thamm. 2.) Für die evangelischen Schü-  
ler. Die beiden ersten Hauptstücke des Luth. Catechismus wurden mit  
passenden Liedversen auswendig gelernt. Biblische Geschichte nach Preuß  
und zwar die bekanntesten Erzählungen aus dem A. T. 2 St. Hr.  
Superint. Annecke.

II. Rechnen. Zahlenanschauung; Numeriren; die vier Species in benannten  
und unbenannten Zahlen; die Lehre vom gemeinen Brüche; Kopfrechnen.  
4 St. Hr. D.-L. Wichert.

III. Geschichte und Geographie. Aus der alten Geschichte die Lebens-  
beschreibungen der berühmtesten Männer nach Welter's Geschichtshand-  
buch. — Nach Nieberding's Leitfaden Entwicklung der unentbehr-  
lichsten geographischen Begriffe; darauf die Oceanographie und die Geo-  
graphie Europa's im Allgemeinen. Versuche im Chartenzeichnen. 3  
St. Hr. G.-H.-L. Raabe.

---

### Fertigkeiten.

I. Singen in Sexta und Quinta in je zwei wöchentlichen Stunden:  
Kenntniß der Noten und Pausen; Tonleiter; Intervalle; Versezungss-  
zeichen; Ton- und Taktarten; Verwandtschaft der Tonarten; Metrum  
und Rhythmus; Übungen im Tontreffen; Singen einstimmiger Choräle  
und Gelegenheitslieder.

In Quarta und Tertia ebenfalls in je zwei wöchentlichen Stunden:

mehrstimmiger Gesang; Choräle und Gesellschaftslieder mit theoretischen Erläuterungen.

Mit einem aus den besten Sängern aller Classen gebildeten Chor wurden in einer wöchentlichen Stunde aus Haydn's Schöpfung und Jahreszeiten, wie auch aus anderen Compositionen größere Chöre eingebütt. Die katholischen Schüler dieses Sängerchors übten in einer besonderen wöchentlichen Stunde katholischen Kirchengesang, wobei die Choralbücher von Bieh und Hahn vorzugsweise zu Grunde gelegt wurden.

- II. Zeichnen in Sexta und Quinta und zwar Zeichnen mit Lineal und Zirkel; die allgemeine Formenlehre, wie auch andere mathematische Figuren nach Schmid's und Breyfig's Methode; — in Quinta freies Handzeichnen nach Vorlegeblättern. In jeder Classe wöchentlich 2 St.
- III. Schönschreiben in Sexta in 5 und in Quinta in 3 wöchentlichen Stunden nach Heinrig's Vorschriften.

- IV. Die gymnasialischen Übungen fanden Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von  $\frac{1}{4}$  nach 4 bis  $\frac{1}{4}$  nach 5 Uhr Nachmittags statt.

Hr. Gymnasial-Hülfslhrer Ossowski.

---

### V e r o r d n u n g e n .

1. Dem Gymnasium werden die ergangenen Bestimmungen über die Organisation und den Geschäftsgang der Militair-Examinations-Commissionen für die Eintritts- und Offizier-Prüfungen, sowie über die Anforderungen, welche künftig im Offizier-Examen an die zu Prüfenden zu machen sind, mitgetheilt. Königsberg, den 2. September 1846.
2. Mittheilung des Statuts für die polnischen Beneficiaten im Alumnat des Joachimsthal'schen Gymnasiums in Berlin. Königsberg, den 17. Dezember 1846.
3. Das Gymnasium wird an das hohe Ministerial-Rescript vom 9. Mai 1826 erinnert, nach welchem kein Schüler, der von einem andern Gymnasium abgegangen ist, wieder aufgenommen werden darf, ohne von ihm zuvor die Beibringung eines Zeugnisses desjenigen Gymnasiums zu fordern,

das von demselben besucht worden ist. Bei dieser Gelegenheit werden nähere Bestimmungen über die bedingte Wiederaufnahme verwiesener Schüler gegeben. Königsberg, den 31. Dezember 1846.

4. Durch die Allerhöchste Verordnung vom 28. Mai 1846 ist der Pensions-Anspruch der Lehrer und Beamten an den höheren Unterrichts-Anstalten, mit Auschluß der Universitäten, gesetzlich festgestellt. Laut hohem Ministerial-Rescript vom 10. Dez. 1846 sind die nöthigen Anordnungen zur Ausführung genannter Allerhöchster Ordre getroffen und treten die Lehrer und Beamten der betreffenden höheren Lehranstalten mit dem 1. Januar 1847, unter Erlegung der ordnungsmäßigen Beiträge, in den Genüß der ihnen nunmehr rechtlich gesicherten Wohlthat. Königsberg, den 14. Januar 1847.
5. In Rücksicht auf die hiesigen eigenthümlichen Verhältnisse werden die Pfingstferien auch auf die drei letzten Tage der Pfingstwoche ausgedehnt. Im Sommer kann auch nach der Anordnung des Directors für eine und die andere Classe wegen eines gemeinsamen Spazierganges der Unterricht in derselben auf einen halben Tag ausgesetzt werden. Ebenso hängt es von der Bestimmung des Directors ab, an übermäßig heißen Sommertagen für den Nachmittag den Unterricht auszusetzen zu lassen. An Tagen, wo die Kälte mehr als 20° R. beträgt, ist die Schule zu schließen. Die Tage der öffentlichen Prüfung und der Censur sind nicht als Ferientage zu betrachten. Königsberg, den 13. Dez. 1846 und 22. April 1847.
6. Empfohlen wurden durch das Königliche Hochlöbliche Provinzial-Schul-Collegium:
  - 1.) Das in der Lambeck'schen Buchhandlung in Thorn erschienene Liederbuch für Turner.
  - 2.) Die durch den academischen Maler und Künstler Leopold Müller in Berlin gefertigten, für Unterrichtszwecke sehr angemessenen Modelle.
  - 3.) Die von den Professoren Heydemann und Dr. Müzell in Berlin herausgegebene Zeitschrift für das Gymnasialwesen.
  - 4.) Die unter dem Titel: „Mittheilungen aus der Verwaltung der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten in Preußen“ erscheinende Zeitschrift.

- 5.) Die durch den academischen Künstler, Orgelbauer und Instrumentenmacher Ferdinand Lange in Berlin gefertigten acustischen und physikalischen Apparate.
  - 6.) Das bei Einhorn in Leipzig erschienene deutsche Lesebuch für Gymnasien und Realschulen von Dr. N. Bach. Zweite Auflage.
- 

### Bweiter Abschnitt.

## Chronik des Gymnasiums.

---

Das Schuljahr wurde am 5. October v. J. Morgens 8 Uhr durch ein von dem Herrn Religionslehrer in der Gymnasial-Kirche celebrirtes Hochamt eröffnet. Hierauf dictirten die Ordinarien in den einzelnen Classen den Lectionsplan und ordneten das in disciplinarischer Hinsicht Erforderliche an, so daß am folgenden Tage der Unterricht in regelmäßiger Weise seinen Anfang nahm.

Bei der am 15. October pr. Statt findenden Feier des Geburtstages Sr. Majestät, unseres Allernäidigsten Königs und Herrn, hielt der Gymnasial-Lehrer, Herr Dr. Peters, die Festrede und außerdem trugen Schüler aller Classen angemessene Gedichte und Gesänge vor einem zahlreichen Kreise von Zuhörern aus der Stadt und Umgegend in dem freilich für festliche Veranlassungen durchaus ungenügenden Classenzimmer der Quarta vor.

Der Gymnasial-Lehrer, Herr Dr. Bender, welcher seit Ostern 1843 mit treuem Fleiße und sichtbarem Erfolge an unserer Lehranstalt gewirkt und in collegialischer Beziehung stets eine offene und biedere Gestimung bewahrt hatte, schied mit dem Ende des vorigen Schuljahres aus unserer Mitte und folgte einem Rufe an das Königliche katholische Gymnasium in Braunsberg. Möge unser bisheriger College in seinem neuen Wirkungskreise sich recht glücklich fühlen! Gegenwärtig verläßt uns der mit der Verwaltung der zweiten Hülfsslehrerstelle beauftragte Herr Stephan, um nach ein und einer halbjährigen angestrengten Thätigkeit an der hiesigen Schule in der Provinz Posen eine anderweitige Stellung einzunehmen. Wir wünschen dem Scheidenden von Herzen einen ungetrübten und segensreichen Beruf.

Dem bisherigen zweiten ordentlichen Lehrer, Herrn Albert Wichert, ist mit Genehmigung Sr. Excellenz des Herrn Ministers durch das Königliche Vorgeordnete Provinzial-Schul-Collegium laut Verfügung vom 21. Oct. pr. die dritte Oberlehrerstelle, dem bisherigen dritten ordentlichen Lehrer, Herrn Ferdinand Haub, die zweite ordentliche Lehrerstelle, dem bisherigen ersten wissenschaftlichen Hülfslehrer, Herrn Dr. Heinrich Moississtzig, die dritte ordentliche Lehrerstelle, dem bisherigen Schulamts-Candidaten, Herrn Dr. Franz Peters aus Allendorf in Westfalen, die vierte ordentliche Lehrerstelle und dem bisherigen wissenschaftlichen Hülfslehrer an dem Gymnasium in Paderborn, Herrn Friedrich Raabe aus Soest in Westfalen, die erste wissenschaftliche Hülfslehrerstelle bei dem hiesigen Königlichen Gymnasium vom 1. October pr. ab verliehen worden. Die genannten Lehrer sind am 31. October pr. nach einer kirchlichen Feier in der Gymnasial-Kirche durch den Director in einer Schulversammlung in ihr neues Amt eingeführt und darauf, soweit dieses noch nicht geschehen war, in dem Conferenzzimmer vereidigt worden.

Die Classen-Theilung der Tertia und Quarta in mehreren Lectionen hat sogleich mit dem Anfang des Schuljahres ihren Anfang genommen und zwar ist in der ersten Classe für Ober- und Unter-Tertia der griechische und in der letztern Classe der deutsche, lateinische und griechische Unterricht in zwei gesonderten Schülerabtheilungen gegeben worden.

Am Schlusse des vorigen Schuljahres wurden in der Gymnasial-Kirche die Exequien für die Seelenruhe Sr. Heiligkeit des Papstes Gregor XVI. unter allgemeiner Theilnahme der Lehrer und Schüler durch den Herrn Religionslehrer abgehalten. Die katholischen Schüler der Anstalt gingen im Verlaufe dieses Schuljahres dreimal zur h. Beichte und h. Communion und nahmen auch aus eigener erfreulicher Bewegung an dem von Sr. Heiligkeit, dem neuen Kirchenoberhaupt Pius IX., den Gläubigen verkündeten kirchlichen Jubiläum Theil. Die von dem Herrn Religionslehrer vorbereiteten Schüler feierten am 29. Juni d. J. das Fest ihrer ersten h. Communion, nachdem vorher eine Prüfung derselben in den Religionswahrheiten ihrer Kirche Statt gefunden hatte. Den bei dem Beichtgeschäfte so bereitwillig und unverdrossen mitwirkenden Herren Geistlichen sage ich im Namen der Anstalt den aufrichtigsten Dank. — Die evangelischen Schüler nahmen an der Abendmahlfeier ihrer Kirche nach näherer Anordnung ihres Religionslehrers, des Herrn Superintendenten Annecke, wiederholt Theil.

Die gehörigen Vorsichtsmaßregeln bei dem Baden der Schüler wurden auch in diesem Schuljahre frühzeitig getroffen und freuen wir uns, den Jöglingen des Gymnasiums eine geeignete Badestelle durch die Obsorge der Väter unserer Stadt gesichert zu sehen. Der Frühlingsauszug des Gymnasiums unterblieb aus diätetischen und disciplinarischen Rücksichten.

---

**Dritter Abschnitt.**

**Statistische Uebersicht.**

An dem Unterrichte haben in diesem Schuljahre Theil genommen in

Prima . . . .	34	Schüler
Secunda . . . .	55	"
Tertia . . . .	86	"
Quarta . . . .	93	"
Quinta . . . .	90	"
Sexta . . . .	52	"
Summa		410 Schüler.

In die Anstalt wurden 78 Schüler aufgenommen und 20 Schüler gingen aus derselben entweder zu einem andern Berufe oder in eine andere Bildungsanstalt über; 6 Schüler mussten nach §. 15. Nov. 3. der Disciplinar-Gesetze mit der Verweisung bestraft werden.

Der Quartaner Franz Sliwinski aus Kossakau im Kreise Neustadt erkrankte hier im Anfange des Schuljahres und starb sogleich nach seiner Ankunft bei den Seinigen am 28. Nov. v. J. an der Schwindfucht. Der Schüler war wohl gesittet, fleißig und fromm und hat seinen Lehrern niemals zur Unzufriedenheit Veranlassung gegeben. — Noch haben diese Blätter über einen traurigen Verlust aus dem vorigen Schuljahre zu berichten. Der Ober-Secundaner Adolph Beerwald aus Conis, welchen der Director am 11. September 1839 in die Lehranstalt aufgenommen hatte, wurde uns am 9. August

v. J. in Folge längeren Brustleidens in dem blühenden Alter von neunzehn Jahren zu unserem innigsten Schmerze durch den Tod entrissen und am 13. desselben Monats von seinen Mitschülern und Lehrern zur Ruhestätte, an welcher der Herr Superintendent Annecke des hingeschiedenen Jünglings liebenswürdige und einnehmende Eigenschaften unter dem erhebenden Hinblicke auf die trostreichen Verheißungen des Erlösers darlegte, geleitet. Die Schule erfreute sich stets ihres musterhaft bescheidenen, fleißigen und rüftig forschreibenden Jünglings und durfte an denselben die gerechtesten Hoffnungen knüpfen. Mögen die gebeugten Angehörigen in der christlichen Erinnerung an den so herzlich geliebten und liebenden Sohn die wohlthuendste Erquickung und Stärkung finden!

In der diesjährigen Entlassungs-Prüfung, welche nach ordnungsmäßiger Auffertigung der schriftlichen Arbeiten am 6., 7., 9., 10. und 11. August c. vor dem Commissarius des Königl. Provinzial-Schul-Collegiums, Herrn Schulrath Dr. Lucas, abgehalten wurde, erwarben sich vierzehn Primaner das Zeugniß der Reife; ein Primaner trat von der Prüfung zurück und einem andern mußte das Zeugniß der Reife versagt werden. Über drei Primaner sind die Prüfungs-Verhandlungen nebst den schriftlichen Arbeiten dem Königl. Provinzial-Schul-Collegium zur Entscheidung vorgelegt worden und wird die letztere in dem nächsten Jahresberichte mitgetheilt werden. Die für reif erklärtten Schüler sind folgende:

N a m e n .	alter.	Geburtsort.	Confess.	war in Prima.	Studium.	Ort des Studiums.
1. August Behrendt	21 $\frac{3}{4}$ J.	Damerau	kath.	2 J.	Theologie	Breslau.
2. Heinrich Thomse	23 $\frac{3}{4}$ J.	Pr. Mark	evang.	2 J.	Rechtswiss.	Königsb.
3. Franz Gehrke .	24 $\frac{1}{4}$ J.	Stegers = Mühle	kath.	2 J.	Theologie	Breslau.
4. Joseph Kopal .	20 $\frac{3}{4}$ J.	Zásada	kath.	2 J.	Theologie	Breslau.
5. Theophil Kozmiński	21 $\frac{1}{4}$ J.	Berent	kath.	2 J.	Philologie	Breslau.
6. Ignaz Kuklinski	25 $\frac{1}{2}$ J.	Borsk	kath.	2 J.	Theologie	Pelslin.
7. Johann Lipski .	23 $\frac{1}{2}$ J.	Górfi	kath.	2 J.	Theologie	Pelslin.
8. Franz Preuschoff	20 $\frac{1}{2}$ J.	Wormditt	kath.	1 J.	Philologie	Breslau.

N a m e n .	A l t e r .	G e b u r t s o r t .	C o n f e s s .	w a r i n P r i m a .	S t u d i u m .	O r t d e s S t u d i u m s .
9. Theophil Schmidt	23 J.	Niedamowo	kath.	2 J.	Theologie	Pelplin.
10. Max v. Sikorski	25 J.	Borzechowko	kath.	2 J.	Theologie	Pelplin.
11. Johann Tandeksi	23 J.	Gr. Konar- zyn	kath.	2 J.	Theologie	Pelplin.
12. Stanislaus Tandeksi	25 $\frac{1}{4}$ J.	Lesno	kath.	2 J.	Theologie	Pelplin.
13. Joseph v. Tempski	22 $\frac{1}{4}$ J.	Chmielno	kath.	2 J.	Theologie	Breslau.
14. Julius Zucht .	21 $\frac{1}{4}$ J.	Mehlsack	kath.	2 J.	Theologie	Pelplin.

Der Lehrapparat hat auch in diesem Schuljahre aus den etatsmäßigen Fonds der Anstalt einen ansehnlichen Zuwachs erhalten und gereicht es mir zum Vergnügen, berichten zu können, daß durch die unter Gewährung einer entsprechenden Mietsh-Entschädigung erfolgte Einziehung der in dem Gymnasial-Gebäude bisher befindlichen ersten Oberlehrer-Wohnung für Unterrichtszwecke auch der physicalischen und naturhistorischen Sammlung besondere Locale eingeräumt werden konnten. Die specielle Aufsicht über die Gymnasial-Bibliothek und das naturhistorische Cabinet führt der Herr Gymnasial-Lehrer Hanß, die physicalischen Instrumente beaufsichtigt der Herr Oberlehrer Wichert. Folgende Geschenke sind dem Gymnasium zugegangen:

I. Von der Vorgesetzten hohen und höchsten Unterrichtsbehörde:

- 1.) Ein Exemplar des 4. und 5. Bandes des Rheinischen Museums für Philologie.
- 2.) " " der 2. Lieferung des historischen Atlases von Voigt.
- 3.) " " verschiedener von der dänischen Gesellschaft für nordische Alterthumskunde fernierweit herausgegebenen Schriften.
- 4.) " " des 35. Bandes des encyclopädischen Wörterbuches der medizinischen Wissenschaften.
- 5.) Zwei Exemplare der von dem Professor Zimmermann herausgegebenen Geschichte des Brandenburgisch-Preußischen Staates.
- 6.) Zwei Exemplare der von dem Musik-Director Döring herausgegebenen patriotischen Gesänge.

II. Von dem Herrn Hector und Gymnasial-Gesanglehrer Vieth in Arnsberg:

- 7.) Ein Exemplar der von demselben im J. 1845 herausgegebenen Gesangsschule.

III. Von dem Herrn Buchhändler Besser in Berlin:

- 8.) Ein Exemplar der von Dr. Strack herausgegebenen Militia.

IV. Von dem Herrn Buchhändler Veith in Berlin:

- 9.) Ein Exemplar von August's Logarithmen.

V. Von dem Herrn Buchhändler Franke in Quedlinburg:

- 10.) Ein Exemplar der loci grammatici von Goßrau, Kallenbach und Pfau.

Die Lehranstalt hat diese gütigen Geschenke mit dem gebührenden Danke entgegengenommen.

---

Zur Vermehrung der Schüler-Lese-Bibliothek, welche ebenfalls in dem Gymnasial-Gebäude einen geeigneten Ort zur Aufbewahrung gefunden hat, haben die beiden oberen Classen 27 Thlr. 10 Sggm., die beiden mittleren 22 Thlr. und die beiden unteren 18 Thlr. 10 Sggm. beigetragen. Zwei Schüler der Unter-Tertia haben der Bibliothek je ein Werk verehrt. — An Beiträgen für die Schüler-Lehrbücher-Bibliothek sind von Schülern der Anstalt 13 Thlr. 24 Sggm. 9 Pf. eingekommen und außerdem hat der Herr Director Dr. Schulz in Braunsberg derselben den Betrag von 5 Thlrn. geschenkt.

---

Mit dem Schlusse des vorigen Schuljahres wurden die durch den Austritt der Abiturienten Gollnick, Mathey, Schmidt und Schultis erledigten Convictstellen mit Genehmigung der höheren Behörde den Primanern Johann Lipski und Paul Izwicki und den Secundanern Bernhard Heymann und Stephan Potengowski verliehen. Zwei dieser neu besetzten Stellen sowie eine ältere mussten in Folge tadelnswertigen Betragens ihren Nutzniesern mit dem 15. Juni c. genommen werden. Auf den Vorschlag der betreffenden Mitglieder des Lehrer-Collegiums wurde der Primaner Ignaz Wierzbowski höheren Orts unter dem 5. Juli c. in der demselben seit dem 15. Juni c. conferirten Stelle bestätigt. Weitere Bewerbungen fanden aus der Prima nicht statt und würden aus der Secunda aus disciplinariischen Motiven damals

nicht haben berücksichtigt werden können. Die zehnte Convictorenstelle wird auf höheren Befehl bei den bedrängten Fonds der Stiftung vorläufig nicht besetzt, das andere seit dem 15. Juni c. vacante Beneficium dagegen kann mit dem Anfange des nächsten Schuljahres wieder verliehen werden. Die näheren Notizen über die Stiftung des Convictoriums ad St. Augustinum sind bereits in den Jahresberichten der Anstalt v. J. 1825 S. 15. und 1829 S. 7 und 8. weitläufig mitgetheilt.

Die von dem Hochwürdigsten Herrn Bischofe Dr. Sedlag, Ritter ic. ic., gestifteten Convictstellen sind auch in dem jetzt abgelaufenen Schuljahre den Primanern Stanislaus Landecki und Julius Zucht geblieben und ein Schüler der Unter-Tertia hat, wie früher, so auch während dieses Schuljahres eine ansehnliche bischöfliche Unterstützung genossen.

Das Hochwürdige Bischöfliche General-Vicariat-Amt von Culm stellte dem Director unter dem 21. Sept. 1846 die Summe von 36 Thlr. 27 Sggm. 7 Pf. n. unter dem 23. Januar c. die Summe von 69 Thlr. und unter dem 23. Juli c. die Summe von 65 Thlr. als Stipendien für würdige Aspiranten des geistlichen Standes zu. Diese Beträge sind unter Aufnahme und Einreichung der vorschriftsmäßigen Quittungsverhandlungen zu seiner Zeit ausgeschahlt worden.

Seit dem 1. Januar d. J. hat sich dem Wunsche des Directors gemäß eine Kranken-Casse für hülfsbedürftige Schüler des Gymnasiums aus kleinen freiwilligen Beiträgen der Zöglinge der Anstalt gebildet, deren specielle Verwaltung Herr Dr. Moiszsitszlig gern und aus Liebe zur guten Sache übernommen hat. Nach der am Schlusse des Schuljahres in der Lehrer-Conferenz gelegten Rechnung sind 30 Thlr. 2 Sggm. 3 Pf. eingekommen, 19 Thlr. 15 Sggm. 1 Pf. an Unterstützungen auf gemeinschaftlichen Beschluss des betreffenden Classenlehrers, des resp. Religionslehrers und des Directors verausgabt und 10 Thlr. 17 Sggm. 2 Pf. als Bestand geblieben.

An ganzem und halben Schulgelde ist eine ansehnliche Summe erlassen worden.

Den geehrten Familien der Stadt, in welchen so manche unbemittelte Schüler der Anstalt einen Mittags- oder Abendtisch gefunden haben, ferner den uns unbekannt gebliebenen Wohlthätern unserer studirenden Jugend und namentlich den Herren Ärzten, welche in dem verflossenen Schuljahre eine besonders reich-

liche Gelegenheit zur Hülfe an fieberkranken Schülern mit großer Aufopferung und Mildthätigkeit wahrgenommen haben, statte ich im Namen des Gymnasiums den wärmsten Dank ab.

Vierter Abschnitt.

## Öffentliche Prüfungen.

Die öffentlichen Prüfungen der Schüler des Gymnasiums werden Montag, den 23. August c., von 8 Uhr Morgens und von 3 Uhr Nachmittags ab im Lehrzimmer der Quarta in nachfolgender Ordnung gehalten werden:

### Vor m i t t a g.

#### G e s a n g.

Sexta: Lateinisch und Geschichte.

Quinta: Rechnen und Lateinisch.

Quarta: Griechisch und Mathematik.

Tertia: Katholische Religionslehre; Lateinisch und Französisch.

### N a c h m i t t a g.

Secunda: Evangelische Religionslehre; Deutsch und Lateinisch.

Prima: Griechisch und Lateinisch.

Dienstag, den 24. August c., Morgens 8 Uhr: Schlussgottesdienst.  
Darauf im Lehrzimmer der Quarta: Gesang; Abschiedsrede der Abiturienten

und deren Erwiederung; Entlassung der Abiturienten; Versezung; Gesang. — Censur-Bertheilung.

Das neue Schuljahr wird Montag, den 4. October c., Morgens 8 Uhr, durch eine kirchliche Feier eröffnet. Neue Schüler werden am 1. und 2. October c., Morgens zwischen 8 und 12 Uhr und Nachmittags zwischen 2 und 5 Uhr, in dem Geschäftszimmer des Directors aufgenommen.

Dr. F. Brüggemann.

—————  
Φίλοις μαρτιών θεωρήσετε την παραπάντα πολιτική της φιλίας και  
μια δυνατότερη γέλλεται στην εποχή της από την οποία η φιλία είναι  
πιθανότερη να πάρει την πρώτη θέση στην πατριαρχία.

φιλία της φιλίας

φιλία

φιλία της φιλίας : φιλία

φιλία της φιλίας

φιλία της φιλίας : φιλία

φιλία της φιλίας : φιλία

φιλία της φιλίας : φιλία